

# Опыт Франка–Герца

Козлов Александр

Краснощёкова Дарья

14 ноября 2021 г.

## 1 Определение резонансного потенциала

Сняли анодно–сеточную характеристику при задерживающем напряжении, при котором видно два максимума анодно–сеточной характеристики наилучшим образом. Задерживающее напряжение было выбрано  $12.1 \pm 0.1$  В. Результаты измерений отображены на рисунке 1. Первые два локальных максимума обнаружены при ускоряющих потенциалах




Рис. 1: Анодно-сеточная характеристика при задерживающем напряжении 12.1 В.

$\varphi_1 = 24.0 \pm 0.5$  В и  $\varphi_2 = 48.0 \pm 0.5$  В. Из наших измерений оказалось, что не важно каким

именно образом определять резонансное напряжение. Можно как через напряжение первого локального максимума ( $\varphi_1 = 24.0 \pm 0.5$  В), так и через разность напряжений второго и первого локальных максимумов анодно-сеточной характеристики ( $\varphi_2 - \varphi_1 = 24 \pm 1$  В). Таким образом,  $V_{\text{рез}} = 24 \pm 0.5$  В. Отсюда находим разность энергий

$$E_1 - E_0 = eV_{\text{рез}} = 24.0 \pm 0.5 \text{ эВ}. \quad (1)$$

Стоит отметить, что резонансный потенциал гелия отличается от измеренного нами. В действительности он составляет 21 В.

## 2 Определение потенциала ионизации

Для определения потенциала ионизации искали скачок анодного тока при потенциале задержки, большем ускоряющего потенциала. Провели три серии измерений с различными потенциалами задержки. Результаты измерений представлены на рисунке 2. Из анали-




Рис. 2: Анодно-сеточная характеристика при потенциалах задержки 40, 45 и 50 вольт.

за предложенного графика находим точку, где имеет место скачок производной. Такой точкой будет 25.5 В. Следовательно, потенциал ионизации равен

$$\varphi_{\text{и}} = 25.5 \text{ В}. \quad (2)$$