

Опыт Франка–Герца

Козлов Александр

Краснощёкова Дарья

14 ноября 2021 г.

1 Определение резонансного потенциала

Сняли анодно–сеточную характеристику при задерживающем напряжении, при котором видно два максимума анодно–сеточной характеристики наилучшим образом. Задерживающее напряжение было выбрано 12.1 ± 0.1 В. Результаты измерений отображены на рисунке 1. Первые два локальных максимума обнаружены при ускоряющих потенциалах




Рис. 1: Анодно-сеточная характеристика при задерживающем напряжении 12.1 В.

$\varphi_1 = 24.0 \pm 0.5$ В и $\varphi_2 = 48.0 \pm 0.5$ В. Из наших измерений оказалось, что не важно каким

именно образом определять резонансное напряжение. Можно как через напряжение первого локального максимума ($\varphi_1 = 24.0 \pm 0.5$ В), так и через разность напряжений второго и первого локальных максимумов анодно-сеточной характеристики ($\varphi_1 - \varphi_2 = 24 \pm 1$ В). Таким образом, $V_{\text{рез}} = 24 \pm 0.5$ В. Отсюда находим разность энергий

$$E_1 - E_0 = eV_{\text{рез}} = 24.0 \pm 0.5 \text{ эВ}. \quad (1)$$

Стоит отметить, что резонансный потенциал гелия отличается от измеренного нами. В действительности он составляет 24 В.

2 Определение потенциала ионизации