

MA E_χ 02

isagila

Собрано 12.06.2023 в 10:34



Содержание

1. Интегрирование функции одной переменной	3
1.1. Определение и свойства неопределенного интеграла.	3
1.2. Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям.	4
1.3. Интегрирование рациональных функций (общая схема). Разложение дроби на простейшие.	5
1.4. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование простейших дробей 1,2,3.	5
1.5. Интегрирование тригонометрических функций. Универсальная тригонометрическая подстановка.	5
1.6. Интегрирование тригонометрических функций вида $R(\sin^m x, \cos^m x)$, $R(\sin mx, \cos mx)$	5
1.7. Интегрирование некоторых иррациональных функций, метод тригонометрической подстановки.	5
1.8. Определенный интеграл. Определение, свойства линейности и аддитивности.	5
1.9. Геометрический смысл определенного интеграла. Оценка определенного интеграла. Теорема о среднем.	5
1.10. Интеграл с переменным верхним пределом. Теорема Барроу.	5
1.11. Вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.	6
1.12. Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям.	6
1.13. Приложения определенного интеграла: вычисление площадей в декартовых координатах.	6
1.14. Приложения определенного интеграла: вычисление площади криволинейного сектора в полярных координатах.	6
1.15. Приложения определенного интеграла: вычисление длины дуги кривой (вывод формулы).	6
1.16. Приложения определенного интеграла: вычисление длины дуги кривой, заданной параметрически.	6
1.17. Приложения определенного интеграла: вычисление объемов тел с известными площадями сечений и тел вращения.	6
1.18. Несобственные интегралы 1-го рода (на неограниченном промежутке). Определение и свойства.	6
1.19. Вычисление несобственного интеграла 1-го рода: формула Ньютона-Лейбница, интегрирование по частям, замена переменной.	6
1.20. Несобственные интегралы 2-го рода (от неограниченной функции). Определение, вычисление и свойства.	6
1.21. Признаки сходимости несобственных интегралов: первый признак сравнения (в неравенствах).	6
1.22. Признаки сходимости несобственных интегралов: второй признак сравнения (предельный).	6
1.23. Признаки сходимости несобственных интегралов: теорема об абсолютной сходимости. Понятие условной сходимости.	6
1.24. Сходимость интегралов 1-го и 2-го рода от степенных функций.	6
2. Интегрирование функции нескольких переменных	7
2.1. Двойной интеграл. Определение и свойства.	7
2.2. Вычисление двойного интеграла. Кратный интеграл.	7
2.3. Определение и вычисление тройного интеграла.	7
2.4. Криволинейные координаты.	7
2.5. Замена переменных в двойном и тройном интегралах. Якобиан.	7
2.6. Криволинейный интеграл 1-го рода: определение, свойства, вычисление, геометрический и физический смысл.	7
2.7. Криволинейный интеграл 2-го рода как работа силы вдоль пути. Определение, вычисление и свойства.	7
2.8. Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода: формула связи.	7
2.9. Теорема (формула) Грина.	7
2.10. Интегралы, не зависящие от пути интегрирования. Теорема о независимости интеграла от пути, равносильность I, II, III утверждений.	7
2.11. Интегралы, не зависящие от пути интегрирования. Теорема о независимости интеграла от пути, равносильность III, IV утверждений.	7
2.12. Следствие теоремы о независимости от пути (формула Ньютона-Лейбница).	7
2.13. Поверхностный интеграл 1-го рода: определение, свойства, вычисление, геометрический и физический смысл.	7
2.14. Поверхностный интеграл 2-го рода как поток жидкости через поверхность.	7
2.15. Связь между поверхностными интегралами 1-го и 2-го рода.	7
2.16. Поверхностный интеграл 2-го рода: математическое определение, вычисление, свойства.	7
2.17. Теорема Гаусса-Остроградского.	7
2.18. Теорема Стокса.	7
2.19. Скалярное и векторное поля: определения, геометрические характеристики. Дифференциальные и интегральные характеристики полей (определения).	7
2.20. Виды векторных полей и их свойства (теоремы о поле градиента и поле вихря).	7
2.21. Механический смысл потока и дивергенции.	7
2.22. Механический смысл вихря и циркуляции.	7
2.23. Векторная запись теорем теории поля и их механический смысл.	7

1. Интегрирование функции одной переменной

1.1. Определение и свойства неопределенного интеграла.

Def 1.1.1. Кусочная дифференцируемая функция $F(x)$ называется первообразной для функции $f(x)$, если $F'(x) = f(x)$.

Теорема 1.1.2. Разность двух первообразных для одной и той же функции — константа.

Доказательство. Пусть дана функция $f(x)$ и две её первообразные $F_1(x)$, $F_2(x)$. Обозначим разность как $\varphi(x) = F_1(x) - F_2(x)$. Производная этой функции будет равна $\varphi'(x) = (F_1(x) - F_2(x))' = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0$.

Из множества дифференцируемости $F_1(x)$ и $F_2(x)$ выберем наименьшее и выделим в нем отрезок $[a; x]$. По т. Лагранжа:

$$\exists \xi \in (a; x): \varphi'(\xi) = \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a}$$

Т.к. $\forall \xi: \varphi'(\xi) = 0$, то $\varphi(x) - \varphi(a) = 0$, т.е. $\varphi(x) = \varphi(a)$. Т.к. отрезок произвольный, то это значения функции $\varphi(x)$ равны во всех точках, т.е. она константа. ■

Следствие 1.1.3. Первообразные для $f(x)$ составляют множество функций вида $\{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\}$, где $F(x)$ это какая-либо первообразная.

Def 1.1.4. Семейство первообразных функции $f(x)$ называется неопределенным интегралом функции $f(x)$ по аргументу x .

Замечание 1.1.5. О существовании первообразной

Не для каждой функции существует первообразная, но для каждой непрерывной на отрезке. Даже если первообразная существует, то она не всегда выражается в элементарных функциях, например, $\int e^{-x^2} dx$.

Далее рассмотрим некоторые свойства неопределенного интеграла.

Lm 1.1.6.

$$\int dF(x) = F(x) + C$$

Доказательство.

$$dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx \implies \int dF(x) = \int f(x)dx = F(x) + C$$

■

Lm 1.1.7.

$$\left(\int f(x)dx \right)' = f(x)$$

Доказательство.

$$\left(\int f(x)dx \right)' = (F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$$

■

Lm 1.1.8. Линейность

$$\begin{aligned} \int \alpha f(x)dx &= \alpha \int f(x)dx \\ \int (f(x) + g(x))dx &= \int f(x)dx + \int g(x)dx \end{aligned}$$

Доказательство.

$$\int \alpha f(x) dx = \int d(\alpha F(x)) = \alpha F(x) + C$$

При первом переходе используется свойство линейности дифференциала, а при втором — 1.1.6. Доказательство для суммы функций аналогично. ■

1.2. Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям.

Замечание 1.2.1. Интеграл сохраняет инвариантность своей формы, т.е.

$$\int f(\clubsuit) d\clubsuit = F(\clubsuit) + C$$

Теорема 1.2.2. О замене производной в неопределенном интеграле

Если $x = \varphi(t)$, где $\varphi(t)$ обратимая и дифференцируемая функция, то

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Доказательство. Возьмем производные от обеих частей:

$$\begin{aligned} \left(\int f(x) dx \right)'_x &= f(x) \\ \left(\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \right)'_x &= \left(\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \right)'_t \frac{dt}{dx} \stackrel{1.1.7}{=} f(\varphi(t)) \varphi'(t) \frac{dt}{dx} = f(\varphi(t)) \varphi'(t) \frac{1}{\varphi'(t)} = f(\varphi(t)) = f(x) \end{aligned}$$

Замечание 1.2.3. Формула работает в обе стороны:

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx \stackrel{\sqrt{x}=t}{=} \int \frac{e^t}{t} 2t dt = 2e^t + C = 2e^{\sqrt{x}} + C$$

$$\int e^{x^2} \underbrace{2x dx}_{dx^2} \stackrel{x^2=t}{=} \int e^t dt = e^t + C = e^{x^2} + C$$

Теорема 1.2.4. Интегрирование по частям

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Доказательство. Рассмотрим равенство $(uv)' = u'v + uv'$ и проинтегрируем обе его части:

$$\begin{aligned} (uv)' &= u'v + uv' \\ \int (uv)' dx &= \int u'v + uv' dx \\ uv &= \int u'v dx + \int uv' dx && \text{Линейность интеграла (1.1.8)} \\ uv &= \int v du + \int u dv && \text{Внесение под дифференциал (1.2.2)} \\ \int u dv &= uv - \int u dv \end{aligned}$$

Замечание 1.2.5. Интегрирование по частям используется если $\int v du$ вычисляется проще, чем интеграл $\int u dv$. В качестве функции u выбирают ту, которая упрощается при дифференцировании.

TODO: Замена на гиперболическую функцию

1.3. Интегрирование рациональных функций (общая схема). Разложение дроби на простейшие.

Выделим 4 типа простейших дробей:

$$(I): \frac{A}{x-a} \quad (II): \frac{A}{(x-a)^2} \quad (III): \frac{Mx+N}{x^2+px+q} \quad (IV): \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}$$

где (x^2+px+q) неразложимый на множители многочлен, а A, M, N — неопределенные коэффициенты.

Метод неопределенных коэффициентов:

Пусть дана дробь $\frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$, в которой $Q_m(x)$ и $P_n(x)$ это многочлены с вещественными коэффициентами. Требуется разложить её на простейшие.

1. Если $m \geq n$, то необходимо выделить целую часть. Далее будем считать, что $m < n$.
2. Раскладываем знаменатель на множители, т.е. приводим его к виду

$$P_n = a_0(x-x_1)^{b_1} \dots (x-x_t)^{b_t}(x^2+p_1x+q_1)^{c_1} \dots (x^2+p_rx+q_r)^{c_r}$$

3. Для каждой скобки в знаменателе записываем некоторую дробь по следующему правилу:

$$\begin{aligned} (x-x_i) &\rightarrow \frac{A}{x-x_i} \\ (x-x_i)^k &\rightarrow \frac{A}{x-x_i} + \dots + \frac{A}{(x-x_i)^k} \\ (x^2+p_ix+q_i) &\rightarrow \frac{Ax+B}{x^2+p_ix+q_i} \\ (x^2+p_ix+q_i)^k &\rightarrow \frac{Ax+B}{x^2+p_ix+q_i} + \dots + \frac{Ax+B}{(x^2+p_ix+q_i)^k} \end{aligned}$$

У каждой скобки будет свой набор констант.

4. Получаем уравнение относительно коэффициентов A, B, \dots , которые находятся в числителе полученных дробей.
5. Приводит полученную дробь к общему знаменателю и приравниваем её к исходной дроби.
6. Т.к. знаменатели полученных дробей равны, то должны быть равны и числители. Пользуемся тем, что два полинома равны когда равны все коэффициенты перед одинаковыми степенями. Получаем систему уравнений (по количеству коэффициентов).
7. Решаем систему, находим коэффициенты. Подставляем их в разложение исходной дроби на сумму простейших дробей.

Теперь интегрирование рациональных дробей свелось к тому, чтобы разложить их на простейшие, а потом, пользуясь линейностью интеграла (1.1.8), проинтегрировать каждую из дробей по-отдельности. Подробнее об интегрировании простейших дробей написано в вопросе 1.4.

1.4. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование простейших дробей 1,2,3.

1.5. Интегрирование тригонометрических функций. Универсальная тригонометрическая подстановка.

1.6. Интегрирование тригонометрических функций вида $R(\sin^m x, \cos^m x)$, $R(\sin mx, \cos mx)$.

1.7. Интегрирование некоторых иррациональных функций, метод тригонометрической подстановки.

1.8. Определенный интеграл. Определение, свойства линейности и аддитивности.

1.9. Геометрический смысл определенного интеграла. Оценка определенного интеграла. Теорема о среднем.

1.10. Интеграл с переменным верхним пределом. Теорема Барроу.

- 1.11. Вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.
- 1.12. Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям.
- 1.13. Приложения определенного интеграла: вычисление площадей в декартовых координатах.
- 1.14. Приложения определенного интеграла: вычисление площади криволинейного сектора в полярных координатах.
- 1.15. Приложения определенного интеграла: вычисление длины дуги кривой (вывод формулы).
- 1.16. Приложения определенного интеграла: вычисление длины дуги кривой, заданной параметрически.
- 1.17. Приложения определенного интеграла: вычисление объемов тел с известными площадями сечений и тел вращения.
- 1.18. Несобственные интегралы 1-го рода (на неограниченном промежутке). Определение и свойства.
- 1.19. Вычисление несобственного интеграла 1-го рода: формула Ньютона-Лейбница, интегрирование по частям, замена переменной.
- 1.20. Несобственные интегралы 2-го рода (от неограниченной функции). Определение, вычисление и свойства.
- 1.21. Признаки сходимости несобственных интегралов: первый признак сравнения (в неравенствах).
- 1.22. Признаки сходимости несобственных интегралов: второй признак сравнения (предельный).
- 1.23. Признаки сходимости несобственных интегралов: теорема об абсолютной сходимости. Понятие условной сходимости.
- 1.24. Сходимость интегралов 1-го и 2-го рода от степенных функций.

2. Интегрирование функции нескольких переменных

- 2.1. Двойной интеграл. Определение и свойства.
- 2.2. Вычисление двойного интеграла. Кратный интеграл.
- 2.3. Определение и вычисление тройного интеграла.
- 2.4. Криволинейные координаты.
- 2.5. Замена переменных в двойном и тройном интегралах. Якобиан.
- 2.6. Криволинейный интеграл 1-го рода: определение, свойства, вычисление, геометрический и физический смысл.
- 2.7. Криволинейный интеграл 2-го рода как работа силы вдоль пути. Определение, вычисление и свойства.
- 2.8. Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода: формула связи.
- 2.9. Теорема (формула) Грина.
- 2.10. Интегралы, не зависящие от пути интегрирования. Теорема о независимости интеграла от пути, равносильность I, II, III утверждений.
- 2.11. Интегралы, не зависящие от пути интегрирования. Теорема о независимости интеграла от пути, равносильность III, IV утверждений.
- 2.12. Следствие теоремы о независимости от пути (формула Ньютона-Лейбница).
- 2.13. Поверхностный интеграл 1-го рода: определение, свойства, вычисление, геометрический и физический смысл.
- 2.14. Поверхностный интеграл 2-го рода как поток жидкости через поверхность.
- 2.15. Связь между поверхностными интегралами 1-го и 2-го рода.
- 2.16. Поверхностный интеграл 2-го рода: математическое определение, вычисление, свойства.
- 2.17. Теорема Гаусса-Остроградского.
- 2.18. Теорема Стокса.
- 2.19. Скалярное и векторное поля: определения, геометрические характеристики. Дифференциальные и интегральные характеристики полей (определения).
- 2.20. Виды векторных полей и их свойства (теоремы о поле градиента и поле вихря).
- 2.21. Механический смысл потока и дивергенции.
- 2.22. Механический смысл вихря и циркуляции.
- 2.23. Векторная запись теорем теории поля и их механический смысл.