

Лабораторная работа №8

Дисциплина: Научное программирование

Аветисян Давид Артурович

Содержание

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Цель работы | 5 |
| 2 | Задание | 6 |
| 3 | Выполнение лабораторной работы | 7 |
| 4 | Выводы | 13 |

List of Tables

List of Figures

| | | |
|-----|---|----|
| 3.1 | Собственные векторы матрицы A | 7 |
| 3.2 | Собственные векторы матрицы C | 8 |
| 3.3 | Построение таблицы переходов T и векторов вероятности | 9 |
| 3.4 | Вычисление вероятности переходов через 5 шагов | 10 |
| 3.5 | Нахождение вектора равновесного состояния x | 11 |
| 3.6 | Проверка получившегося вектора | 12 |

1 Цель работы

Изучения языка Octave, знакомство с задачей на собственные значения и марковскими цепями.

2 Задание

1. Познакомиться с собственными значениями и собственными векторами.
2. Познакомиться с марковскими цепями.

3 Выполнение лабораторной работы

- 1) Для начала работы с программой включим журналирование сессии командой **diary on**. Найдём собственные векторы матрицы A с помощью команды **eig**.

```
octave:1> diary on
octave:2> A = [1 2 -3; 2 4 0; 1 1 1]
A =

     1     2    -3
     2     4     0
     1     1     1

octave:3> [v lambda] = eig(A)
v =

-0.2400 + 0i -0.7920 + 0i -0.7920 - 0i
-0.9139 + 0i  0.4523 + 0.1226i  0.4523 - 0.1226i
-0.3273 + 0i  0.2322 + 0.3152i  0.2322 - 0.3152i

lambda =

Diagonal Matrix

 4.5251 + 0i      0      0
      0  0.7374 + 0.8844i      0
      0      0  0.7374 - 0.8844i
```

Figure 3.1: Собственные векторы матрицы A

Теперь попробуем получить матрицу с действительными значениями. Для этого посчитаем матрицу C и найдём её вектора.

```

octave:4> C = A' * A
C =

     6     11     -2
    11     21     -5
    -2     -5     10

octave:5> [v lambda] = eig(C)
v =

    0.876137    0.188733   -0.443581
   -0.477715    0.216620   -0.851390
   -0.064597    0.957839    0.279949

lambda =

Diagonal Matrix

    0.1497         0         0
         0    8.4751         0
         0         0   28.3752

octave:6> 

```

Figure 3.2: Собственные векторы матрицы C

- 2) Теперь перейдём к теме марковских цепей. Построим таблицу переходов T и векторов вероятности переходов.


```
octave:6> T = [1 0.5 0 0 0; 0 0 0.5 0 0; 0 0.5 0 0.5 0; 0 0 0.5 0 0; 0 0 0 0.5 1];
octave:7> a = [0.2; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2];
octave:8> b = [0.5; 0; 0; 0; 0.5];
octave:9> c = [0; 1; 0; 0; 0];
octave:10> d = [0; 0; 1; 0; 0];
```

Figure 3.3: Построение таблицы переходов T и векторов вероятности

Вычислим вероятности переходов через 5 шагов. Для этого нужно возвести матрицу T в 5-ю степень и умножить на вектор.

```

octave:11> T^5 * a
ans =

    0.450000
    0.025000
    0.050000
    0.025000
    0.450000

octave:12> T^5 * b
ans =

    0.5000
         0
         0
         0
    0.5000

octave:13> T^5 * c
ans =

    0.6875
         0
    0.1250
         0
    0.1875

octave:14> T^5 * d
ans =

    0.3750
    0.1250
         0
    0.1250
    0.3750

```

Figure 3.4: Вычисление вероятности переходов через 5 шагов

Теперь найдём вектор равновесного состояния x . Для этого найдём собственные значения матрицы и применим формулу.

```
octave:15> T = [0.48 0.51 0.14; 0.29 0.04 0.52; 0.23 0.45 0.34]
T =

    0.480000    0.510000    0.140000
    0.290000    0.040000    0.520000
    0.230000    0.450000    0.340000

octave:16> [v lambda] = eig(T)
v =

   -0.6484   -0.8011    0.4325
   -0.5046    0.2639   -0.8160
   -0.5700    0.5372    0.3835

lambda =

Diagonal Matrix

    1.0000         0         0
         0    0.2181         0
         0         0   -0.3581

octave:17> x = v(:,1)/sum(v(:,1))
x =

    0.3763
    0.2929
    0.3308
```

Figure 3.5: Нахождение вектора равновесного состояния x

Проверим, является ли получившийся вектор равновесным.

```
octave:18> T^10 * x
ans =

    0.3763
    0.2929
    0.3308

octave:19> T^50 * x
ans =

    0.3763
    0.2929
    0.3308

octave:20> T^50 * x - T^10 * x
ans =

    4.4409e-16
    2.7756e-16
    3.8858e-16

octave:21> diary off
```

Figure 3.6: Проверка получившегося вектора

Как видим, разница между состояниями минимальная, а значит наши вычисления правильны.

4 Выводы

Я познакомился с задачей на собственные значения и марковскими цепями.