vtwonen

SAMPLE SALE, OP = OP

country klantenservice volg ons mijn account

HOME SHOP MAGAZINE

VTWONEN COLLECTIE

INSPIRATIE

winkelwagen VERBOUWEN

TUIN

vtwonen > tuinieren > plantenindex > appel

appel

malus 'cox's orange

pippin'

wat voor een soort appel is de 'cox's orange pippin'?

De appels van Malus domestica 'Cox's Orange Pippin' zijn heerlijk zoet en sappig. Kenners zeggen dat dit de beste appel is om voor desserts te gebruiken. 'Cox's Orange Pippin' appels kunnen van november tot januari gegeten worden.

geschiedenis van de appel

Het geslacht Malus kan grofweg ingedeeld worden in twee typen appels: sierappels en consumptieappels. De sierappels worden gekweekt vanwege hun



winterhardheid

goed

grondsoort

voorkeur voor niet te zware neut

vochtigheid

matig vochtig

licht

volle zon

bloemkleur

wit

bloeitijd

mei - mei

cult

'cox's orange pippin'

hoogte

afhankelijk van onderstam tot een paar meter hoog

blad / loof

bladverliezend

verzorging

mooie kleur. Ze zijn minder lekker dan de consumptieappels, zoals de 'Cox's Orange Pippin'. Over de hele wereld zijn duizenden appelrassen voor consumptie bekend. Ze stammen af van de nog altijd in de Kaukasus aanwezige Malus sieversii. Tijdens de handel langs de zijderoute zijn de appels, waaronder 'Cox's Orange Pippin', verspreid naar het Romeinse Rijk alwaar de teelt van appels zich ontwikkelde. Van hieruit is de appelteelt over Europa verspreid geraakt. Omdat de appel al lang tot het dagelijks eten wordt gerekend zijn er ook veel verhalen over. Van sprookjes zoals Sneeuwwitje tot de Griekse mythologie waarin de twistappel met de tekst 'aan de mooiste' tweespalt onder de godinnen veroorzaakt. Het aardige van appelbomen, waaronder de 'Cox's Orange Pippin' is dat ze voor vruchten in het najaar maar ook voor mooie bloesem in het voorjaar en een prima bladerdek in de zomer zorgen. Voor goede vruchtvorming, zowel in aantal als grootte, hebben bijna alle appelrassen kruisbestuiving nodig. Dat betekent dat minimaal twee appelrassen elkaar moeten bestuiven.

vruchtdunning in de zomer. steun zwaar beladen takken.

snoeien

snoei in winter en zomer.

bemesten

koemestkorrels in het voorjaar.

bijzonderheden

vruchten vanaf september

hoe onderhoud ik de

'cox's orange pippin'?

Na het planten duurt het meestal drie jaar voor de boom vrucht draagt. Om vorming ervan te stimuleren dient de groei geremd te worden. Dit doen we door snoei, takken buigen en vruchtdunning. Snoei van fruitbomen is complex, waardoor veel mensen bang worden om te knippen. Kom jeer niet uit, vraag dan een vakman, bijvoorbeeld een hovenier of volg een snoeicursus. Snoei twee keer per jaar. Eerst in de winter. Je verwijdert alle zieke, dode en verkeerd geplaatste takken. Zaag de takken glad af. Laat geen stompen zitten. Alle gesteltakken (die het 'skelet' vormen van de boom) worden met een derde ingekort. Herhaal snoei in de zomer. Je snoeit de sterk verticaal groeiende scheuten zo dicht mogelijk bij de stam af. Verder worden de eenjarige scheuten teruggesnoeid tot vijf ogen. Kortere eenjarige takken gewoon laten zitten. Rem de groei verder door takken horizontaal te buigen. Verbind daarvoor touwen tussen de uiteinden van de takken en de stam. Kijk uit dat takken niet te diep doorbuigen. Als ze naar beneden hangen, groeien ze niet meer. Ook vruchtdunning vanaf juni is aan te bevelen. Verwijder alle achterblijvende vruchten en probeer

maximaal een tot twee vruchten per bloemtros over te houden. Meer informatie over bomen planten lees je op de site.

woensdag, 18 april 2012





copyright 2017 Sanoma Media Netherlands B.V.

• vtwonen - onderdeel <u>Sanoma Media Netherlands groep</u> • 📦 thuiswinkel waarborg