

## Übungen zu Analysis 2, 2. Übung 19. 3. 2019

11. Beweisen Sie die Ungleichung von Young: Für  $A, B > 0$ ,  $p, q > 1$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  gilt

$$A^{\frac{1}{p}} B^{\frac{1}{q}} \leq \frac{A}{p} + \frac{B}{q}$$

Hinw.: Verwenden Sie die Konvexität der Exponentialfunktion.

12. Beweisen Sie die Ungleichung von Hölder: Für  $p, q > 1$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  gilt für  $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$

$$\sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leq \left( \sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} \left( \sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{1/q}$$

13. Zeigen Sie, dass für  $1 \leq p < \infty$   $(\sum_{n=1}^n x_n^p)^{1/p}$  eine Norm auf  $\mathbb{R}^n$  ist. Hinw.: Für die Dreiecksungleichung zeige man

$$\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \leq \sum_{k=1}^n |x_k| |x_k + y_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^n |y_k| |x_k + y_k|^{p-1}$$

und wende die Hölder-Ungleichung an.

14. Man zeige, dass alle Normen  $\|\cdot\|_p$ ,  $\|\cdot\|_q$  für  $1 \leq p, q \leq \infty$  auf  $\mathbb{R}^n$  äquivalent sind. Man zeige insbesondere, dass für  $(1 \leq p < q < \infty)$   $\|\cdot\|_p \geq \|\cdot\|_q \geq \|\cdot\|_\infty$  Hinweis: Man verwende, dass aus  $0 < p < q$  und  $\lambda \in [0, 1]$   $\lambda^q \leq \lambda^p$  folgt.

15. Bestimmen Sie die Operatornormen der Identität als Abbildung

$$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_q) \text{ für } 1 \leq p < q \leq \infty$$

und von

$$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1),$$

sowie von  $A_x : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ ,  $A_x y = (x, y) (\langle \cdot, \cdot \rangle \text{ Skalarprodukt})$ .

16. Zeigen Sie, dass die Gruppe  $SO(n)$  der orthogonalen  $n \times n$ -Matrizen mit Determinante 1 abgeschlossen in  $GL(n)$  ist, wenn man  $GL(n)$  als Teilmenge des  $\mathbb{R}^{n \times n}$  auffasst.

Hinw.: Verwenden Sie, dass eine  $n \times n$ -Matrix genau dann orthogonal ist, wenn alle ihre Spaltenvektoren Euklidische Norm 1 haben und ihre Determinante  $\pm 1$  ist. Verwenden Sie dann Prop. 6.1.12.

17. Zeigen Sie, dass für  $A : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$  und  $\|A\| < \ln 2$  die Abbildung  $x \mapsto e^A x$  bijektiv ist.
18. Zeigen Sie, dass für  $r, s \in \mathbb{R}$  und  $A$  eine  $n \times n$ -Matrix  $e^{rA} e^{sA} = e^{(r+s)A}$  gilt.  
Hinweis: Berechnen Sie  $\frac{d}{dr}(e^{rA} e^{(u-r)A})$ .

19. Für

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto \begin{pmatrix} t \cosh t \\ te^{t^2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

berechne man  $\int_0^1 F(t) dt$  und  $F'$ .

20. Berechnen Sie die Abbildungsnorm der lin. Abbildung  $T$ :

$$Tf(x) = \begin{pmatrix} \int_0^x f(t) dt \\ \int_x^1 f(s) dt \end{pmatrix}$$

als Abbildung

$$(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty) \rightarrow ((C[0, 1], \|\cdot\|_\infty) \times (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty), \|\cdot\|_1)$$

bzw. nach

$$(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty) \rightarrow ((C[0, 1], \|\cdot\|_\infty) \times (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty), \|\cdot\|_\infty).$$