

1. Sei Ω eine **beschränkte** Teilmenge von \mathbb{R}^n mit C^∞ -Rand und 1_Ω ihre Indikatorfunktion. Zeigen Sie

$$\langle \Delta 1_\Omega, \varphi \rangle = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial \varphi}{\partial \nu} ds,$$

wobei ν der äußere Normaleneinheitsvektor auf $\partial\Omega$ ist.

$$\begin{aligned} \langle \Delta 1_\Omega, \varphi \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 1_\Omega}{\partial x_i^2}, \varphi \right\rangle = \sum_{i=1}^n \left\langle \frac{\partial^2 1_\Omega}{\partial x_i^2}, \varphi \right\rangle = \sum_{i=1}^n \left\langle 1_\Omega, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i^2} \right\rangle = \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} 1_\Omega \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i^2} d\lambda^n = \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} 1_\Omega \Delta \varphi d\lambda^n = \int_\Omega \Delta \varphi d\lambda^n \stackrel{(1)}{=} \int_{\partial, \Omega} 1 \frac{\partial \varphi}{\partial \nu} dH^{n-1} - \int_\Omega (\nabla \varphi)^T \underbrace{\nabla 1}_=0 d\lambda^n = \int_{\partial, \Omega} \frac{\partial \varphi}{\partial \nu} dH^{n-1} \stackrel{(2)}{=} \int_{\partial\Omega} \frac{\partial \varphi}{\partial \nu} dH^{n-1} \end{aligned}$$

(1) Blumhagen Satz 5.3.9: Erster Green'scher Integralsatz; bzw. Satz 1.5

Was fehlt? Ω offen?

Fragen: Warum braucht man $\partial\Omega \in C^\infty$; reicht $\partial\Omega \in C^1$?

Ist ein C^∞ -Rand überall regulär nach Blumhagen-Definition?

2. Zeigen Sie, dass

$$F = \frac{1}{\sigma_n} \frac{x}{|x|^n}$$

eine Fundamentallösung des Differentialoperators $L(u) = \operatorname{div} u$ auf \mathbb{R}^n ist, wobei σ_n die Oberfläche der Einheitskugel in \mathbb{R}^n ist. Achtung: obwohl F eigentlich eine vektorwertige Distribution in $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)^n$ ist, wird das nicht gebraucht um die Behauptung

$$\langle \operatorname{div} F, \varphi \rangle = \varphi(0)$$

zu zeigen, da $\operatorname{div} F = \frac{1}{\sigma_n} \sum_i \partial_i \left(\frac{x_i}{|x|^n} \right) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ist.

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{\sigma_n} \sum_{i=1}^n \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{x_i}{|x|^n} \partial_i \varphi(x) dx = -\frac{1}{\sigma_n} \sum_{i=1}^n \int_{\Omega_\varepsilon} \int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{x_i}{|x|^n} \partial_i \varphi(x) dx_i dz_i \quad y_{i,1} = (x_1, \dots, x_{i-1}, \varepsilon, x_{i+1}, \dots, x_n) \\ & = -\frac{1}{\sigma_n} \sum_{i=1}^n \int_{\Omega_\varepsilon} \left(\frac{x_i}{|x|^n} \varphi(x) \Big|_{x_i=-\infty}^{-\varepsilon} + \frac{x_i}{|x|^n} \varphi(x) \Big|_{x_i=\varepsilon}^{\infty} - \int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \left(\frac{1}{|x|^n} - \frac{n x_i^2}{|x|^{n+2}} \right) \varphi(x) dx_i \right) dz_i \quad y_{i,2} = (x_1, \dots, x_{i-1}, -\varepsilon, x_{i+1}, \dots, x_n) \\ & = -\frac{1}{\sigma_n} \sum_{i=1}^n \left(\int_{\Omega_\varepsilon} \left(\frac{-\varepsilon \varphi(y_{i,1})}{|y_{i,1}|^n} - \frac{\varepsilon \varphi(y_{i,2})}{|y_{i,2}|^n} \right) dz_i + \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{n x_i^2}{|x|^{n+2}} \varphi(x) dx - \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{1}{|x|^n} \varphi(x) dx \right) \quad |y_{i,1}| = |y_{i,2}| \\ & = \frac{\varepsilon}{\sigma_n} \sum_{i=1}^n \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{\varphi(y_{i,1}) + \varphi(y_{i,2})}{|y_{i,1}|^n} dz_i + \frac{n}{\sigma_n} \left(\int_{\Omega_\varepsilon} \frac{1}{|x|^n} \varphi(x) dx - \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{|x|^2}{|x|^{n+2}} \varphi(x) dx \right) \\ & = \frac{\varepsilon}{\sigma_n} \sum_{i=1}^n \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{\varphi(y_{i,1}) + \varphi(y_{i,2})}{|y_{i,1}|^n} dz_i \quad -\frac{n}{2} - 1 = -\frac{n}{2} - \frac{2}{2} = -\frac{n+2}{2} \end{aligned}$$

$$\partial_i \left(\frac{x_i}{|x|^n} \right) = \partial_i \left(x_i \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{-\frac{n}{2}} \right) = \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{-\frac{n}{2}} - x_i \frac{n}{2} \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{-\frac{n}{2}-1} 2 x_i = \frac{1}{|x|^n} - \frac{n x_i^2}{|x|^{n+2}}$$

$$\frac{1}{\sigma_n} \sum_{i=1}^n \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{x_i}{|x|^n} \partial_i \varphi(x) dx = \int_{\Omega_\varepsilon} F \cdot \nabla \varphi dx$$

3. Gegeben $v \in C^2(\mathbb{R})$, sei $u(x, t) = v(x/\sqrt{t})$ für $t > 0$ und $x \in \mathbb{R}$.

(i) Zeigen Sie:

$$u_t = u_{xx} \iff v''(z) + \frac{z}{2}v'(z) = 0.$$

Berechnen Sie die allgemeine Lösung v und damit u .

(ii) Wählen sie die Konstanten in u so, dass

$$\lim_{t \rightarrow 0+} u(t, x) = 0 \text{ für } x < 0, \quad \lim_{t \rightarrow 0+} u(t, x) = 1 \text{ für } x > 0.$$

(iii) Zeigen Sie, dass für $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ die Funktion $f(x, t) = ((\partial_x u(\cdot, t)) * \varphi)(x)$ (Faltung in der x -Variablen) folgendes Anfangswertproblem für die Wärmeleitungsgleichung löst:

$$f_t - f_{xx} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} f(t, x) = \varphi(x)$$

$$(i) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} (v(x t^{-1/2})) = v'(x t^{-1/2}) \cdot (-\frac{1}{2}) x t^{-3/2} \quad \text{und} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(v'(\frac{x}{\sqrt{t}}) \frac{1}{\sqrt{t}} \right) = v''(\frac{x}{\sqrt{t}}) \frac{1}{\sqrt{t}}$$

$$\text{also } u_t = u_{xx} \iff -v'(\frac{x}{\sqrt{t}}) \frac{1}{2} x t^{-3/2} = v''(\frac{x}{\sqrt{t}}) t^{-1} \iff v''(\frac{x}{\sqrt{t}}) + v'(\frac{x}{\sqrt{t}}) \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{t}} = 0 \quad (\Rightarrow) \quad v''(z) + \frac{z}{2} v'(z) = 0$$

$$\text{Betrachte also } v''(z) + \frac{z}{2} v'(z) = 0 \quad \text{also} \quad v''(z) = -\frac{z}{2} v'(z) \quad \leadsto \quad 2 \frac{v''}{v'} = -z \quad \leadsto \quad (\ln(v'))' = -\frac{z}{2}$$

$$\leadsto \ln(v') = -\frac{z^2}{4} + c_1 \quad \leadsto \quad v' = c_2 e^{-\frac{z^2}{4}} \quad \leadsto \quad v(z) = c_2 \int_{-\infty}^z e^{-\frac{y^2}{4}} dy + c_3 \quad \left| \begin{array}{l} \frac{dy}{dz} = \frac{1}{\sqrt{t}} \\ \frac{dz}{dy} = 2\sqrt{t} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} s = \frac{y}{2} \\ \frac{ds}{dy} = \frac{1}{2} \end{array} \right| = 2c_2 \int_{-\infty}^{\frac{z}{2}} e^{-s^2} ds$$

$$\text{also } u(x, t) = \frac{c_4}{\sqrt{t}} \int_{-\infty}^{\frac{x}{\sqrt{t}}} e^{-s^2} ds + c_3$$

vgl. Kalkenbrück Bsp. 8.7.13

$$(ii) \quad x < 0: \lim_{t \rightarrow 0+} u(x, t) = c_3 \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{und} \quad x > 0: \lim_{t \rightarrow 0+} u(x, t) = c_4 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-s^2} ds \stackrel{!}{=} c_4 \sqrt{\pi} \stackrel{!}{=} 1 \quad \text{also } c_4 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$$\text{damit } u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x}{\sqrt{t}}} e^{-s^2} ds \quad \left| \begin{array}{l} r = 2\sqrt{t}s \\ \frac{dr}{ds} = 2\sqrt{t} \\ \frac{ds}{dr} = \frac{1}{2\sqrt{t}} \end{array} \right| = \frac{1}{2\sqrt{t\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{r^2}{4t}} dr$$

$$(iii) \quad \partial_x u(\cdot, t) = \frac{1}{2\sqrt{t\pi}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \quad \text{also; } f(x, t) = ((\partial_x u(\cdot, t)) * \varphi)(x) = \frac{1}{2\sqrt{t\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{y^2}{4t}} \varphi(x-y) dy$$

4. Zeigen Sie: Die Funktion

$$u(x, y) = (8\pi)^{-1} (x^2 + y^2) \ln \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0)$$

ist eine Fundamentallösung von Δ^2 mit Pol in $(0, 0)$ im \mathbb{R}^2 , wobei

$$\Delta^2 u = \Delta(\Delta u) = \sum_{i,j=1}^2 u_{x_i x_i x_j x_j}.$$

$$\langle \Delta^2 u, \varphi \rangle = 2 \langle \frac{\partial^2 u}{\partial x^2 \partial y^2}, \varphi \rangle + \langle \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}, \varphi \rangle + \langle \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}, \varphi \rangle$$

$$\langle \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}, \varphi \rangle = \langle u, \frac{\partial^4 \varphi}{\partial x^4} \rangle$$

$$K \subseteq \mathbb{R}^2, K \text{ kompakt: } \int_K |u| d\lambda^2 \leq \int_0^{2\pi} \int_0^R |(8\pi)^{-1} s^2 \ln(s) s| ds d\varphi \leq \int_0^{2\pi} \left(\int_0^R \frac{1}{4} s^2 \ln(s) ds - \frac{1}{16} s^4 \right)' d\varphi < \infty$$

also ist $u \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^2)$ und mit $\Omega_\varepsilon := \mathbb{R}^2 \setminus \{z \in \mathbb{R}^2 : \|z\| < \varepsilon\}$ gilt

$$\langle u, \frac{\partial^4 \varphi}{\partial x^4} \rangle = \int_{\Omega_\varepsilon} u \frac{\partial^4 \varphi}{\partial x^4} d\lambda^2$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (8\pi)^{-1} \left(2x \ln(\sqrt{x^2+y^2}) + x^2 \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} + y^2 \ln(x^2+y^2) \right) = (8\pi)^{-1} \left((2x+y^2) \ln(\sqrt{x^2+y^2}) + \frac{1}{2} \frac{x^2}{x^2+y^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (8\pi)^{-1} \left((2+y^2) \ln(\sqrt{x^2+y^2}) + (2x+y^2) \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{2} \left(2x(x^2+y^2)^{-1} - x^2(x^2+y^2)^{-2} 2x \right) \right) =$$

$$= (8\pi)^{-1} \left((2+y^2) \ln(\sqrt{x^2+y^2}) + \frac{2x}{x^2+y^2} + \frac{1}{2} \frac{y^2}{x^2+y^2} - \frac{2x^3}{(x^2+y^2)^2} \right) =$$

$$= (8\pi)^{-1} \left((2+y^2) \ln(\sqrt{x^2+y^2}) + \frac{2xy^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{1}{2} \frac{y^2}{x^2+y^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (8\pi)^{-1} \left((2+y^2) \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \right)$$

$$u(r) = (8\pi)^{-1} r^2 \ln(r) \rightarrow u'(r) = (8\pi)^{-1} (r^2 \ln(r) + r) = (8\pi)^{-1} r (2 \ln(r) + 1)$$

$$u''(r) = (8\pi)^{-1} \left((2 \ln(r) + 1) + r \cdot 2 \frac{1}{r} \right) = (8\pi)^{-1} (2 \ln(r) + 3) =$$

$$\Delta u(r) = u''(r) + \frac{1}{r} u'(r) = \frac{1}{4\pi} \ln(r) + \frac{3}{8\pi} + \frac{1}{4\pi} \ln(r) + \frac{1}{8\pi} = \frac{1}{2\pi} \ln(r) + \frac{1}{2\pi} \quad \text{erfüllt laut Störterm} \quad \Delta(u) = \delta_0$$

5. Bestimmen Sie die formal adjungierten Operatoren von

- (i) $L\phi = a(x, y)\phi_x + b(x, y)\phi_y + c(x, y)\phi, \quad \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2),$
 - (ii) $L\phi = x^2\phi'' + \phi' - 3x^2\phi, \quad \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$
 - (iii) $L\phi = \Delta\phi + v(x) \cdot \nabla\phi, \quad \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n),$
- mit $a, b, c \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ und $v \in C^\infty(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$.

$$(i) \quad L^* \varphi = -\partial_x(a\varphi) - \partial_y(b\varphi) + c\varphi = -\partial_x a \varphi - a \partial_x \varphi - \partial_y b \varphi - b \partial_y \varphi + c\varphi$$

$$(ii) \quad L^* \varphi = (x^2 \varphi)'' - \varphi' - 3x^2 \varphi = (2x\varphi + x^2 \varphi')' - \varphi' - 3x^2 \varphi = 2\varphi + 2x\varphi' + 2x\varphi' + x^2 \varphi'' - \varphi' - 3x^2 \varphi = x^2 \varphi'' + (2x-1)\varphi' + (2-3x^2)\varphi$$

$$(iii) \quad L\phi = \sum_{i=1}^n (\partial_{x_i x_i} \phi + v_i \partial_{x_i} \phi)$$

$$L^* \phi = \sum_{i=1}^n (\partial_{x_i x_i} \phi - \partial_{x_i} (v_i \phi)) = \sum_{i=1}^n (\partial_{x_i x_i} \phi - \partial_{x_i} v_i \phi - v_i \partial_{x_i} \phi) = \Delta \phi - \nabla v \cdot \phi - v \cdot \nabla \phi$$

6. Bestimmen Sie eine Fundamentallösung von ∂^α in \mathbb{R}^n mit Träger in

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0 \forall i = 1 \dots n\},$$

wobei alle $\alpha_i > 0$ sind.

$$n=1: \quad k=1: \quad u_1 = \mathbb{1}_{[0, \infty[} \rightarrow \langle u_1', \phi \rangle = -\langle u_1, \phi' \rangle = -\int_0^\infty \phi'(x) dx = -\left(\lim_{r \rightarrow \infty} \phi(r) - \phi(0)\right) = \phi(0)$$

$$k=2: \quad u_2 = \text{id} \mathbb{1}_{[0, \infty[} \rightarrow \langle u_2'', \phi \rangle = \langle u_2, \phi'' \rangle = \int_0^\infty x \phi''(x) dx = \left[x \phi'(x)\right]_0^\infty - \int_0^\infty \phi'(x) dx = \phi(0)$$

$$k=3: \quad u_3(x) = \frac{x^2}{2} \mathbb{1}_{[0, \infty[}(x) \rightarrow \langle u_3''', \phi \rangle = -\langle u_3, \phi''' \rangle = -\int_0^\infty \frac{x^2}{2} \phi'''(x) dx = \left[-\frac{x^2}{2} \phi''(x)\right]_0^\infty + \int_0^\infty x \phi''(x) dx = \phi(0)$$

$$\text{ang.} \quad u_k(x) = \frac{x^k}{k!} \mathbb{1}_{[0, \infty[}(x) \text{ mit } \langle u_k^{(k)}, \phi \rangle = \phi(0)$$

$$\text{b. gelte } u_{k+1}(x) = \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \mathbb{1}_{[0, \infty[}(x) \text{ erfüllt } \langle u_{k+1}^{(k+1)}, \phi \rangle = (-1)^{k+1} \langle u_{k+1}, \phi^{(k+1)} \rangle = (-1)^{k+1} \int_0^\infty \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \phi^{(k+1)}(x) dx$$

$$= \left[(-1)^{k+1} \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \phi^{(k)}(x)\right]_0^\infty + (-1)^{k+2} \int_0^\infty \frac{x^k}{k!} \phi^{(k)}(x) dx = (-1)^k \int_0^\infty \frac{x^k}{k!} \phi^{(k)}(x) dx = (-1)^k \langle u_k, \phi^{(k)} \rangle = \langle u_k^{(k)}, \phi \rangle = \phi(0)$$

$$\text{Behauptung: } u_{n,\alpha}(x) = \left(\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i} \mathbb{1}_{[0, \infty[}(x_i)\right) \left(\prod_{i=1}^n \alpha_i!\right)^{-1}$$

$$\langle \partial^\alpha u_{n,\alpha}, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u_{n,\alpha}, \partial^\alpha \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \left(\prod_{i=1}^n \alpha_i!\right)^{-1} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i} \mathbb{1}_{[0, \infty[}(x_i)\right) \int_0^{\frac{x_{n+1}}{\alpha_{n+1}!}} \partial^\alpha \phi(x) dx_{n+1} dx'$$

$$= (-1)^{|\alpha|} \left(\prod_{i=1}^n \alpha_i!\right)^{-1} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i} \mathbb{1}_{[0, \infty[}(x_i)\right) \partial^\alpha \phi(x', 0) dx' = \langle \partial^\alpha u_{n,\alpha}, \phi \rangle = \phi(0)$$

wobei $x' = (x_1, \dots, x_n)$
 $\alpha' = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

7. Bestimmen Sie Fundamentallösungen mit Pol an $\xi \in \mathbb{R}$ folgender Differentialoperatoren auf \mathbb{R} :

- (i) $L(u) = u'$
- (ii) $L(u) = u''$
- (iii) $L(u) = u' - au$ ($a \neq 0$) (Hinweis: Bestimmen Sie die allgemeine Lösung u_{hom} der homogenen Differentialgleichung $Lu = 0$ und verwenden Sie einen Ansatz der Form $U_0(x) = C_1 u_{hom}(x)$ für $x < 0$, $U_0(x) = C_2 u_{hom}(x)$ für $x > 0$ mit $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$).

(i) Vermutung: $u_\xi(x) = \left(-\mathbb{1}_{]-\infty, \xi]} + \mathbb{1}_{]\xi, \infty[} \right) \frac{1}{2}$

$$\langle u_\xi', \phi \rangle = -\langle u_\xi, \phi' \rangle = \left(\int_{-\infty}^{\xi} \phi'(x) dx - \int_{\xi}^{\infty} \phi'(x) dx \right) \frac{1}{2} = \phi(\xi)$$

(ii) $u_\xi(x) = x(\xi-1) \mathbb{1}_{]-\infty, \xi]} + (\xi-1) \mathbb{1}_{]\xi, \infty[}$; siehe dazu Jüngel Beispiel 3.20

(iii) $u' - au = 0 \rightarrow$ charakteristisches Polynom $\chi(\lambda) = \lambda - a$ also $u_{hom}(x) = C e^{ax}$

Ansatz: $U_0(x) = C_1 e^{ax} \mathbb{1}_{]-\infty, 0]} + C_2 e^{ax} \mathbb{1}_{]0, \infty[}$

$$\langle U_0', \phi \rangle = -C_1 \int_{-\infty}^0 e^{ax} \phi'(x) dx - C_2 \int_0^{\infty} e^{ax} \phi'(x) dx = [-C_1 e^{ax} \phi(x)]_{-\infty}^0 + C_1 a \int_{-\infty}^0 e^{ax} \phi(x) dx + [-C_2 e^{ax} \phi(x)]_0^{\infty} + C_2 a \int_0^{\infty} e^{ax} \phi(x) dx$$

$$a \langle U_0, \phi \rangle = C_1 a \int_{-\infty}^0 e^{ax} \phi(x) dx + C_2 a \int_0^{\infty} e^{ax} \phi(x) dx$$

$$\langle U_0', \phi \rangle - a \langle U_0, \phi \rangle = -C_1 \phi(0) + C_2 \phi(0), \text{ also } C_2 - C_1 \stackrel{!}{=} 1 \text{ wähle } C_1 = \frac{1}{2}, C_2 = -\frac{1}{2}$$

$$\text{daher } U_0(x) = \frac{1}{2} e^{ax} \mathbb{1}_{]0, \infty[} - \frac{1}{2} e^{ax} \mathbb{1}_{]-\infty, 0]}$$

$$U_\xi(x) = T_{-\xi}(U_0)(x) = U_0(x-\xi) = \frac{1}{2} e^{a(x-\xi)} \mathbb{1}_{]0, \infty[} - \frac{1}{2} e^{a(x-\xi)} \mathbb{1}_{]-\infty, 0]}$$