

18/1: Betrachte den Operator T der für $f \in L^1(0,1)$ definiert ist als

$$Tf := \left(\int_0^1 f(t) t^n dt \right)_{n \in \mathbb{N}_0}.$$

Die Zahlen $\int_0^1 f(t) t^n dt$ heißen auch die Momente von f . Zeige, dass T zu $\mathcal{B}(L^1(0,1), C_0(\mathbb{N}_0))$ gehört, und bestimme $T' \in \mathcal{B}(\ell^1(\mathbb{N}_0), L^\infty(0,1))$.

Sei $f \in L^1(0,1)$

$\forall n \in \mathbb{N}_0 \forall t \in [0,1]: |f(t) t^n| \leq |f(t)|$ und $\int_0^1 |f(t)| dt < \infty$, also gilt nach dem Lemma von Fatou (Kudritsch Folgerung 9.32)

$$\limsup_n \left| \int_0^1 f(t) t^n dt \right| \leq \limsup_n \int_0^1 |f(t) t^n| dt \leq \int_0^1 \limsup_n |f(t) t^n| dt = 0,$$

weil $\lim_{n \rightarrow \infty} t^n = 0$ λ -f.ü. und λ -f.ü.: $|f(t)| < \infty$

Also verschwindet Tf im Unendlichen

Stetigkeit ist klar, denn für $\delta < 1$ ist $|n-m| < \delta \Rightarrow n = m \Rightarrow |Tf(n) - Tf(m)| = 0 < \varepsilon$

Also bildet T wirklich nach $C_0(\mathbb{N}_0)$ ab.

Die Linearität von T folgt aus der Linearität des Integrals

$$\text{Für bel. } n \in \mathbb{N}_0 \text{ ist } \left| \int_0^1 f(t) t^n dt \right| \leq \int_0^1 |f(t)| t^n dt \leq \|f\|_1 \|t^n\|_\infty = \|f\|_1$$

$$\|T\| = \sup \{ \|Tf\|_\infty : f \in L^1(0,1), \|f\|_1 \leq 1 \} \leq \sup \{ \|f\|_1 : f \in L^1(0,1), \|f\|_1 \leq 1 \} = 1$$

also ist $T \in \mathcal{B}(L^1(0,1), C_0(\mathbb{N}_0))$

Sei nun $f \in L^1(0,1)$ bel. und $g \in C_0(\mathbb{N}_0)' \cong \ell^1(\mathbb{N}_0)$ bel. Wie in Beispiel 2.3.3.

ausgeführt: $\exists (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \in \ell^1(\mathbb{N}_0): \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \in C_0(\mathbb{N}_0): g((x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}) = \sum_{n \in \mathbb{N}_0} x_n \alpha_n$

$$\langle Tf, g \rangle = g(Tf) = g\left(\left(\int_0^1 f(t) t^n dt\right)_{n \in \mathbb{N}_0}\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}_0} \int_0^1 f(t) t^n dt \alpha_n = \int_0^1 f(t) \left(\sum_{n \in \mathbb{N}_0} t^n \alpha_n\right) dt \stackrel{!}{=} \langle f, T'g \rangle$$

$$\text{wobei } \sum_{n \in \mathbb{N}_0} \int_0^1 f(t) t^n \alpha_n dt = \int_{\mathbb{N}_0} \int_{[0,1]} f(t) t^n \alpha_n d\lambda d\zeta = \int_{[0,1]} \int_{\mathbb{N}_0} f(t) t^n \alpha_n d\lambda d\zeta \text{ nach dem}$$

Satz von Fubini (vgl. Kudritsch Satz 10.24), da $\sum_{n \in \mathbb{N}_0} \int_0^1 |f(t) t^n \alpha_n| dt < \infty$

Also $T': \ell^1(\mathbb{N}_0) \rightarrow L^\infty(0,1) \hookrightarrow (0,1] \rightarrow \mathbb{C}: t \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}_0} t^n \alpha_n$, wobei

$$\left\| \sum_{n \in \mathbb{N}_0} t^n \alpha_n \right\|_\infty \leq \left\| \sum_{n \in \mathbb{N}_0} |t^n| |\alpha_n| \right\|_\infty \leq \left\| \sum_{n \in \mathbb{N}_0} |\alpha_n| \right\|_\infty = \sum_{n \in \mathbb{N}_0} |\alpha_n| < \infty, \quad T'(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \text{ tatsächlich in } L^\infty(0,1)$$

18/2: Seien X, Y kompakte Hausdorff Räume, sei $\tau : Y \rightarrow X$ stetig, und $A \in \mathcal{B}(C(X), C(Y))$ der Operator $Af := f \circ \tau$. Zeige, dass sein Konjugierter $A' \in \mathcal{B}(M(Y), M(X))$ gegeben ist durch

$$(A'\mu)(\Delta) = \mu(\tau^{-1}(\Delta)), \quad \mu \in M(Y), \Delta \subseteq X \text{ Borelmenge.}$$

Da X, Y kompakt sind gilt jedenfalls $C_0(X) = C(X)$ und $C_0(Y) = C(Y)$

Nach dem Darstellungssatz von Riesz-Markow (Satz 2.3.9) ist $C(X) = C_0(X) \cong M_{reg}(X)$

Nun wird hier implizit behauptet $M_{reg}(X) = M(X)$ (Warum?)

Sei $f \in C(X)$ bel. und $g \in C(Y)'$ bel. mit $\mu \in M(Y) : \forall h \in C(Y) : g(h) = \int_Y h d\mu$

Nun ist mit dem Transformationsatz (vgl. Rudolfsch Satz 9.62)

$$\langle Af, g \rangle = g(Af) = g(f \circ \tau) = \int_Y f \circ \tau d\mu = \int_{\tau^{-1}(X)} f \circ \tau d\mu = \int_X f d\mu \tau^{-1}$$

Nun ist $\mu \tau^{-1} \in M(X)$ (vgl. Rudolfsch Satz 8.2)

und $\nu : C(X) \rightarrow \mathbb{C} : f \mapsto \int_X f d\mu \tau^{-1} \in C(X)'$, also $A'g \cong \nu$ und wir schreiben

$$\langle f, A'g \rangle = \int_X f d\mu \tau^{-1}$$

19/1: Betrachte den Shift-Operator S am $\ell^2(\mathbb{N})$, das ist

$$S: \begin{cases} \ell^2(\mathbb{N}) & \rightarrow \ell^2(\mathbb{N}) \\ (x_1, x_2, x_3, \dots) & \mapsto (0, x_1, x_2, \dots) \end{cases}$$

- (a) Zeige dass S isometrisch ist, bestimme $\text{ran } S$ und zeige dass $\text{ran } S$ abgeschlossen ist, und zeige $\bigcap_{n=1}^{\infty} \text{ran}(S^n) = \{0\}$.
- (b) Bestimme die Hilbertraumadjungierte S^* von S , und bestimme $\ker(S^*)$, $\text{ran}(S^*)$, und $\bigcap_{n=1}^{\infty} \text{ran}([S^*]^n)$.

a) „isometrisch“: Sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N})$ bel. $\|S((x_n)_{n \in \mathbb{N}})\|_2 = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2} = \|(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_2$

„ $\text{ran } S$ “: $\text{ran } S = \{(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid y_1 = 0 \wedge \forall n > 1: y_n = x_{n-1} \text{ mit } (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N})\} =$
 $= \{(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N}) \mid y_1 = 0\}$

„ $\text{ran } S$ abq.“: $\text{ran } S^{\perp} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N}) \mid \forall (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \text{ran } S: \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n \overline{y_n} = 0\} =$
 $= \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N}) \mid \forall n > 1: x_n = 0\}$

und offensichtlich ist $(\text{ran } S)^{\perp\perp} = \text{ran } S$ und nach Korollar 3.2.4, da ja $\text{ran } S$ ein linearer TR von $\ell^2(\mathbb{N})$ ist: $\overline{\text{ran } S} = (\text{ran } S)^{\perp\perp} = \text{ran } S$, also $\text{ran } S$ abq.

„ $\bigcap_{n=1}^{\infty} \text{ran}(S^n) = \{0\}$ “ $\bigcap_{n=1}^{\infty} \text{ran}(S^n) = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \forall k \in \mathbb{N}: (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \text{ran}(S^k)\} =$
 $= \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \forall k \in \mathbb{N}: x_k = 0\} = \{0\}$

$$\begin{pmatrix} 0, x_1, x_2, \dots \\ y_1, y_2, y_3, \dots \end{pmatrix}$$

b) Seien $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N})$ bel.

$$\langle S((x_n)_{n \in \mathbb{N}}), (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_{n+1}} \stackrel{!}{=} \langle (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, S^*((y_n)_{n \in \mathbb{N}}) \rangle$$

$$S^*: \ell^2(\mathbb{N}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{N}) : (y_1, y_2, \dots) \mapsto (y_2, y_3, \dots)$$

Nach Prop. 6.6.2 gilt

$$\ker S^* = (\text{ran } S)^{\perp} = \{(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N}) \mid \forall k \in \mathbb{N}: (k > 1 \Rightarrow y_k = 0)\}$$

$$\text{ran } S^* = \ell^2(\mathbb{N}) \quad ((x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N}) \text{ bel. } y_1 := 0; y_k := x_{k-1} \text{ und } S^*((y_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (x_n)_{n \in \mathbb{N}})$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{ran}([S^*]^n) = \ell^2(\mathbb{N})$$

20/1: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{N})$, und betrachte den Operator auf $\ell^2(\mathbb{N})$ der durch die Matrix

$$A := (a_{i+j-1})_{i,j=1}^{\infty} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & \\ a_3 & \cdots & & \\ \cdots & & & \end{pmatrix}$$

gegeben ist. Explizite agiert A also als $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (\sum_{k=1}^{\infty} a_{k+n-1} x_k)_{n \in \mathbb{N}}$. Sei (der Einfachheit halber) weiters vorausgesetzt, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton fallend ist. Zeige, dass A kompakt ist.

Hinweis. Approximiere A mit Operatoren die endlichdimensionales Bild haben.

1) Wir wollen zuerst zeigen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N}) \Rightarrow A(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N})$

$$\begin{aligned} \|A(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_2^2 &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \left| \sum_{k \in \mathbb{N}} a_{k+n-1} x_k \right|^2 \leq \| (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \|_2^2 \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k \in \mathbb{N}} |a_{k+n-1}|^2 \stackrel{\text{weil } (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ mon. fallend ist}}{\leq} \| (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \|_2^2 \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k \in \mathbb{N}} |a_k| |a_n| = \\ &= \| (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \|_2^2 \| (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \|_1^2 < \infty \end{aligned}$$

2) $\forall \ell \in \mathbb{N}: A_\ell: \ell^2(\mathbb{N}) \rightarrow \{(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N}) \mid \forall k > \ell: y_k = 0\}: (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$\forall n \in \{1, \dots, \ell\}: y_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_{k+n-1} x_k \quad \text{und} \quad \forall n \in \mathbb{N}: (n > \ell \Rightarrow y_n = 0)$$

$$\begin{aligned} \text{"Linearität der } A_\ell": A_\ell((x_n)_{n \in \mathbb{N}} + \lambda (y_n)_{n \in \mathbb{N}}) &\rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_{k+n-1} (x_k + \lambda y_k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_{k+n-1} x_k + \lambda \sum_{k=1}^{\infty} a_{k+n-1} y_k \\ &\leadsto A_\ell((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) + \lambda A_\ell((y_n)_{n \in \mathbb{N}}) \end{aligned}$$

"Beschränktheit der A_ℓ ":

$$\|A_\ell(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\ell} \left| \sum_{k=1}^{\infty} a_{k+n-1} x_k \right|^2 \leq \sum_{n=1}^{\ell} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_{k+n-1}| |x_k| \right)^2 \leq \sum_{n=1}^{\ell} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_{k+n-1}|^2 \right) \| (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \|_2^2$$

und $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{k+n-1}|^2$ ist konvergent, da $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{k+n-1}|$ konvergent ist, also $(|a_{k+n-1}|)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge

$$\text{und } \forall x \in [0, 1]: x^2 \leq x$$

Es ist also $A_\ell \in L_b(\ell^2(\mathbb{N}))$ und $\dim(\text{ran } A_\ell) = \ell$ (mit der kanonischen Basis), nach Prop.

6.5.4 (i) ist also A_ℓ kompakt.

$$\begin{aligned} 3) \|A(x_n)_{n \in \mathbb{N}} - A_\ell(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_2^2 &= \sum_{n=\ell+1}^{\infty} \left| \sum_{k \in \mathbb{N}} a_{k+n-1} x_k \right|^2 \leq \| (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \|_2^2 \sum_{n=\ell+1}^{\infty} \sum_{k \in \mathbb{N}} |a_{k+n-1}|^2 \leq \\ &\leq \| (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \|_2^2 \sum_{n=\ell+1}^{\infty} \sum_{k \in \mathbb{N}} |a_k| |a_n| = \| (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \|_2^2 \| (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \|_1 \sum_{n=\ell+1}^{\infty} |a_n| \xrightarrow{\ell \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Also existiert für jedes $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N})$ der Grenzwert $\lim_{\ell \rightarrow \infty} A_\ell(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = A(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, nach einem Korollar 4.2.3 des Satzes von Banach-Steinhaus ist damit A linear und beschränkt

4) Mit der gleichen Ungleichungskette wie im vorigen Punkt sehen wir

$$\|(A - A_\ell)(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_2 \leq \| (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \|_1^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=\ell+1}^{\infty} |a_n| \right)^{\frac{1}{2}} \| (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \|_2 \quad \text{also} \quad \|A - A_\ell\| \xrightarrow{\ell \rightarrow \infty} 0$$

Damit erhalten wir $A_\ell \xrightarrow{\|\cdot\|} A$ und da nach Prop. 6.5.4 (iii) die Menge

der kompakten Operatoren in $L_b(\ell^2(\mathbb{N}))$ abg. ist, gilt auch A kompakt

21 / 1: Sei $U : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ die Fouriertransformation. Bestimme $\sigma(U)$ und $\sigma_p(U)$.

Hinweis. Man erinnere sich, dass U auf dem dichten Teilraum $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ gegeben ist durch

$$(Uf)(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \exp(-it\zeta) d\lambda(t).$$

Verwende den Spektralabbildungssatz und betrachte Funktionen der Bauart $p(t)e^{-\frac{t^2}{2}}$ mit einem Polynom $p(t)$.

$$\begin{aligned} \cdot) U(e^{-\frac{t^2}{2}})(\zeta) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-\frac{t^2}{2}) \exp(-it\zeta) d\lambda(t) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-\frac{t^2}{2}) \cos(\zeta t) d\lambda(t) - \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-\frac{t^2}{2}) \sin(\zeta t) d\lambda(t) \end{aligned}$$

Von Blümlingen Beispiel 2.1.10 wissen wir bereits $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-\frac{t^2}{2}) \cos(\zeta t) d\lambda(t) = \exp(-\frac{\zeta^2}{2})$

Das zweite Integral existiert und da $\exp(-\frac{t^2}{2}) \sin(\zeta t)$ eine ungerade Funktion ist ergibt sich 0

Also: $U(e^{-\frac{t^2}{2}})(\zeta) = e^{-\frac{\zeta^2}{2}} \Leftrightarrow U(e^{-\frac{t^2}{2}})(\zeta) - 1 \cdot e^{-\frac{\zeta^2}{2}} = 0$, es ist also jedenfalls

$$1 \in \sigma_p(U) \subseteq \sigma(U)$$

$\cdot) \frac{d}{dt} e^{-\frac{t^2}{2}} = -t e^{-\frac{t^2}{2}}$ und von Blümlingen Prop. 3.2.2. wissen wir

$$U(-te^{-\frac{t^2}{2}})(\zeta) = U\left(\frac{d}{dt} e^{-\frac{t^2}{2}}\right)(\zeta) = i\zeta U(e^{-\frac{t^2}{2}})(\zeta) = i\zeta e^{-\frac{\zeta^2}{2}} = (-i)(-\zeta e^{-\frac{\zeta^2}{2}}), \text{ also ist sicher}$$

$$\text{auch } -i \in \sigma_p(U) \subseteq \sigma(U)$$

$$\frac{d^2}{dt^2} e^{-\frac{t^2}{2}} = \frac{d}{dt} (-te^{-\frac{t^2}{2}}) = -e^{-\frac{t^2}{2}} + t^2 e^{-\frac{t^2}{2}}$$

$$U(-\frac{1}{2}e^{-\frac{t^2}{2}}) + U(-\frac{1}{2}e^{-\frac{t^2}{2}} + t^2 e^{-\frac{t^2}{2}}) = U(-e^{-\frac{t^2}{2}} + t^2 e^{-\frac{t^2}{2}})(\zeta) = U\left(\frac{d^2}{dt^2} e^{-\frac{t^2}{2}}\right) = -\zeta^2 e^{-\frac{\zeta^2}{2}}$$

$$-\frac{1}{2}e^{-\frac{\zeta^2}{2}} + U(-\frac{1}{2}e^{-\frac{t^2}{2}} + t^2 e^{-\frac{t^2}{2}}) = -\zeta^2 e^{-\frac{\zeta^2}{2}} \Leftrightarrow U(-\frac{1}{2}e^{-\frac{t^2}{2}} + t^2 e^{-\frac{t^2}{2}}) = (-1)(-\frac{1}{2}e^{-\frac{\zeta^2}{2}} + \zeta^2 e^{-\frac{\zeta^2}{2}})$$

$$\text{also: } -1 \in \sigma_p(U) \subseteq \sigma(U)$$

genauere Ausführung!

Führt man das fort, so erhält man die Hermite'schen Polynome mit den immer wiederkehrenden


$$\text{Eigenwerten } \{1, -1, i, -i\} \subseteq \sigma_p(U) \subseteq \sigma(U)$$

22/1: Sei X ein Banachraum, $A, T \in \mathcal{B}(X)$ mit $0 \in \rho(A)$, und setze $B := A + T$. Wir wissen (Neumannsche Reihe): Ist $\|T\| < \|A^{-1}\|^{-1}$, dann ist $0 \in \rho(B)$. Unter der Voraussetzung dass $AT = TA$, zeige die stärkere Aussage: Ist $r(T) < r(A^{-1})^{-1}$, dann ist $0 \in \rho(B)$. Warum ist diese Aussage eigentlich stärker als die obige?

•) Zuerst zur Angabe: Da $0 \in \rho(A)$, also $0 \notin \sigma(A)$, nach Satz

6.4.14: $\sigma(A) \neq \emptyset$, folgt mit Lemma 6.4.8

$\sigma(A^{-1}) = \{ \frac{1}{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(A) \} \neq \emptyset$, also ist $r(A^{-1})^{-1} = (\max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A^{-1})\})^{-1}$ sinnvoll.



•) Als nächstes erkennen wir:

$$A^{-1}T = A^{-1}T A A^{-1} \stackrel{AT=TA}{=} A^{-1}A T A^{-1} = T A^{-1} \text{ und damit}$$

$$r(A^{-1}T) \stackrel{\text{Satz 6.4.14}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \| (A^{-1}T)^n \|^{1/n} \stackrel{A^{-1}T=TA^{-1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \| (A^{-1})^n T^n \|^{1/n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \| (A^{-1})^n \|^{1/n} \| T^n \|^{1/n} \stackrel{\text{Satz 6.4.14}}{=} r(A^{-1}) r(T)$$

Nach Voraussetzung gilt $r(T) < (r(A^{-1}))^{-1} \Rightarrow r(A^{-1}) r(T) < 1$, daher auch

$r(A^{-1}T) \leq r(A^{-1}) r(T) < 1$, es ist also $-1 \in \rho(A^{-1}T)$ und damit existiert

$$(A^{-1}T - (-I))^{-1} = (I + A^{-1}T)^{-1} \text{ und deshalb auch}$$

$$(I + A^{-1}T)^{-1} A^{-1} = (A(I + A^{-1}T))^{-1} = (A + T)^{-1} = B^{-1}, \text{ also } 0 \in \rho(B)$$

•) Warum ist diese Aussage stärker?

$$\|T\| < \|A^{-1}\|^{-1} \Rightarrow \|T\| \|A^{-1}\| < 1 \text{ und von Lemma 6.4.10 wissen wir bereits}$$

$$\sigma(T) \subseteq K_{\|T\|}(0), \text{ also } r(T) \leq \|T\| \text{ sowie } r(A^{-1}) \leq \|A^{-1}\| \text{ also}$$

$$r(A^{-1}) r(T) \leq \|A^{-1}\| \|T\| < 1 \Rightarrow r(T) < (r(A^{-1}))^{-1}$$

Umgekehrt gilt uel. nicht: $r(T) < (r(A^{-1}))^{-1} \Rightarrow \|T\| < \|A^{-1}\|^{-1}$

22 / 2: * Sei $\mathcal{K}(\mathbb{C})$ die Menge aller kompakten Teilmengen von \mathbb{C} , und

$$d_H(M, N) := \max \left\{ \sup_{x \in M} \inf_{y \in N} |x - y|, \sup_{y \in N} \inf_{x \in M} |x - y| \right\}, \quad M, N \in \mathcal{K}(\mathbb{C}).$$

Es gilt dass d_H eine Metrik ist, die *Hausdorff-Metrik*.

Sei nun X ein Banachraum. Zeige:

(a) Sind $A, B \in \mathcal{B}(X)$ mit $AB = BA$, dann ist $d_H(\sigma(A), \sigma(B)) \leq r(A - B)$.

(b) Ist \mathcal{C} eine kommutative Teilalgebra von $\mathcal{B}(X)$, so ist die Funktion


$$\Sigma : \begin{cases} (\mathcal{C}, \|\cdot\|_{\mathcal{B}(X)}) & \rightarrow (\mathcal{K}(\mathbb{C}), d_H) \\ A & \mapsto \sigma(A) \end{cases}$$

stetig.

d) Aus Lemma 6.4.10 wissen wir bereits, dass $\sigma(A), \sigma(B)$

kompakt sind also der Ausdruck $d_H(\sigma(A), \sigma(B))$

sinnvoll ist.



$$\stackrel{\text{Satz 6.4.14}}{r(A+B)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| (A+B)^n \right\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k} \right\|^{\frac{1}{n}} \leq$$

$$\stackrel{(*)}{\leq} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left\| \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} A^k B^{n-k} \right\|^{\frac{1}{n}} + \|A\|^{\frac{1}{n}} + \|B\|^{\frac{1}{n}} \right) = r(A) + r(B) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} A^k B^{n-k} \right\|^{\frac{1}{n}}$$

wobei $(*)$ wegen der Dreiecksungleichung und

$$\begin{aligned} \|A\|^n + \|B\|^n &\leq (\|A\| + \|B\|)^n \text{ gilt, was für } n=1 \text{ klar ist und wegen} \\ (\|A\| + \|B\|)^{n+1} &\geq (\|A\|^n + \|B\|^n) (\|A\| + \|B\|) = \|A\|^{n+1} + \|A\|^n \|B\| + \|B\|^n \|A\| + \|B\|^{n+1} \geq \\ &\geq \|A\|^{n+1} + \|B\|^{n+1} \text{ für alle } n \in \mathbb{N} \text{ gilt, damit also auch} \\ (\|A\|^{\frac{1}{n}} + \|B\|^{\frac{1}{n}})^n &\geq \|A\| + \|B\| \Leftrightarrow \|A\|^{\frac{1}{n}} + \|B\|^{\frac{1}{n}} \geq (\|A\| + \|B\|)^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} A^k B^{n-k} \right\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k-1} A^k B^{n-k} + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k} A^k B^{n-k} \right\|^{\frac{1}{n}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-1}{k} A^{k+1} B^{n-k-1} + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k} A^k B^{n-k} \right\|^{\frac{1}{n}} =$$