

2023 级概率与数理统计试题 (A 卷)

一、填空题

1. 0.5; 2. 4; 3. 0.75; 4. 0.5; 5. $1 - e^{-10}$; 6. $N(-\frac{1}{\theta}, \frac{1}{n\theta^2})$;

7. $\left[\frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right)^2, \frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)^2 \right]$; 8. $\left| \frac{\bar{x} - 5}{s/4} \right| < 2.1314$

二、1. 解: 设 B_1 表示此人会解答此题, B_2 表示此人不会解答此题, A 表示此人答对此题.

(1) 利用全概率公式得

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) = 0.8 \times 1 + 0.2 \times 0.2 = 0.84$$

(2) 利用 Bayes 公式得

$$P(B_2|A) = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{0.2 \times 0.2}{0.84} = \frac{1}{21}$$

2. 正确

因为

$$0 \leq P(AB) \leq P(A) = 0,$$

故

$$P(AB) = 0,$$

于是

$$P(AB) = 0 = P(A)P(B)$$

A 与 B 相互独立.

三、1. 解: 易知 X 可能的取值为 3, 4, 5, 且

$$P(X=3) = \frac{1 \times C_2^2}{C_5^3} = \frac{1}{10}, \quad P(X=4) = \frac{1 \times C_3^2}{C_5^3} = \frac{3}{10}, \quad P(X=5) = \frac{1 \times C_4^2}{C_5^3} = \frac{3}{5}$$

即 X 的分布律为

X	3	4	5
P	0.1	0.3	0.6

2. 解: (1) X 的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ x^{\frac{1}{3}} - 1, & 1 \leq x < 8 \\ 1, & x \geq 8 \end{cases}$$

(2) 设随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数为 $F_Y(y)$.

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = 0$

当 $0 \leq y < 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X \leq (y+1)^3\} = y$

当 $y \geq 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 1$

因此 $Y=F(X)$ 的密度函数。

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

四、解: 1. 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ 得

$$1 = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} c(x+y)e^{-(x+y)} dy = 2c$$

$$\text{解得 } c = \frac{1}{2}$$

$$2. f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)} dy & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{x+1}{2} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)} dx & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{y+1}{2} e^{-y} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

3. X 与 Y 不独立, 因为 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 并非几乎处处成立。 +3

4. 解法一:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy = \begin{cases} \int_0^z \frac{1}{2}(z-y+y)e^{-(z-y+y)} dy, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} z^2 e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解法二:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \begin{cases} \int_0^z \frac{1}{2}(x+z-x)e^{-(x+z-x)} dx, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} z^2 e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

五、解: 先考虑样本 X_1, X_2, \dots, X_5 , $\bar{X}_5 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 X_i$, $S^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X}_5)^2$ 分别为样本 X_1, X_2, \dots, X_5 的样本均值和样本方差, 所以

$$Y_1 = \sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X}_5)^2 = 4S^2 \sim \chi^2(4)$$

再考虑样本 X_6 , 易知

$$Y_2 = (X_6 - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$$

注意到 X_1, X_2, \dots, X_5 和 X_6 独立, 所以 Y_1, Y_2 独立, 根据 F 分布的定义, 得到

$$\frac{Y_2}{Y_1/4} = \frac{4(X_6 - \mu)^2}{\sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X}_5)^2} \sim F(1, 4)$$

六、1. 切比雪夫不等式为:

设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 都存在, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 均有

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \text{ 或者 } P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$\text{证明: } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} e^{-x} dx = n+1$$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{n+2}}{n!} e^{-x} dx = (n+1)(n+2) \int_0^{+\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)!} e^{-x} dx = (n+1)(n+2)$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = n+1.$$

由切比雪夫不等式得到

$$P(0 < X < 2(n+1)) = P\{|X - (n+1)| < n+1\} = P\{|X - E(X)| < n+1\} \geq 1 - \frac{D(X)}{(n+1)^2} = \frac{n}{n+1}.$$

$$2. (1) E(U) = E(2X - 3Y) = 2EX - 3EY = -1, \quad E(V) = EX + EY = 2.$$

易知 $DX=4, DY=1/3$. 因此, 由 X 和 Y 独立,

$$D(U) = 4DX + 9DY = 16 + 3 = 19,$$

$$D(V) = DX + DY = 13/3.$$

$$(2) \quad \text{cov}(U, V) = \text{cov}(2X - 3Y, X + Y) = 2DX - 3DY = 8 - 1 = 7.$$

$$\rho_{UV} = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{7\sqrt{3}}{\sqrt{247}}$$

(3) 因为 $\rho_{UV} \neq 0$ 所以 U 和 V 相关, 所以不独立。

$$\text{七、解: } 1. \mu_1 = EX = \frac{\theta}{2}$$

$$\text{由此可得 } \theta = 2\mu_1$$

用 \bar{X} 代替 μ_1 , 得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$

(2) 样本的似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}, & 0 \leq x_i \leq \theta, i=1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

令 $x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则

$$\theta \geq x_i, i=1, 2, \dots, n \Leftrightarrow \theta \geq x_{(n)}$$

所以似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}, & \theta \geq x_{(n)} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

易知 $L(\theta)$ 关于 θ 为单调减函数, 所以当 $\theta \geq x_{(n)}$ 时, $L(\theta) \leq L(x_{(n)})$

所以 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta}_2 = x_{(n)}$$

最大似然估计量为

$$\hat{\theta}_2 = X_{(n)}$$

(3) 因为 $E\hat{\theta}_1 = E(2\bar{X}) = 2E(\bar{X}) = \theta$, 即 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计。

易知 $\hat{\theta}_2 = X_{(n)}$ 的密度函数为

$$f_{\hat{\theta}_2}(u) = \begin{cases} \frac{nu^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq u \leq \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\text{所以 } E\hat{\theta}_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} uf_{\hat{\theta}_2}(u)du = \int_0^{\theta} u \frac{nu^{n-1}}{\theta^n} du = \frac{n}{n+1} \theta$$

即 $\hat{\theta}_2$ 不是 θ 的无偏估计。

又因为 $E(\frac{n+1}{n}\hat{\theta}_2) = \theta$, 所以 $\frac{n+1}{n}\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计。

八、解: 设

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 80 \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

拒绝域为

$$\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$$

查表得 $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$, $\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$, 计算得 $\chi^2 = \frac{15 \times 11^2}{80} = 22.6875$

因为 $6.262 < 22.6875 < 27.488$, 即样本值不在拒绝域, 所以不拒绝 H_0 , 即认为整批保险丝的熔化时间的方差等于 80。