



# **LE VIOL**


**Pr M.NOUN**

**Médecine Légale  
CHU de SBA**

# **LE VIOL**

**Art 336 du C.P:**

**« Quiconque a commis le crime de Viol est puni  
de la réclusion à temps, de 05 à 10 ans  
Si le Viol a été commis sur la personne d'une  
mineure de 16 ans, la peine est la réclusion à  
temps, de 10 à 20 ans »**



# GENERALITES :

- **Le viol est « la violence faite à une femme que l'on prend de force » qu'elle soit vierge ou non ; sans son consentement.**
- **Plus précisément c'est l'acte qui a pour but l'intromission de la verge dans la cavité vaginale contre la volonté de la femme.**
- **La victime d'un viol ne peut être qu'une femme ; la possession d'un homme, contre son consentement, par une ou plusieurs femmes constitue un attentat à la pudeur.**
- **La victime doit être vivante ; le coït avec un cadavre (nécrophilie) constitue un outrage public à la pudeur, il est donc intéressant de savoir si le viol a précédé ou suivi le décès.**
- **Il n'y a jamais de viol entre mari et femme, même si le mari agit contre le gré de son épouse. S'il usait de violence, il ne pourrait être poursuivi que pour coups et blessures volontaires.**

## ■ Du point de vue judiciaire :

03 conditions doivent être réunies pour déterminer le viol :

- § La pénétration ou la tentative de pénétration de la verge en érection dans le vagin.
- § Usage de violence physique ou de contraintes morales par le coupable.
- § L'intention doit être coupable.

- ## ■ Dans le cas où la victime est un mineur, les violences et le non - consentement ne sont pas nécessaires pour la qualification de l'acte criminel.


# ELEMENTS DE DIAGNOSTIC DU VIOL :

## ■ 1-Les traces de violences ou de lutte et de défense que porte la victime :


**Ecchymoses, égratignures et coups d'ongles situés:**

- à la face antéro-interne des cuisses, aux poignets et, aux bras,
- au visage, au tour de la bouche et des narines si le criminel a chercher à étouffer les cris de la victime,
- au cou, s'il a tenté de l'étrangler.

# Les traces de violences ou de lutte et de défense que porte la victime




Les traces  
de violences  
ou de lutte  
et de  
défense que  
porte la  
victime



## ■ 2-les traces laissées par l'acte sexuel lui-même :

- **Les traces anatomiques** : situé à l'entrée du vagin, l'hymen est le témoin anatomique de la défloration, généralement, il enregistre les traces significatives que laisse la pénétration dans le vagin de la verge en érection. « La barrière médico-légale du viol étant l'hymen ».
- **Les traces hémorragiques** : proviennent de la déchirure de l'hymen, ces traces sont à rechercher et à identifier sur les sous-vêtements, sur le sol.  
Elles peuvent ne pas exister( hymen dilatable) ou avoir disparu au moment de l'expertise.


# **Examen Gynécologique d'une Enfant**





a



b








H 21 28







EE, h2 5










39  
320

16.6 88






**Des photos d'hymens  
pouvant faire office de  
preuves en affaires de  
viol chez l'enfant**



- 
- 
- 6 ans
  - Excoriation à 6 h






- 14 ans . Faits : 24 h
- Déchirure récente à 6 h
- Encoche physiologique à 10 h
- Spermatozoïdes présents




- 12 ans . Faits entre 5 ans et 12 ans
- Déchirure ancienne à 4 h

- 14 ans
- Faits entre 11 ans et 14 ans
- Déchirures anciennes à 1h, 6 h et 9 h




- 
- 
- 9 ans
  - Faits à 8 ans
  - Déchirure ancienne à 6 h
  - Encoche à 3 h
- 






- 14 ans
- Faits à 10 ans
- Déchirure ancienne à 11h



- 13 ans
- Faits à 5 ans
- Déchirures anciennes à 2 h et 8 h



- 10 ans
- Faits à 6 ans
- Déchirure ancienne à 6 h
- Condylomes




- 14 ans . Faits à 7 ans
- Déchirure ancienne à 9 h

# **Examen gynécologique d'une femme**



## Position grenouille



1 Présentation de l'enfant



Poils pubien féminin



Poils pubien masculin



Fente pudendale (vulvaire), glabre et en position de repos



27-06-2003




Schéma anatomique de la vulve en position *ouverte* –

1. Capuchon du clitoris (prépuce clitoridien) ; 2. Gland du clitoris ;
3. Méat urinaire ; 4. Vestibule vulvaire ; 5. Petites lèvres ;
6. Orifice vaginal ; 7. Grandes lèvres ; 8. Raphé du périnée

<< Mont de Vénus >>



Mont de Vénus

## Grandes lèvres




## Petites lèvres





Les lèvres internes sont plus grandes que les lèvres externes.



Vestibule vulvaire






La vulve, partie apparente du sexe



Méat urétral



Méat urinaire





**Fourchette vulvaire**



Orifice vaginal inférieur


# **Morphologie de l'hymen non défloré**




T  
8

8






Une pénétration vaginale peut ne pas laisser de trace sur un hymen dit  
« tolérant »



**4 Morphologie de l'hymen non défloré (d'après C. Simonin et J.J. Billard)**

a Hymen semi-lunaire ou falciforme. b Hymen labié. c Hymen annulaire à bords réguliers. d Hymen cribriforme. e Hymen à languette ou à pendentif. f Hymen frangé à bords sinueux et festonnés (encoches congénitales) parfois tolérant. g Hymen lobé (échancrures congénitales). h Hymen à pont ou à bride. i Hymen en carène un peu scléreux ayant résisté au coït (Jayle)


## Hymen annulaire à bords réguliers




## Hymen semi-lunaire (falciforme)



# Hymen labié



# *Hymen cribriforme*




## Hymen lobé (avec échancrures congénitales)




# Hymen frangé


(à bords sinueux et festonnés)



## Hymen à languette (pendentif)




## Hymen à pont (à bride)




# Hymen en carène scléreux résistant au coit




# Hymen imperforé





**Des photos d'hymens  
pouvant faire office de  
preuves en affaires de  
viol chez l'adulte**






## 5 Les lésions de la défloration

Zone de prédilection des déchirures médico-légales.

A gauche : après défloration déchirure à 7 H complète.

A droite : déchirure incomplète à 5 H.




7

### Conformation de l'hymen défloré (D'après C. Simonin et J.J. Billard.)

- 1 Hymen semi-lunaire après défloration (déchirure unique, médiane, postérieure, située à 6 h).
- 2 Hymen semi-lunaire après défloration (2 déchirures latéro-postérieures) à 5 h et à 7 h.
- 3 Hymen labié après défloration (rupture à la partie postérieure).
- 4 Hymen annulaire après défloration (quadruples déchirures situées dans le quadrant postérieur, à 3, 5, 7, 9 h).
- 5 Hymen annulaire transformé après plusieurs accouchements (lambeaux irréguliers : caroncules myrtiformes).
- 6 Hymen biperforé après défloration (rupture en pont et postérieure).

# hymen après défloration










8






- **Les traces spermatiques** :
  - Se trouve dans le vagin, sur la chemise ou la culotte, sur les cuisses.  
(empreinte génétique)
  
- **La recherche et l'examen de poils**  
(empreinte génétique)

# Reconstruction de l'hymen , hymenoplastie



قبل العملية



بعد العملية