

# Hématémetrie

Dr.F.SOLTANI



**L'hématimétrie est  
l'étude qualitative et  
quantitative, des  
éléments figurés du sang**

# L'hématologie:

Branche médicale, qui étudie le sang et les maladies du sang : hémopathies

## □ Hémopathies bénignes :

### 1- Anémies :

Carentielles : ferriprives, facteurs antipernicieux

Hémolytiques : congénitales et acquises

2- Troubles de l'hémostase : primaire (purpura thrombopénique...), coagulopathies (hémophilie)

## □ Hémopathies malignes :

cancers hématologiques “onco-hémato”

1- **Leucémies** : point de départ est la moelle

Leucémies aiguës : lymphoblastique, non-lymphoblastique

Leucémies chroniques : lymphoïde, myéloïde

2- **Lymphomes** : point de départ ganglion, rate


Lymphome de Hodgkin,

Lymphome non-hodgkinien

3- **Dysglobulinémies** : myélome, Maladie de Waldenström

# Rappel sur l'hématopoïèse


# L'hématopoïèse



erythropoeise


Moelle osseuse

Sang





leucopoeise






Myeloblast



Promyelocyte



Myelocyte



Metamyelocyte




Banded  
neutrophil



Segmented  
neutrophil

megacaryocytopoeise



megacaryocytes








Silvia Rochet






Inclinaison de la lame contre la goutte de sang




1

Mise en contact de la lame inclinée contre le sang



2


le sang s'étale par capillarité




3

4

Entraînement du sang par capillarité-  
frottis réalisé





# I- Analyse quantitative

Elle se base sur la pratique de NFS  
( Numération formule sanguine )  
c'est l'examen biologique le plus  
prescrit

**Globule rouge**

Taux de globules rouges :

Homme : 4,5 à 6 M/mm<sup>3</sup>

Femme : 4 à 5,5 M/mm<sup>3</sup>

Nouveau-né : > 6M/mm<sup>3</sup>

Hématocrite : volume globules rouges/sang total (%)

☐ Homme : 40-54 %

☐ Femme : 35-47 %

## Hémoglobine :

- ☐ Homme : 13-17 g/dl
- ☐ Femme : 11-14 g/dl

Anémie : diminution du taux d'hémoglobine, il faut éliminer les fausses anémies par modification de la masse plasmatique (hémodilution), reconnaître une anémie masquée par une hémococoncentration

**Indices érythrocytaires** : servent à typer une anémie

**Volume Globulaire Moyen (VGM) :**

$(\text{Hématocrite} / \text{Globules Rouges}) \times 10$

- ☐ 80 à 100 fl ou micron<sup>3</sup> : normocytose
- ☐ < 80 fl : microcytose
- ☐ > 100 fl : macrocytose

## **Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (CCMH) :**

$(\text{Hémoglobine} / \text{Hématocrite}) \times 100$

- ☐ 32 à 36 % : normochromie
- ☐ < 32 % : hypochromie
- ☐ >36 % : ???



## Réticulocytes :

0,5-2,5 % de globules rouges = 25.000 à 120.000

□  $> 120.000$  : régénérative (coloration au bleu de Crésyl brillant)

**Globules blancs**

## Globules blancs:

Taux normaux : adulte : 4000 à 10000/mm<sup>3</sup>

- ☐ < 4.000 : leucopénie
- ☐ > 10.000 : hyperleucocytose
- ☐ **Polynucléaires neutrophiles** : 40 à 70 % [1600 à 7000]
- ☐ **Polynucléaires éosinophiles** : 0 à 7 % [0 à 700]
- ☐ **Polynucléaires basophiles** : 0 à 2 %
- ☐ **Lymphocytes** : 20 à 40 % [800 à 4000]
- ☐ **Monocytes** : 3 à 7 % [120 à 700]

Notion d'équilibre des globules blancs, inversion de la formule, notion de myélémie


## **Plaquettes:**

Taux normaux : 150.000 à 400.000/mm<sup>3</sup>

☐ < 150.000/mm<sup>3</sup> : thrombopénie

☐ > 400.000/mm<sup>3</sup> : thrombocytose

☐ Eliminer les fausses thrombopénies par agglutination des plaquettes sur EDTA ou autour des polynucléaires « satellitisme » en contrôlant le taux de plaquettes sur tube citré



**Agrégat de plaquette**

## **II- Analyse qualitative :**

Elle repose sur la pratique du frottis sanguin, qui permet d'apprécier la morphologie des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes


## **Technique de réalisation :**

1. Prélever une petite goutte de sang capillaire et la déposer à l'extrémité d'une lame.
2. Avec la deuxième lame tenue à 45 degrés par rapport à la première, toucher la goutte de sang puis l'étaler d'un mouvement bref sur la première lame pour obtenir un étalement fin.

3. Veiller à ce que, lorsque la 2ème lame rentre en contact avec la goutte, le sang ne s'étale pas jusqu'aux bords latéraux de la 1ère lame.
4. Sécher aussitôt en agitant la lame.
5. Fixer le frottis avant coloration, (le plus souvent au MGG) sans fixer la partie de la lame réservée à la goutte épaisse.




Inclinaison de la lame contre la goutte de sang




1

Mise en contact de la lame inclinée contre le sang




2

le sang s'étale par capillarité



3

4




Entrainement du sang par  
capillarité-  
frottis réalisé

# **Aspect et le rôle des cellules sanguines :**

## **Globules rouges :**

Assurent le transport des gaz du sang grâce à l'hémoglobine et portent les antigènes des groupes sanguins.


Ce sont des cellules anucléées en forme de disque biconcave (Ce qui explique l'halot clair au centre des globules rouges au frottis) de 7-8 microns. À l'état normal, ils ont une forme, une taille et coloration identiques.



## **Plaquettes sanguines :**

Interviennent dans l'hémostase primaire, elles sont à l'état normal regroupées en amas (10-15 plaquettes par amas).





## **Globules blancs :**


Jouent un rôle important dans les défenses immunitaires, ils regroupent

## **les polynucléaires neutrophiles (PNN)**

Noyau poly-lobé (3 à 5 lobes).

40 à 70 % [1600 à 7000]






## **Polynucléaires éosinophiles (PNE) :**

Granulations orangées juxtaposées

0 à 7 % [0 à 700]






## **Polynucléaires basophiles (PNB) :**

Granulations violettes foncées  
abondantes.

0 à 2 %


**Polynucléaire basophile**



## Monocytes :

Plus grandes que les PNN et  
noyau à contour irrégulier mais  
sans lobes individualisés.

3 à 7 % [120 à 700]




Monocyte

## Lymphocytes :

Les petits lymphocytes s'identifient assez facilement : taille un peu plus grande que celle d'un GR, noyau rond, quasi-absence de cytoplasme, tandis que les grands lymphocytes sont parfois un peu difficiles à séparer des monocyte

20 à 40 % [800 à 4000]





### **3- Interprétation du frottis sanguin :**

#### **A- Les leucocytes :**


- Appréciation du nombre de leucocytes.
- La présence de PNN hypersegmentés ( $> 5$  lobes) : Témoigne d'une carence en facteurs anti pernicioeux.
  - Présence de es PNN hyposegmentés ( $< 3$  lobes) : C'est le Pseudo Pelger-Huët, ou Pelger-Huët acquis, retrouvé au cours des syndromes myélodysplasiques (MDS) et des infections sévères.





- **La myélémie :**


Elle est définie par le passage d'éléments jeunes de la lignée granuleuse dans le sang, elle accompagne généralement une hyperleucocytose. Il s'agit généralement de myélocytes et de métamyélocytes, plus rarement de promyélocyte. Ce passage peut être physiologique en présence de certains stimuli (Facteurs de croissance ++).



x 100

## **La blastose :**

Présence de blastes qui sont les 1ers précurseurs de la lignée lymphoïde ou myéloïde. Elle s'observe au cours des leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) ou myéloblastiques (LAM).



## 2- Les globules rouges :

Anomalie de taille des globules rouges : -

**Anisocytose** : Grande diversité de taille des hématies sur un même frottis.


- **Microcytose** : Globules rouges diminués de volume (Inférieur à 6 microns), se voit en cas de carence en fer, de thalassémie...
- **Macrocytose** : Globules rouges augmentés de volume (Supérieur à 9 microns), se voit en cas de carence en facteurs anti-pernicieux.



**macrocyte**



**microcyte**




## **Anomalie de la coloration (Anysochromie) :**

Variabilité de l'intensité de coloration des hématies sur un même frottis. -

**Hypochromie** : Diminution de coloration des hématies (L'halot clair est plus important), se voit au cours de la carence en fer par exemple.


**Polychromatophilie** : Variabilité de coloration des hématies qui peuvent présenter des teintes différentes sur un même frottis, de façon plus ou moins homogène. Elle s'observe au cours des anémies hémolytiques et des dysérythropoïèses (Anomalie de l'érythropoïèse).






**hypochromie**

**Polychromatophilie**




## Anomalie de forme (Poïkilocytose ):

Echinocyte : Encore appelé cellule crénelée, il s'agit d'une hématie en forme de disque ou de sphère, hérissée de spicules fins, régulièrement répartis sur toute la surface de la cellule. Cet aspect correspond souvent à un artéfact (Frottis mal séché ou sang trop longtemps conservé). On peut cependant observer des échinocytes au cours de différents états pathologiques : urémie, pathologie gastrique tumorale ou ulcéreuse...




**Acanthocyte** : L'hématie présente des spicules irréguliers en nombre variable (3 à 12), de taille et de répartition inégales, souvent terminés par une extrémité arrondie. On observe les acanthocytes essentiellement au cours de cirrhoses éthyliques sévères, mais également dans d'autres pathologies (Malabsorptions, splénectomies...).





## **Schizocyte** :


correspond à un fragment d'hématie irrégulier, de taille et de forme variables, pouvant comporter deux ou trois extrémités pointues. L'hématie prend parfois la forme d'un casque. Cet aspect est observé au cours d'anémies hémolytiques microangiopathique, d'hémolyses dues à des prothèses valvulaires cardiaque et des brûlures sévères.






## **Stomatocyte (Mouth cell) :**

Il s'agit d'un disque uniconcave. Sur frottis, la zone claire centrale de l'hématie prend la forme d'une fente ou d'un ovale. On l'observe au cours d'anomalies congénitales de la membrane des hématies (Stomatocytose) , mais également en cas d'alcoolisme, au cours des cirrhoses ou des obstructions des voies biliaires.



## **Elliptocyte ou ovalocyte :**


L'hématie est dans ce cas allongée, ovale ou ellipsoïde, à extrémité arrondie. Cet aspect s'observe au cours de l'elliptocytose héréditaire, pathologie congénitale de la membrane du globule rouge




## **Drépanocyte :**

L'hématie prend une forme allongée, classiquement en forme de faucille ou de croissant, avec deux spicules bipolaires : extrémités pointues, plus ou moins effilées. Cet aspect est spécifique de la drépanocytose.






**Microsphérocyte** : Les hématies sont sphériques, leur coloration est foncée et homogène, avec disparition du centre clair. On les observe au cours de la maladie de Minkowski Chauffard ou sphérocytose héréditaire (Anomalies congénitales de la membrane des hématies), mais également au cours d'autres anémies hémolytiques, elles sont dans ce cas moins nombreuses





**Cellule cible (Target cell)** : L'aspect sur frottis est celui d'une cible ou d'une cocarde, l'hémoglobine étant répartie en périphérie et au centre de la cellule. Les cellules cibles s'observent surtout au cours de certaines hémoglobinopathies (hémoglobinoase C, thalassémie), parfois au cours des carences martiales.



Download from  
**Dreamstime.com**

This watermarked comp image is for previewing purposes only.




ID 121422508

© Jarun011 | Dreamstime.com




**Dacryocytes** : Les hématies ont la forme d'une poire avec une extrémité arrondie et l'autre allongée, plus ou moins effilée, en forme de larme. Cet aspect est évocateur de pathologies s'accompagnant de fibrose médullaire

# Dacryocytes



## Annulocyte :


C'est une hématie dont le centre clair est anormalement important. Cet aspect correspond à une hypochromie, le plus souvent observée au cours des grandes anémies ferriprives.






## **Rouleaux d'hématies :**


Les globules rouges peuvent parfois s'accoler les uns aux autres, réalisant une image de rouleaux des gammopathies monoclonales



## **Présence d'inclusion intra érythrocytaires:**

Pouvant être des parasites ( cas du palludisme) ou autre comme le corps d'Howell joly, granule unique noirâtre périphérique) retrouvé en cas de splenectomie ou certaines anémies hémolytiques .






## C- les plaquettes:

- Appréciation de leur morphologie ( macrothrombocytes)
- La présence ou non d'agrégat plaquettaires.
- Le nombre de plaquette par amas.




**Plaquettes géantes**









# III- Exploration

## 1- Sang :

Hémogramme : numération + frottis sanguin

Réticulocytes : si anémie, sert à déterminer le mécanisme : central ou périphérique

## 2- Moelle hématopoïétique :

Ponction de moelle : trocart de Mallarmé, aspiration du suc médullaire, étalement sur lames, coloration au MGG, étude des cellules observées (cytologie) dont l'interprétation ou médullogramme

**Ponction-Biopsie Osseuse (PBO) ou Biopsie Médullaire (BM)** : trocart de Jamshidi, crête iliaque antérieure ou postérieure, étude de l'architecture du tissu hématopoïétique par l'histologie (anatomopathologie), mise en évidence d'une fibrose médullaire ++, d'une aplasie médullaire +++, d'un envahissement médullaire par une prolifération...

## Les différents anomalies:

### Cytopénies:

- ☐ Une lignée : anémie, leucopénie, thrombopénie.
- ☐ Deux lignées : bi-cytopénie
- ☐ Trois lignées : pan-cytopénies

### Mécanisme des cytopénies :

- ☐ Central (moelle osseuse)
- ☐ Périphérique (destruction, anomalie de la répartition : splénomégalie).

Merci pour votre attention