

Convexit   et g  om  trie

I. Convexit   et barycentres

Dans toute la suite \vec{E} est un \mathbb{R} -espace vectoriel.

D  finition 1. Un espace affine est un $(\vec{E}, +)$ -ensemble dont l'action de \vec{E} est simplement transitive.

1. Convexit  

D  finition 2. Une partie A d'un espace vectoriel (resp. d'un espace affine) est dite convexe si, et seulement si $\forall (a, b) \in A^2, [a, b] \subset A$ o   $[a, b] = \{a + \lambda \overrightarrow{ab}, \lambda \in [0, 1]\}$.

Exemple 3. Tout polygone convexe (dont les angles sont $\leq \pi$), toute intersection de convexes, tout image directe, r  ciproque de convexes par une application affine est convexe. Toute boule (pour une certaine norme) est convexe (in  galit   triangulaire).

Exemple 4. Tout sous-espace vectoriel, affine est convexe. $S_n^+(\mathbb{R})$ est convexe, $S_n^{++}(\mathbb{R})$ aussi.

D  finition 5. L'enveloppe convexe d'une partie S est le plus petit convexe not   $\text{Conv}(S)$ contenant S .

2. Barycentres

Proposition 6. Soient $(A_1, \mu_1), \dots, (A_n, \mu_n)$ des points massiques (i.e. $\mu_i \in \mathbb{R}$). Si $\sum_i \mu_i \neq 0$, alors il existe un unique point G tel que

$$\sum_{i=1}^n \mu_i \overrightarrow{A_i G} = \vec{0},$$

appel   barycentre de $(A_1, \mu_1), \dots, (A_n, \mu_n)$. On parle d'isobarycentre quand $\mu_1 = \dots = \mu_n$ et de combinaison convexe quand $\mu_i \geq 0 \forall i$. On a de plus, pour tout O ,

$$\sum_{i=1}^n \mu_i \overrightarrow{O A_i} = \overrightarrow{O G}.$$

Proposition 7. $\text{Conv}(S)$ est l'ensemble des combinaisons convexes de S .

En dimension finie, on a mieux :

Th  or  me 8 (Th  or  me de Carath  odory). Supposons $\dim \vec{E} = n$. Soit $A \subset E$. Alors tout point M de $\text{Conv}(A)$ s'  crit comme une combinaison convexe ≥ 0 de $n + 1$ points de A .

Corollaire 9. Dans un espace affine de dimension finie, l'enveloppe convexe d'un compact est compacte.

D  finition 10 (Point extr  mal). Un point extr  mal d'un convexe A est un point a tel que $A \setminus \{a\}$ est encore convexe.

D  veloppement 1 (Th  or  me de Krein-Milman). Tout convexe compact d'une espace affine de dimension finie est enveloppe convexe de ses points extr  maux.

II. Fonctions convexes de E dans \mathbb{R}

D  finition 11. Soit A une partie convexe de E .

Une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est dite convexe (resp. strictement convexe) lorsque pour tout $A, B, 0 < \lambda < 1, f(A + \lambda \overrightarrow{AB}) \leq (1 - \lambda)f(A) + \lambda f(B)$ (resp. strictement).

Lemme 12 (Pseudo-r  duction simultan  e). Si $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in S_n(\mathbb{R})$ alors on peut trouver $P \in GL_n(\mathbb{R})$ tels que

$$I_n = PAP^\top \quad ; \quad \mathcal{D}_n(\mathbb{R}) \ni D = PBP^\top.$$

Proposition 13. Le d  terminant est strictement log-concave sur $S_n^{++}(\mathbb{R})$, i.e., si $A, B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $0 < \lambda < 1$ alors

$$\det((1 - \lambda)A + \lambda B) > (\det A)^{1 - \lambda} (\det B)^\lambda.$$

D  veloppement 2 (Ellipso  de de John Loewner). Soit K un compact de \mathbb{R}^n . Il existe une unique ellipso  de (i.e. partie de la forme $q^{-1}([0, 1])$ o   q est une forme quadratique positive) de volume minimal, centr  e en 0 contenant K .

D  veloppement 3 (Sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbb{R})$). *Soit G un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$. Alors G est conjugu      un sous-groupe du groupe orthogonal $O_n(\mathbb{R})$. Plus pr  cis  ment G est un sous-groupe de $O(q)$ o   q est une forme quadratique d  finie positive.*