

উইলসন ডিজিজ রোগীর খাদ্য তালিকা

কপার (তামা) নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশি খাবারের প্রেক্ষাপটে সাজানো নির্দেশিকা

উইলসন ডিজিজে শরীর থেকে কপার ঠিকভাবে বের হতে পারে না, জমে গিয়ে লিভার আর ব্রেইনের ক্ষতি করে। তাই ওষুধের পাশাপাশি কম-কপার ডায়েট মেনে চলাটা চিকিৎসার একটা জরুরি সহায়ক অংশ।



এড়িয়ে চলুন	পরিমিত পরিমাণে	নিরাপদ
- কলিজা (গরু/মুরগি) - চিংড়ি ও কাঁকড়া - কাজু ও অন্যান্য বাদাম - মাশরুম - চকোলেট ও কোকো - ডাল জাতীয় খাবার - সয়াবিন ও টফু - লাল আটা ও ভুসি - শুকনো ফল (কিশমিশ, খেজুর)	- পালং শাক ও টমেটো - আলু (খোসা ছাড়া) - আম, পেঁপে, আনারস	- সাদা ভাত - ময়দার রুটি/পাউরুটি - দুধ, দই, পনির - ডিম - মুরগি/গরুর মাংস (কলিজা ছাড়া) - সাধারণ মাছ (চিংড়ি ছাড়া) - বেশিরভাগ সবজি ও ফল - চা ও কফি

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- পানি** — টিউবওয়েল বা কপার পাইপের পানিতে কপারের মাত্রা বেশি থাকতে পারে; একবার পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভালো।
- তামার বাসন এড়িয়ে চলুন** — তামার ঘটি-লোটার পানি রাখা বা তামার হাঁড়িতে রান্না করা যাবে না।
- সাপ্লিমেন্ট** — যেকোনো মাল্টিভিটামিন বা মিনারেল ট্যাবলেট কেনার আগে লেবেলে কপার আছে কি না দেখে নিতে হবে।
- এলকোহল সম্পূর্ণ বাদ** — লিভারের ওপর বাড়তি চাপ ফেলে।

- **প্রোটিনের বিকল্প** — ডাল বাদ পড়ায় প্রোটিনের জন্য ডিম, মুরগি, দুধ আর সাধারণ মাছের ওপর বেশি নির্ভর করা যায়।

শুধু ডায়েট দিয়ে উইলসন ডিজিজ সামলানো যায় না — এটা চিকিৎসার সহায়ক অংশ মাত্র। মূল চিকিৎসা হলো ওষুধ (পেনিসিলামিন/ট্রায়েনটিনের মতো কপার-বাইন্ডিং মেডিসিন, বা জিংক)। ডায়েটের কড়াকড়ি সাধারণত চিকিৎসার প্রথম বছরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ থাকে। ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন অনুযায়ী শুধু কলিজা আর চিংড়ি/কাঁকড়া — এই দুটোই সব পর্যায়ে সবচেয়ে কড়াকড়িভাবে এড়ানো হয়।

রোগীর লিভারের অবস্থা ও চলমান ওষুধ অনুযায়ী এই তালিকা একবার তার ডাক্তার বা ডায়েটিশিয়ানকে দেখিয়ে যাচাই করিয়ে নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।