

# Отчет по лабораторной работе №6

## Модель эпидемии - вариант 43

Мулихин Павел Вячеславович НФИбд-01-18

### Содержание

Цель работы .....	1
Задание .....	1
Выполнение лабораторной работы .....	1
Теоретические сведения .....	1
Задача .....	2
Выводы .....	5

### Цель работы

Изучить модель эпидемии  $SIR$

### Задание

1. Изучить модель эпидемии
2. Построить графики изменения числа особей в каждой из трех групп.  
Рассмотреть, как будет протекать эпидемия в случае:  $I(0) \leq I^*$ ,  $I(0) > I^*$

### Выполнение лабораторной работы

#### Теоретические сведения

Рассмотрим простейшую модель эпидемии. Предположим, что некая популяция, состоящая из  $N$  особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы. Первая группа - это восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи, обозначим их через  $S(t)$ . Вторая группа – это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции, обозначим их  $I(t)$ . А третья группа, обозначающаяся через  $R(t)$  – это здоровые особи с иммунитетом к болезни. До того, как число заболевших не превышает критического значения  $I^*$ , считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда  $I(t) > I^*$ , тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

Таким образом, скорость изменения числа  $S(t)$  меняется по следующему закону:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S & , \text{если } I(t) > I^* \\ 0 & , \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

Поскольку каждая восприимчивая к болезни особь, которая, в конце концов, заболевает, сама становится инфекционной, то скорость изменения числа инфекционных особей представляет разность за единицу времени между заразившимися и теми, кто уже болеет и лечится. Т.е.:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I & , \text{если } I(t) > I^* \\ -\beta I & , \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

А скорость изменения выздоравливающих особей (при этом приобретающие иммунитет к болезни):

$$\frac{dR}{dt} = \beta I$$

Постоянные пропорциональности  $\alpha, \beta$  - это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно. Для того, чтобы решения соответствующих уравнений определялось однозначно, необходимо задать начальные условия. Считаем, что на начало эпидемии в момент времени  $t = 0$  нет особей с иммунитетом к болезни  $R(0) = 0$ , а число инфицированных и восприимчивых к болезни особей  $I(0)$  и  $S(0)$  соответственно. Для анализа картины протекания эпидемии необходимо рассмотреть два случая:  $I(0) \leq I^*$  и  $I(0) > I^*$

## Задача

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ( $N = 5505$ ) в момент начала эпидемии ( $t = 0$ ) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции)  $I(0) = 45$ , А число здоровых людей с иммунитетом к болезни  $R(0) = 3$ . Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени  $S(0) = N - I(0) - R(0)$ . Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: 1.  $I(0) \leq I^*$  2.  $I(0) > I^*$

#Вариант 43

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt
import math

N = 5505 # Всего людей на острове
I0 = 45 # Число первоначальнозаболевших
R0 = 3 # Число людей с иммунитетом
S0 = N - I0 - R0 # Число людей восприимчивых к болезни

a = 0.07 # Коэффициент заболеваемости
b = 0.01 # Коэффициент выздоровления

x0 = [S0, I0, R0]
```

```

def syst(y, t):
    y1, y2, y3 = y
    return [0, -b*y2, b*y2]

def syst2(y, t):
    y1, y2, y3 = y
    return [-a*y1, a*y1 - b*y2, b*y2]


t = np.arange (0, 200, 0.01)
y1 = odeint (syst, x0, t)
y1s = y1[:, 0]
y1i = y1[:, 1]
y1r = y1[:, 2]

fig = plt.figure (facecolor='white')
plt.plot (t, y1s, linewidth = 2, label = 'S(t)')
plt.plot (t, y1i, linewidth = 2, label = 'I(t)')
plt.plot (t, y1r, linewidth = 2, label = 'R(t)')
plt.ylabel ('Численность')
plt.xlabel ('Время')
plt.grid (True)
plt.legend ()
plt.show
fig.savefig ('image/01.png', dpi = 600)


y2 = odeint (syst2, x0, t)
y2s = y2[:, 0]
y2i = y2[:, 1]
y2r = y2[:, 2]

fig2 = plt.figure (facecolor='white')
plt.plot (t, y2s, linewidth = 2, label = 'S(t)')
plt.plot (t, y2i, linewidth = 2, label = 'I(t)')
plt.plot (t, y2r, linewidth = 2, label = 'R(t)')
plt.ylabel ('Численность')
plt.xlabel ('Время')
plt.grid (True)
plt.legend ()
plt.show
fig2.savefig ('image/02.png', dpi = 600)

```



Графики численности в случае  $I(0) \leq I^*$



Графики численности в случае  $I(0) > I^*$

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель эпидемии и построены графики.