

Алгебра, 1 курс

Фейгин Евгений Борисович

2 сентября 2020 г. — 27 сентября 2020 г.

Формула оценки: $\frac{D + C + K + 2E}{5}$, где D, C, K, E — оценки за д/з, КР, коллоквиум и экзамен соответственно.

Определение 1. Абелева группа — множество A с определённой на нём операцией $+$ со следующими свойствами:

- $\forall a, b : a + b = b + a$;
- $\forall a, b, c : (a + b) + c = a + (b + c)$;
- $\exists 0 \forall a : a + 0 = a$;
- $\forall a \exists (-a) : a + (-a) = 0$.

Определение 2. Кольцо — множество A с операциями $+$ и \times со следующими свойствами:

- $(A, +)$ — группа;
- $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$;
- $(b + c) \times a = b \times a + c \times a$.

Кроме того, у \times могут быть такие дополнительные свойства:

- $\exists 1 : \forall a : a \times 1 = 1 \times a = a$ (если есть единица);
- $\forall a, b : a \times b = b \times a$ (если коммутативное кольцо);
- $\forall a, b, c : a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$ (если ассоциативное кольцо);
- $\forall a, b : a \times b = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$ (если нет делителей нуля).

Определение 3. Целостное кольцо — ассоциативное коммутативное кольцо с единицей без делителей нуля.

Определение 4. Поле — коммутативное ассоциативное кольцо с 1, такое, что $0 \neq 1$ и $\forall a \neq 0 \exists a^{-1} : aa^{-1} = 1$.

Замечание. Отсутствие делителей нуля в кольце не гарантирует, что это поле.

Определение 5. Подгруппа абелевой группы A — множество $B \subset A$, со следующими свойствами:

- $0 \in B$;
- $a \in B \implies (-a) \in B$;
- $a, b \in B \implies a + b \in B$.

Определение 6. Подкольцо — подгруппа $B \subset A$ такая, что $a, b \in B \implies a \times b \in B$.

Определение 7. Подполе — подкольцо $B \subset A$ такое, что $1 \in B$ и $a \in B \implies a^{-1} \in B$.

Определение 8. Комплексные числа — множество $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ (здесь i — формальный символ) с операциями сложения и умножения, определёнными следующим образом:

- $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$;
- $(a + bi) \times (c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)i$.

Теорема 1. \mathbb{C} — поле.

Доказательство. Вначале докажем, что \mathbb{C} — кольцо (это очевидно). Кроме того,

$$a^2 + b^2 \neq 0 \implies (a + bi) \left(\frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i \right) = 1,$$

значит, это поле. ■

Определение 9. Вещественная часть — число $\operatorname{Re}(a + bi) = a$.

Определение 10. Мнимая часть — число $\operatorname{Im}(a + bi) = b$.

Определение 11. Модуль комплексного числа — число $N(a + bi) = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Определение 12. Аргумент комплексного числа — множество $\operatorname{Arg}(a + bi)$ чисел φ таких, что $a + bi = N(a + bi)(\cos \varphi + i \sin \varphi)$.

Тригонометрическая запись числа. Будем записывать

$$z = a + bi = N(z)(\cos \operatorname{Arg}(z) + i \sin \operatorname{Arg}(z)).$$

Тогда получится, что

$$z_1 z_2 = (N(z_1)N(z_2))(\cos(\operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2)) + i \sin(\operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2))).$$

Определение 13. Автоморфизм поля — отображение $f : K \rightarrow K$ такое, что $f(a) + f(b) = f(a + b)$ и $f(a)f(b) = f(ab)$. Автоморфизмы кольца и абелевой группы определяются аналогично.

Определение 14. Изоморфизм групп — отображение $f : A \rightarrow B$ такое, что $f(0_A) = f(0_B)$ и $f(a_1 +_A a_2) = f(a_1) +_B f(a_2)$. Если такое отображение существует, то A и B называются изоморфными.

Заметим, что $a + bi \mapsto \overline{a + bi} := a - bi$ — автоморфизм. Множество его фиксированных точек — это \mathbb{R} , и легко доказать, что $z\bar{z}, z + \bar{z} \in \mathbb{R}$.

Рассмотрим уравнение $z^n = 1$. Если $z = \cos \varphi + i \sin \varphi$, то $z^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi = 1$, т.е. $\varphi = \frac{2\pi k}{n}$. Это будет n корней (для $k = 0, \dots, n-1$; будем обозначать $\xi_r = \cos \frac{2\pi r}{n} + i \sin \frac{2\pi r}{n}$), и они делят окружность $N(z) = 1$ на n равных частей. Понятно, что если z_1, z_2 — корни, то и $z_1 z_2$ тоже, кроме того, 1 — корень. Тогда это абелева группа по умножению, которая изоморфна $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (по сложению).

Определение 15. Первообразный корень из 1 — такой корень ξ_k , что $\forall n \exists m : (\xi_k)^m = \xi_n$.

Лемма 2. ξ_k (r -и степени) первообразный тогда и только тогда, когда $(k, r) = 1$.

Определение 16. Фактор-множество — M/R множество классов эквивалентности на множестве M по отношению эквивалентности R .

Определение 17. Отображение проекции — функция $\pi : M \rightarrow M/R$, переводящая любой элемент a в множество $R(a)$ элементов, эквивалентных a .

Лемма 3. π — сюръекция и $\pi^{-1}(x) = \{a \in M, a \sim x\}$.

Пусть на M есть операция $*$. Будем говорить, что $*$ согласована с отношением R , если из того, что $a \sim a', b \sim b'$ следует, что $a * b \sim a' * b'$. Тогда на M/R возникает индуцированная операция $*$.

Если $*$ согласована с R , то индуцированная операция наследует многие свойства $*$, в частности: ассоциативность, коммутативность, наличие нейтрального элемента.

Теорема 4. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ поле тогда и только тогда, когда n простое.

Доказательство. Пусть $n = n_1 * n_2$. Тогда $[n_1]_n [n_2]_n = [n]_n = [0]_n$.

С другой стороны, пусть n простое. Тогда для любого $m = 1, 2, \dots, n-1$ выполняется $(m, n) = 1$, тогда $\exists u, v : um + vn = 1 \iff [m]_n [u]_n = [1]_n$. Тогда u обратен к m . ■

Определение 18. Характеристика поля — минимальное такое $k \in \mathbb{N}$, что $\underbrace{1 + \dots + 1}_k = 0$ (имеются в виду 0 и 1 из этого поля). Если такого k нет, то характеристика равна 0.

Лемма 5. Если \mathbb{K} — поле, то $\operatorname{char} \mathbb{K} = 0$ или простое число.

Доказательство. Пусть $\operatorname{char} \mathbb{K} = n = n_1 n_2$. Тогда $0 = \underbrace{1 + \dots + 1}_n = \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{n_1} \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{n_2}$,

значит, у нас есть делители нуля. ■

Определение 19. Евклидово кольцо — целостное кольцо K с функцией нормы $N : K \setminus 0 \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$ со следующими свойствами:

- $N(ab) \geq N(a)$, причём равенство только если b обратим.
- $\forall a, b \in K, b \neq 0 \exists q, r \in K : a = bq + r, N(r) < N(b)$.

Примеры.

- $\mathbb{Z}; N(x) = |x|$.
- Пусть F — поле, тогда $F[x]$ с функцией $N(P) = \deg P$ подходит.

Лемма 6. $F[x]$ — евклидово кольцо.

Доказательство. Очевидно, что это целостное кольцо. Очевидно также, что $\deg fg \geq \deg f \deg g$ и равенство, только если какой-то из многочленов 0 степени, т.е. обратим. Докажем деление с остатком. Пусть $f = \sum f_i x^i, g = \sum g_i x^i, n = \deg f \geq \deg g = m$. Тогда рассмотрим $k = f - g \frac{f_n}{g_m} x^{n-m}$. Его степень меньше n , кроме того, $k \equiv f \pmod{g}$, значит, можно проделать алгоритм Евклида. ■

Замечание. В этой лемме необходимо, чтобы F было полем. Например, в $\mathbb{Z}[x]$ не получится разделить $3x$ на $2x$ с остатком.

Теорема 7 (Безу). остаток от деления $f(x)$ на $x - c$ равен $f(c)$.

Доказательство. Следует из Т. 6. ■

Теорема 8. Многочлен $f(x) \in F[x]$ не может иметь в F более $\deg f$ корней.

Доказательство. Пусть c_1, c_2 — корни этого многочлена. Тогда $f = (x - c_1)f_1$ и $f(c_2) = (c_2 - c_1)f_1(c_2)$. Так как $c_1 - c_2 \neq 0$, то $f_1(c_2)$ имеет корень c_2 . Индукция по $\deg f$. ■

Лемма 9. Пусть F — бесконечное поле. Тогда разные многочлены в $F[x]$ определяют разные функции на F .

Доказательство. Пусть $f_1, f_2 \in F[x]$ определяют одну и ту же функцию. Тогда $f_1 - f_2 = 0 \forall x$. Но $f_1 - f_2$ имеет конечную степень, а F бесконечное. Противоречие. ■

Определение 20. Кольцо формальных степенных рядов — множество сумм вида

$$K[[x]] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots \mid x_i \in K\}.$$

Определение 21. Кольцо рядов Лорана — множество сумм вида

$$K((x)) = \{x^{-r}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots) \mid x_i \in K, r \in \mathbb{N}\}.$$

Вернёмся к $K[x]$, причём будем считать, что K — это поле.

Определение 22. Неприводимый многочлен — простой элемент в кольце $K[x]$, т.е. такой многочлен P , что $P = fg \implies \deg f \cdot \deg g = 0$.

Определение 23. Факториальное кольцо — кольцо, в котором выполняется основная теорема арифметики, т.е. в котором каждый элемент раскладывается в конечное произведение простых единственным способом с точностью до перестановки и умножения на обратимые.

Лемма 10. Любое евклидово кольцо факториальное.

Доказательство. Разложение есть: пусть $x \in K$ не простое, тогда $\exists p, q : x = pq$ и p, q необратимые. Тогда $N(x) > N(p)$ и $N(x) > N(q)$, индукция по норме x .

Разложение единственно: линейное представление для НОД позволяет доказать, что если $q \mid ab$ и $(a, q) = 1$, то $q \mid b$, откуда и следует утверждение. ■

Определение 24. Изоморфизм колец — биективная функция $\varphi : K \rightarrow L$ такая, что $\varphi(k_1) + \varphi(k_2) = \varphi(k_1 + k_2)$ и $\varphi(k_1)\varphi(k_2) = \varphi(k_1k_2)$.

Пример $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ изоморфно \mathbb{C} с $\varphi([ax + b]) = ai + b$.

Теорема 11. $K[x]/f$ является полем тогда и только тогда, когда f неприводим.

Доказательство. Пусть f приводим. Тогда $f = pq$, $\deg f > \deg p$, $\deg f > \deg q$. Тогда $[p] \neq [0] \neq [q]$, но $[pq] = 0$, т.е. в этом кольце есть делители 0.

Теперь пусть f неприводим. Докажем, что у любого класса $[g]_f \neq [0]$ есть обратный. Это так, т.к. $\exists u, v : gu + fv = 1$ (т.к. f неприводим $\implies (f, g) = 1$), тогда $[gu]_f = [1]_f$. ■