

2 よくやる失敗



れば早晩なおる。

男の不妊の原因は精子のはたらきがわるいか、数が少ないのがおおい。治療して精子をふやしたうえで、人工授精をすることになるだろう。「不能症」は精神的なものが大部分だから、女のほうが寛大であれば早晩なおる。

ある。

精密な検査をしないで、排卵誘発剤で多胎ができることは、さげたい。排卵誘発剤で多胎ができることがある。

男の不妊の原因は精子のはたらきがわるいか、数が少ないのがおおい。治療して精子をふやしたうえで、人工授精をすることになるだろう。「不能症」は精神的なものが大部分だから、女のほうが寛大であれば早晩なおる。

のある親は、よい親でない。子どもといっしょに人生を探究し、いっしょにそだててくれる親がいい。

とが少なくない。

不妊の原因は女の場合、わからないことのほうが

しかし、かんがえなければならぬのは、精密検査でどちらかに欠陥があるとわかってしまうのは、家庭生活にとって必ずしもプラスにならないことがある。子どもがほしいという願いがつよいほど、それは欠陥があるとされたものに、重い精神の負担になる。相手にもそれをかばわねばならない仕事がある。どちらとわからなければ、共通の運命として、子どもにこだわらずに生きる道をいっしょに求めていける。

2 よくやる失敗

結婚した女の人がからだの調子がおかしくなったら、何をおいても妊娠をかんがえないといけない。半月ぐらい前に生理があつたから、妊娠はしていないと思つたらまちがいだ。生理のとまる前にもつわりはあらわれる。

胃が痛いといって内科の医者について、胃のレントゲン写真を何枚もとったり、透視をしたりしたあと、4週たつても生理がなく、妊娠とわかつた例が数知れずある。

だが胎児には、それ以外の検査方法がないときしかX線をあてないのが世界の医学の常識だ。X線は早期の胎児に奇形をおこしたり、生まれた子のちに、白血病その他のがんをおこしたりする可能性があるからだ。

どれだけのX線量が胎児に奇形をおこしたり、後