

3 どんな薬が危険か

日がんをおこさせたりするかは、動物実験でわかっているだけだ。人間についてはすべて推量である。1回の撮影で胎児のうける線量も撮影の条件でちがう。胸部の撮影だと200回やっても、胎内でうけるのは自然の宇宙線の放射能の量とかわらないのだから心配はない。

X線障害は胎児の月齢によってちがう。15週(4カ月)を過ぎていたら、まず障害はおこらぬ。危険があるのは2週から8週(3カ月)までだが、どれだけの量をうけていたら人工流産をするかは、医師によつてちがう。10ラをこえていたら、たいてい中絶するだろう。1ラから10ラの間は、医師の裁量による。15ラうけても正常児の生まれるチャンスは94%あることを忘れてはならない。

さけたいのはレントゲンだけではない。新薬として売りだされたものは、動物実験だけで催奇性(のむと胎児に奇形をおこす副作用)がないときめめたものだ。人間に催奇性があるかどうかは、数年つかつてみて、奇形児が全国各地で薬の売上げと比例してでてほしくないが、新薬はなるべくつかつてほしくないが、医師は新薬のほうが保険の点数がたかく、メーカーも熱心にすすめるのでよくつかう。それだから妊娠の可能性のある人は、めつたに医者にかかれない。

妊娠していないと確実にいえるのは、生理のはじまった日から数えて14日間しかない。それ以後だったら、既婚者は私は妊娠しているかもしれないとっておくのが安全だ。

3 どんな薬が危険か

つよい下剤が流産をおこしやすくすることは以前から知られている。妊娠中は便秘をよくおこすが、これまでにつかったことのない下剤を勝手にのんではいけない。

サリドマイドのように社会でさわがれた薬はメーカーが発売をやめたが、妊婦以外の病人に安全な薬は「妊婦には注意」という但書きを説明書につけて医者のところまでまわっている。説明書をていねいによまなかったり、病人の生理の日をたしかめなかったりすると、そういう薬が妊娠しているかもしれない女の人に処方される。処方箋を病人がもらつて薬局で薬をもらうことになっていけば、薬剤師がチェックできる。だが日本では医者は処方箋を病人に渡さないし、薬の名を病人につげる習慣がない。病人は何かわからない薬をもらう。病人の安全のために治療の内容の説明がもっととされるべきだ。そういう習慣をつくるためにも、病人のほうから薬の名をたずねるようにしたい。

子どものかぜがうつったとか、のどがいたく鼻がつまりせきもでるとかで、かぜにきまつているとき、医者にいつてはいけない。かぜのウイルスにきく薬はないし、どんな薬をのまされるかわからない。

妊娠中はアスピリンをつかわないほうがいい。出産直前にのむと生まれた子が出血しやすくなる。