

たら、既婚者は秘に妊娠しているかもしれないと
いつておくのが安全だ。

かぜから肺炎になるのを予防するとか、せきを抑
えとかいって、抗生剤がよくつかわれるが、テト
ラサイクリン系の薬をのんではいけない。生まれて
くる子に、黄色くそまった歯がでてくる。

抗ヒスタミン剤には、妊婦につかわないようにと
いう説明書のついているものがあるから、妊娠可能
の人は、薬局で売っているかぜ薬をのまないほうが
安全だ。

奇形をおこす可能性のあるものとしては、サリド
マイド、合成卵胞ホルモン、制がん剤のうちの有糸
分裂拮抗体が知られている。サリドマイドは製造中
止だし、制がん剤をつかっている女の人が妊娠する
ことはなからう（父親が白血病で制がん剤をのんで
いても、そのとき受胎した子どもは正常であるとい
う報告はある）。合成卵胞ホルモンは流産の防止に
よくつかわれたが、無効であることがわかって外国
ではつかわれない。日本ではいまだにつかう医師が
いる。男女とも生まれた子に性器の奇形がおこった
報告がある。

流産をふせぐ確実な薬はみつかっていない。万一
流産しそうになったとき、合成卵胞ホルモンをつか
うといわれたら、それこそ必死になってこわって
ほしい。

つぎに奇形をおこしうるものとしてあげられてい
るのは、抗けいれん剤（てんかん患者が常用する）、
ワルファリン（心臓弁膜のつけかえをした人が常用
する）、アルコール、躁うつ病につかわれるリチウ
ム、手術室内でつかう揮発性の麻酔剤である。

妊婦は口からアルコールをのまないでほしい。妊
産直前にのむと生まれた子が出血しやすくなる。

抗けいれん剤でおこしうるのは口唇瘻（あひくちさ）
と心臓の異常、ワルファリンでおこるのは鼻の骨の
奇形である。アルコールでおこるのは発育のおくれ、
小頭症、心臓の異常、関節の故障などである。

手術室の麻酔剤が危険なのは、手術室勤務の麻酔
の係りをしている女医と看護婦で、そこで手術をう
けた患者は大丈夫だ。

最近アルコールの量と奇形の頻度との関係がわか
つてきた。1日の酒量が純アルコールにして60^g以
上だと、5人に1人は異常児ができる。25ないし60^g
だと10人に1人、25^g以下でも安全だとはいえな
い。

もつともアルコールを、妊娠のどの時期にのんだ
かでちがうが、受胎に近いほど危険は大きい。毎晩
ビール1本とか清酒1合のまないとおさまらないよ
うな人は、避妊するか、生理開始後10日間にかぎつ
てのむということにしたほうが安全である。

それ以外に、奇形をおこすかもしれないのはLS
D（幻覚を薬しむためにのむ）と、プロゲステロンの
たぐいの合成剤（ピルにもはいっている）と、葉酸拮
抗剤（アミノプテリン）である。

4 遺伝する病気

代謝異常の病気（たとえば⁶³⁹フェニルケトン尿
症）や、血液の病気（たとえば⁵⁵⁸血友病）や、筋肉
の病気（たとえばデュシェンヌ型の⁵⁵⁴筋ジストロフ