

ひれつ、これをその口唇性なれな、ていそのたふ、有木
破裂だと6%、口唇裂だと4%、口蓋裂だと3%、

結婚の式がすむと、新郎新婦が新婚旅行にでかけ

る。これは外部から大腸菌のようなどこにもいる菌が侵入したためにおこったものである。薬をのめば数日でなおるが、予防するのにこしたことはない。局部にふれるものが不潔であってはならない。交渉のあとすぐに、ぼうこうをからにしておく。局部をぬぐう紙は清潔でなければならない。痔の人が局所をぬぐうのにつかう消毒綿のようなものを用意しておいてもいい。

旅行中も排尿をまめにして、ぼうこうの中に尿をながく停滞させない。それには水分をおおくとればよい。

泌尿科にいくと研究好きの医者や、レントゲン撮影の好きな医者が、造影剤を入れて尿路のレントゲン写真を撮るといふかもしれないが、ことわってほしい。腎盂の撮影を2回もすれば、許容量の1000ミリをかんたんにこえる。

6 妊娠前ケア

6 妊娠前ケア

「妊娠前ケア」がもつとさかんにならないといけ

ない。重要な女性が結婚してから医者にかかるのは、産科で妊娠かどうかをみてもらう場合が通例だ。妊娠とわかると産科医は血液をしらべたり、尿をみたりする。そのさいに異常のみつかることがある。困るのは、その異常が最近におこったものか、以前からあるものかわからないことだ。

血液に風疹の抗体がみつかったも、それが最近の感染によるものか、子どものときに感染したものかわからない。産科医にみてもらうときは、たいてい妊娠3週から7週(2カ月)になっている。風疹が妊娠してからうつったのだと、胎児に故障をおこしているかもしれない。もし妊娠する前に風疹の抗体がみつかったのだと、胎児に危険はない。免疫のある母親にもう一度風疹ウイルスが感染することはないからだ。

妊娠とわかってからの検査ではおそすぎる。だから結婚がきまつたら、産科医が妊婦でやる検査を内科医で前もって受け、妊娠前のデータをそろえておく。病気がみつければ、なおせるものはなおしておく。

子どものときに風疹や水痘をやつていなかった女性、妊娠中にかかると奇形が生まれるときくと、ワクチンをしておこうという気になる。だが子どものときに風疹や水痘にかからなかったという実母の証言はあてにならない。風疹も水痘も感染したのに外に症状があらわれないのがあるからだ。

ワクチンをしようと思ったら血液検査をして、風疹や水痘の抗体が存在しないことをたしかめる。接