

6 妊娠前ケア

種前1カ月と、接種後2カ月は避妊しないといけない。

トキソプラズマの抗体が陽性でも、妊娠前ならすでに免疫があるとわかるが、妊娠と同時にわかったのだと、妊娠直後に感染したのかどうかわからない。トキソプラズマが奇形をおこすのは、はじめて感染した場合で、妊娠以前に感染したのなら心配ない。妊娠と同時に抗体陽性とわかったときは、1〜2週あいだを改めて再検査して、抗体価が4倍以上だと、最近の感染とし、人工流産する。

妊娠前の検査でトキソプラズマ抗体陰性の場合、ネコ(とくに子ネコ)に近づかないようにする。

そのほかB型肝炎の抗原とか、梅毒の反応(ニセの陽性が20〜40%あることに注意⁶²⁴梅毒)とか、はしかの抗体価とかもわかっていたほうがいい。B型肝炎の抗原(HBsAg)が陽性の場合にはさらにくわしい検査をする。かんたんになおせない病気だから妊娠を断念せず、出産時に子どもにうつさぬように抗HBヒト免疫グロブリンとHB不活化ワクチンをしようという医師もある。

「妊娠前ケア」では、治療中の病気(てんかん、高血圧)の薬を点検し、みつかった病気(高血圧、貧血)をなおし、栄養のあやまりをただし、タバコやアルコールをやめさせる。新夫妻を組にして「妊娠前クリニック」を産科医がやっている国もある。

いちばん大事なのは結婚前から糖尿病があつて、インシュリンをしている人だ。結婚ときまつたら以前より厳重な血糖の管理をする。妊娠とわかってか



ら血糖をつねに正常値にするのではおそい。よく管理された状態で受胎しないといけない。

出産という初体験にはさまざまな不安がある。その不安をのぞくために「お産は恐ろしくない」ことをおしえるいろいろの法(ソ連式無痛分娩^{ぶんべん}、ラマーズ法)がある。一種の精神療法である。安心することで、必要な筋肉以外をリラックスさせる法だ。だが、それにしたがわないと安産ができないということはない。信仰がなくても安心できるのとおなじだ。