

胎児の発育の程度をみたり、治療の仕方をきめるのに、胎児の「年齢」を基準にする。産科では最終の月経のはじまった日を第1日とし、週をもつてかぞえる。在胎日数は280日にほとんどきまつているから、40週で生まれる。出産予定日は、正常の最終月経の第1日に10日をたして、月を3カ月あととどりする。8月2日に最終月経のはじまった人だと5月12日が予定日となる。

日本の旧式の数え方は「経水のよどみたる月」を第1カ月とし、数えて計算する。280日で生まれるから10カ月に生まれることになる。

妊娠すると絨毛性腺ホルモンがふえるから、排卵後8〜9日でも証明されるが、ふつう産科医で正確にホルモンをはかって診断するのは、排卵後4〜5週（月経が2度ぬけるまで）である。

ふだんから生理が規則的に28日ごとにはじまる人だと、予定した日から2週間たつて生理をみなければ受診していい。周期のきまらない人は、最長の周期の日数がすんでまだはじまらないときは、一応妊娠をかんがえる。このように妊娠の週数と予定日をきめる出発点になるのが、生理のはじまる日だから妊娠可能の人は、毎月その日を記帳しておくのがぞましい。

ただ結婚前にピルをのんでいて、結婚したのでや

めた人は、ピル中断による無月経というのがあることを知っていないといけない。これは治療でなおるから、放っておかないほうがいい。

産科医が妊娠ときめられない時期にも、すでにつわりの症状がでてくることはめずらしくない（10つわり）。だが、つわりを全然知らずにすごせる人もある。そういう人でも、生理が2回ぬけたら受診しないといけない。

ときどき妊娠したにかかわらず生理のある場合がある。そんな場合でも、つわりの症状があるときは、受診すべきだ。さらに乳くびのまわりの部分が黒ずんできたとか、乳房がはるような感じがするとか、尿が近くなってきたら、妊娠している可能性は大きい。市販の妊娠診断薬は、それよりずっと早く確実にわかる。

いままで、朝ねどこのなかで体温をはかって基礎体温をつけていた人だと、いつもの2週間の高温期がすぎても、低温期にならないことで、妊娠の想像がつく。

もつともあまり想像がさかんだと、妊娠の想像から生理がとまることがある。子どもがほしいという時より、妊娠したら困ると思う時のほうがおおい。

どこでみてもらうかだが、このごろのように自分の家を出産することがなくなっている場合、出産のために入院する産科の病院に行くのが常識だ。入院したら「基準看護」の付添いなしでひとりになるのだったら、家人が応援にきやすい近所がいい。出産は故郷にかえって実家である場合でも、月がすすむ