

と通院がおっくうになるから、あまり遠いところは感心しない。

腎炎をやったことのある人や、糖尿病をもっている人でなかったら、総合病院でなくてもいい。

最初の受診のとき、検尿をされるにきまっている。ところが本人は緊張するので、尿意をもよおす。待っているあいだにトイレにいってしまうと、診察のあと、待たねばならぬ。トイレにいく前に看護婦にきいたほうがいい。

妊娠ときまつたら、市町村役場（政令指定都市では保健所）にいつて母子健康手帳をもらう。これには妊娠中の経過を記入する欄があるからなるべく早くもらったほうがいい。出産を里帰りしてする場合など、あとからみる医師の役に立つ。また分娩の状態も記入することになっているから、小児科医にも参考になる。母子健康手帳は子どもが満6歳になるまでの発育や予防接種を記入することになっている。

8 日常生活

妊娠したからといって急に生活をかえる必要はない。もともと生理的なことなのだから、丈夫ならひとりでうまくいくようにできている。

食事ものごろは明治・大正の時代のように、たくあんや茶漬ですますようなことがなくなった。自分では中流だと思っている人の食事はインスタントものが主でないかぎり、栄養学上、問題になるような

ことはない。昔の嫁は栄養がよくなかったので妊娠したら大食するようになれたが、今は食欲のままに無計画に食べると、肥満して、難産になることがある。

日本の女のおとなは、ふだん1日1800kcalの栄養をとっているから、妊娠前半は1950kcalとリなさといわれなくても困るだろう。「食品成分表」をみせられて、豚肉70g、ねぎ15gなどといわれても、そんなものを毎日計量してつくれるはずがないと思うだろう。それでいい。ふつうに今までのような食事をとっていれば1800kcalのだから、150gふやすといふことは、だいたい牛乳を300mlふやすということだ。牛乳がきらいなら、およそそれに近いカロリーを、魚や肉やチーズでおぎなえばよい。

妊娠後半になると2150kcalとつたほうがいいといわれるが、それまでの食事に、牛乳100mlをふやし、鶏卵1個半ふやせばいいということだ。

どれだけふやそうなどと思わないでも、おなかの子どもに栄養をとられるから、空腹をおぼえて以前よりもよけいに食べるようになる。ひとりでうまくいくようにできているとは、そういうことだ。

妊娠中に体重は10～16kgふえるのがふつうである。

栄養がうまくいっているかどうかのメーターの役をしているのが体重だ。体重計をもっていないからたら備えてほしい。つわりがあるあいだは、食べられないでふえないが、つわりのすんだころからは、1週に35g前後ふえる。28週（8カ月）からあとは1週