

のが主でないかぎり、栄養学上、問題になるような
に達するまでには、体重の増加の速度は産科
医に受診するたびに報告する。急に達しても驚くも
えたら、定期受診日を持たないでみてもらいにい
かないといけない。

鉄が不足しないように、丸ぼし、レバー、貝類、
卵黄などを、カルシウムをおぎなう意味で牛乳、チ
ーズ、しらすぼし、でんぶ、小魚の佃煮をとる。

総合ビタミンをとるのがいいが、1錠にビタミン
A 2500 IU をふくんでいるのは、3錠までにする。1万
IU 以上だと奇形をおこす危険がある。葉酸を0.4ミリ
以上とらないと脊椎^{せきついりつ}破裂をおこすおそれがある。葉
酸はほうれん草におおくふくまれている。

肥満予防の「ダイエット」は妊娠中お休みにする。
カレーとか、七味とうがらしとか、にんにくとか
は、いままでつかっていた量をこえぬようにする。
コーヒーの可否については論争が絶えないが、最近
不可という研究者のほうが増えつつある。

ピーナツ・アレルギの増加のひとつの原因に妊
婦がピーナツをよくたべることがあげられる。

専業主婦の人は、それまでの家事をつづける。

妊娠したからといって、水のいっぱいはいった鉢
を運んでいるような気になることはない。妊娠4週
から11週(2〜3カ月)に流産がおおいは事実だが、
その原因が運動しすぎたせいとはいえない。流産に
は流産するような内部的原因がある。はげしい運動
が、引き金になることがあるにしても、内部的に流
産の原因のない人は、かなりの運動をしても大丈夫
だ。だが流産の内部的原因が、外からはわからない

いから、すべての初産婦はあまりはげしい運動をさ
けたほうが安全と医者がいうわけだ。

散歩や買物には出たほうがいい。36週(10カ月)に
なつてあまりじつとしていないと、かえって出産をお
くらせる。距離よりも疲労感の有無で調節する。

自動車に乗るときは、かならずシートベルトをし
ないといけない。肩から斜にベルト1本かけるだけ
というのは、たいへん危険だ。イギリスでは、おな
かの子の上部と下部とにベルトをわたし、まうえに
かけないように警告している。大腿部^{だいたいぶ}にもかけて骨
盤を固定する。ベルトの下にタオルを入れない。

旅行は距離よりも、どれほどの振動にさらされる
かが問題だ。大都市から故郷にかえって出産するこ
とがおおくなつて、新幹線や航空機をつかえば32週
(9カ月)でも、東京から北海道や九州に安全にかえ
れることが証明された。乗りかえのおおい長距離列
車よりもマイカーで、ゆつくり、何度も休んでいく
ほうが安全だろう。夏は冷房、冬は暖房のない車は
だめだ。

休息の時間を杓子^{しゃくし}定規^{じょうぎ}にきめることはない。妊娠
初期は1日1回1時間などといわれても、つわりの
ひどい人はもつと休まねばならぬ。後半には1時間
ずつ2回休息するようにときかされても、妊娠の苦
にならぬ人は、休んでいるあいだに、赤ちゃんの靴
下でも編むだろう。とにかく疲れたら休むというこ
とでいい。

入浴もふつうに浴槽^{よくそう}にはいつていい。できれば毎
日はいる。予定日が近づいたら、シャワーのほうが

週に30分前後ふえる。28週(8カ月)からあとは1週