

9 乳くびがひっこんでいる

いいといわれるが、それまで妊婦が先にはいることにしていれば、その必要はない。

自転車は、ふだんから乗っていて運動神経に自信のある人なら、買物にいくのにつかっている。ころばぬように万全の注意がいる。自動車も乗りなれていればかまわない。ただ道でこぼしたところを長く走るのは、すすめられない。

妊娠がすすむとからだの重心がちがってくるから、いままでと同じように思っただけにのったりすると落ちる危険がある。ハイヒールも後半期にはさけたほうがいい。

服装は腹の中に人がひとりいることを念頭において、あまり締めつけないようにする。マタニティドレスをいつから着るかは、その人の隆起の程度による。腹帯は隆起をかくすためにするのではなく、胎児をささえるためのものである。昔風に小さく産んで大きくそだてるというかんがえで、子どもを圧迫する巻き方はよくない。腹帯は楽になるというものではないが、幾重にも巻いて中の子を守るという安心感がある。外出するときは市販のガードルのほうがずれなくていい。しかし腹帯はしなければならぬものでない。腹部の隆起も目立たず、安定した感じであれば、5カ月のイヌの日がきたからといって儀式をすることはない。

性的な交渉も、腹中に存在する人物をいたわるようにしておこなえばさしつかえない。不潔になるとぼうこう炎をおこすことも念頭にいれる。33週(9カ月)になると、交渉のしげきで早産する可能性がある

ある。以前に流産のあったときはとくに注意したい。

9 乳くびがひっこんでいる

乳くびがとびだしていない場合がある。赤ちゃんが生まれてから、うまく乳くびがくわえられないだろうという心配がおこる。

だが、乳くびがひっこんでも赤ちゃんの口が大きければ、乳房ごと吸える。どうしても吸えなければ、しぼってのませることもできる。

それでも妊娠中にできるだけ乳くびがとびだすようにする。かたんなのは、乳くびのまわりの乳房を左手で押えて、乳くびを押しだすようにしておいて、右手の親指と人さし指で乳くびをつまみだして引っばる。そして軽く乳くびをもむ。1日3回ぐらい、1回に3〜4分かける。妊娠4週ないし11週(2〜3カ月)では乳房のしげきで流産をおこすことがあるから、18週(5カ月)ぐらいにはじめることになる。

もっと有効なのは、子どもの父親に赤ちゃんが吸うように吸ってもらうことである。それほど治療に熱心な父親はあまりなかったが、これはでてくると思う。

乳くびのまわりをドーナツ型のプラスチックで押えるプレスト・シールドとか、ガラスでつくった乳頭吸引器とかが市販されているが、人がやるほうがいい。どんなに努力してもとびだしてこなかったた