

カ月)になると、交渉のしげきで早産する可能性が

いい。どんなに努力してもとびだしてこなかったの

10 つわり

妊娠すると、たいてい5週から(もつと早くはじまるものもある)つわりがおこる。とくに朝や夕にむかつきがあり、何もでないのに吐く。今まで平気で食べていたものが、においをかいただけでむかついてくる。食欲がでんでなくなる。やたらにつばが出る。体重もへってくる。いろんな形の頭痛もおおい。こんなことで出産までもつだらうかと不安になる。だが、つわりで胎児が死ぬことはない。16週(5カ月)になればなおる。栄養不足で小さい子ができるということもない。

吐くのがつづいても絶食しないほうがいい。食事の量を少なくして、回数をおくする。アイスクリーム、シャーベット、冷たい果汁などをとって栄養をおぎない、水分が不足しないようにする。朝おきると気持ちがわるくなるなら、寝床のなかでクラッカーとか、あられとかを食べる。

どうしてもものを通るものがないときは、水のかけらをしゃぶる。胃を冷してもいい。

つわりのときの献立と称するものがあるが、それを人につくってもらえる人はめったにないだろう。外食するものひとつの方法だが、ほかの人の食べるもののおいこない店は高級料亭しかない。

つわりとわかったら医者にかねばうが安全だ。

11 小さな異変

小さな異変とここでのいうのは、苦しかったり、わずらわしかったりはするが、妊娠の継続を妨げない症状である。

たちくらみ、めまいは妊娠の初期からときどきおこることがある。立っているときにめまいがあつても、腰かけるか、すわるかするとなおる。むかついたり冷汗がでて失神するようなこともあるが、特別の薬をのむことはない。自然になおる。妊娠がすすんでおなかが大きくなったころ、あおむけにねると脳貧血をおこすことがある。大きくなった子宮が大静脈をおさえて、血液が心臓にかえるのを妨げるためである。横向きにねればなおる。

おりものも早期からよくみられる。消毒綿でぬぐうとき、よくみるくせをつけておくと、出血をみのがさない。黄緑色のウミのようなものがでないかぎり、局所を清潔にしておくだけでいい。

便秘は妊娠の全期を通じて少なくない。運動不足も原因になるから、外を歩くことを怠らぬようにする。新鮮な果実や野菜をとるか、ヨーグルトをのむといい。下剤をつかうときは、産科医にもらうのが安全である。便秘とつながって痔がおこってくるこ