

ともあるが、痔専門の医者に行くよりも、便秘をなおすことが先である。みてもらうとすれば産科医である。痔によって出産が妨げられることはないし、生まれてしまえばなおるにきまっているから、産科医は手術をすすめない。でてきた部分をおさめて痔の外用薬をつけて押えておく。

不眠も妊娠の初期におおい症状である。からだのなかでかつて経験しない大変動がおこっているのが原因だから、それがおちついてくればなおる。不眠がつづいても心配はない。胎児にどうということはない。なるべく睡眠剤はつかいたくない。ことに新しくでた睡眠剤は絶対にのんではいけない。

鼻血を出すこともめずらしくない。出血部位を心臓より高くするために、すわるか、腰かけるかして小鼻をしっかりと押えていればとまる。耳鼻科にいくほどのことはない。新鮮な果汁を薬と思えばよい。歯ぐきのはれることがおおい。歯ブラシをつかったとき出血する。これも特別の治療を必要としない。

唾液がたくさんでて困ることもある。たいてい同時に吐き気がある。吐くのがいやで食べないから、唾液があまるのだ。吐き気がなく唾液だけが絶えずあふれてくることもあるが、何もしないでなおる。

静脈瘤^{じゆうみくとう}というのは、血の流れがわるくなつて静脈がはつきりととびだしてみえ、ところどころコブのようになることだ。大きくなった子宮が大静脈を押えるのと、静脈の壁にある筋肉がホルモンのためにゆるんでしまうせいである。出産がすめばなおる。よくでてくるのは足の甲、ふくらはぎ、ふとももの

内側、陰部である。立っているのを少なくし、ねたときは足が高くなるよう、毛布かふとんで下肢^{かし}の枕をつくる。足をなげだして、下から上にむかつてなでる。これも血管を強くすると称する薬などのまな

いことだ。

むくみも妊娠の後半に40%の人にみられる。子宮が大きくなって血行をわるくするためだろう。立っていると下肢がむくむ。脛^{すね}の骨の上をつよく指で押えると、くぼみができてしばらく残る。朝おきたときはむくみがひいている。このむくみが朝にもみられ指輪が抜けないというときは体重をはかる。体重が1週間に500g以上ふえていたら異常のむくみだから、すぐ医者に行く。ただむくみがあるだけというのは、放っておいていい。

むくみが神経を押えるためと思うが、ふとももの外側がしびれたり、手先がびりびり痛かったり、感じがなかったりすることもある。

胸やけもめずらしくない。腹圧が高くなったため、ゆるくなった噴門から胃酸が食道に逆流するためと思われる。重曹^{じゆうそう}を少しのむくらいでいい。

腰の痛み、こむらがえりも妊娠後半期におおい。重くなった子宮をかかえて歩くのに、そり身になるので、腰の筋肉が過労になるためである。こむらがえりも、筋肉に荷がかかりすぎるからである。こういうことがおこったら、立っている時間をへらさないといけない。

皮膚の色素沈着で乳くびのまわりが黒くなるが、それと同じことが、顔、会陰^{えいん}、陰部にもみられる。