

安静にしても意味がない。

おりものにまじる血液が新鮮な血の色のときは、胎盤の一部が離れただけかもしれない。この場合は絶対安静にして出血のとまるのを待つ。

子宮外妊娠は100人に2〜3人しかないので、まず大丈夫といたいのが、診断がむずかしいので、母親にとって危険度がたかい。妊娠ですといわれていた人が子宮外妊娠であることは少ない。自分は妊娠していないと思っている人に、突如としてげしい下腹部の痛みがおこり、やがて腹全体が痛む。むかつきや嘔吐があり、顔は蒼白になり、その場におれてしまう。おそかれはやかれ性器からの出血がある。

子宮以外に受精卵が定着すると、6週ないし10週(2〜3カ月)までに破裂する。生理が1度ぬけたのを気にしないでいると、つぎの生理のあるべき日までに破裂する。本人が妊娠とっていないと内科にいつてしまう。卵管が破裂して腹腔に大量の出血をおこしているのだから、なるべく早く開腹して血をとめねばならない。ぐずぐずしていると手術の時期をとりがす。結婚した女の人には、いつでもこういう異変がおこりうることを知っていて、はげしい腹痛につづいて出血があったら、産婦人科に救急車で連れていかないと、助かるものを助からなくしてしまう。

もちろん生理がなくて受診し、正常の妊娠といわれていたのが、子宮外妊娠であったという場合もないではないが、いまはどの産科医も超音波をつかつ

て胎児をしらべるから子宮外妊娠を見逃さない。以前は腹痛と出血があつてはじめてわかったものだ。

子宮外妊娠は、以前に妊娠中絶の手術をした人によくある。10週をすぎればこの心配はない。

胎状奇胎というのは、のち胎盤になる絨毛の細胞が変化して、多数のぶどう状の袋をつくる病気である。もちろん胎児は死ぬ。ふつうの妊娠とちがつて子宮が急に大きくなる。この細胞が子宮に残ると後に悪性化し、からだのあちこちに転移をつくって生命をあやうくする。診断がつき次第、子宮から吸引してとりのぞく。

つわりがひどく、タンパク尿や高血圧もでてくるが、医者にはいかないと診断がつかない。そのきつかけが子宮からの出血である。さいわい初産にはまれである。出血は8週から19週(3〜5カ月)のあいだにおこり、出血量もおおい。

妊娠の後半期におこる大きな異変も子宮からの大量の出血をおこすのがおおい。

前置胎盤の頻度は0.6から0.9%ぐらいだ。ふつう受精卵は子宮の後ろのほうに着床するのだが、入口に近く着床すると、胎盤の一部または大部分が子宮口に着く。28週(8カ月)以後、また分娩がはじまるときに、胎盤がはがれて出血する。これは痛みも何もないに、突然に大量の出血をする。以前は危険なものであったが、超音波検査法をもってすれば早くから診断がつくので、これからは自宅で出血するようなことはなくなるだろう。妊娠後半は、医者にきめられた受診日に、かならずでかけないといけない。