

13 妊娠中の伝染病

胎盤の早期剥離も28週以後におこる出血の原因である。35歳以上で、これまでに何度も出産をした女性におおい。これはいつ剥離がおこるか医者にもわからない。ただ妊娠中毒症(妊娠してから血圧が高くなり、尿にタンパクがあらわれ、むくみがひどくなる)によるものが大部分であるから、血圧や尿やむくみの様子をみていれば、予防ができる。毎週体重をはかっていたら、急にふえたときは、むくみがおこったとわかる。妊娠後半期では週に300g前後ふえていけばいいのが、500g以上ふえたときは、みてもらわないといけない。前もって血圧がすこし高いことを医者が知っていたら、タンパクが尿にでることがないか、家庭でしらべさせることもある。

妊娠中毒症を早くみつめて治療するようになったので、以前のように全身のけいれんをおこして意識を失う子癇は、ほとんどみられなくなった。

妊娠中毒症の治療は病院でやる。血圧がある程度高くなり、尿のタンパクがふえるようだと医者は入院をすすめる。治療してもよくならぬときは、36週(10カ月)以後だと人工早産にする。それ以前だと、判断がむずかしい。しかし胎盤の剥離がおこってしまったら妊娠はつづけられない。

胎盤剥離をおこすときは、よく血液のフィブリノゲンがへって止血しにくいので手術がやりにくい。保存血液よりも新鮮血液が必要になるから、妊娠中毒症といわれたら、血液型の同じ人をさがしておく。

胎盤の早期剥離は前置胎盤のときと違って、はじめにはげしい痛みがあつてから出血してくる。ときには外に出血しないこともある。出血のためあつて顔はまっさおになり、冷汗をだし、腹はかちかちになる。最近では、こういうことが自宅でおこるとは、まずない。

13 妊娠中の伝染病

妊娠の初期に風疹にかかった母親から生まれた子に目、耳、心臓などに奇形ができることがわかつてから、ウイルスによる伝染病が妊婦からこわがられるようになった。だがすべてのウイルスが奇形をおこすのではない。そして危険な時期もだいたい18週(5カ月)までである。このときまでに胎児の重要な器官がつくられるのだが、この形成期にウイルスがはいりこんでくると奇形になる。

風疹は妊娠前に血液の抗体をしらべておけば、奇形をさける予防法がある(6妊娠前ケア)。

しかし、たいいていの人が子どものときにかつていたので免疫がある。はしかの生ワクチンをやった人も、接種を1歳3カ月以後にやった場合は、おとなになっても免疫があると思う。それ以前に接種した人は念のため、妊娠前に血液のなかの抗体をしらべたほうが安全だ。

ときどき、きょうだいははしかをすませたのに、自分だけかかっていないという人がいる。それはた