

14 病気のある人の妊娠

かつて、梅毒に感染した女性の妊娠は、胎児に梅毒を伝染させるが、梅毒の母体は、妊娠後期と出産直前に薬を投与してしるべる。慢性ならすぐ母親を治療する。生まれた子は抗生剤の点滴で失明をふせぐ。産道にヘルペスの疹がみつかったら帝王切開で感染をふせぐ。夫の品行方正を望む。

14 病気のある人の妊娠

以前は病気をもった人の妊娠は医者から敬遠された。内科医と産科医とが協力しながら出産までもっていくチームがなかったからだ。出産のおおくが総合病院でおこなわれるようになって、医者のおおくがチームが組みやすくなり、病気をもった人でも出産できることがおこなった。

以前から病気のあることがわかっていている人は、結婚の前に病気の様子をしっかりとつかむために、精密な検診をしておく。妊娠してからではおそい。

慢性腎炎の人が妊娠とわかったときの検査で、血圧が高い場合、それが妊娠前からあったか、妊娠によっておこったかは、将来の見通しをきめるのに大事だ。

子どものときに腎炎をやって、その後軽いタンパク尿がつづいているが、血圧は高くなく、妊娠してからも高くない人は、そのまま正常者と同じに妊娠の経過をみることになる。もちろん機能の検査をやって、腎臓が正常にはたっていることを確かめ

ながらということになる。妊娠の早期から血圧が高くなってきたときは、流産や胎盤の剥離をおこしやすいから、よほど厳重な監視がいる。妊娠の後半には入院させられるだろう。母親を犠牲にしても子どもだけほしいというかんがえは以前に時どきあったが、母子ともに失うことになりかねない。

腎臓がわるくて透析をしている人は、妊娠をしないように忠告されるだろう。それにくらべれば腎臓移植に成功した人の出産は、うまくいくことがおおい。免疫抑制剤を常用しているときは、胎児に奇形をおこす可能性がおおいから、妊娠しないほうが安全だろう。

糖尿病であることがわかっていている女性は、子どもを産もうと思ったら、血糖が正常の状態を受胎せねばならぬ。食餌療法だけでやっている人も、子どものときからインシュリンを注射している人も、血糖をきちんとはかって正常であることを医師に確かめてもらう。場合によっては入院して、血糖を正常に維持する。その状態で受胎したあとも、血糖をいつも正常の範囲にたもつ。家庭で毎日自分でインシュリンを注射し、検尿と血糖のモニタリングをし、体重をきちんとはかる。定期的に病院にいつて血圧と眼底の検査をし、20週(6カ月)以後は超音波で胎児の様子をしらべれば、正常の子どもが生まれるだろう。以前は糖尿病があると妊娠しないほうがいいといったものだが現在のような管理ができなかったからだ。母親は妊娠中毒症や羊水過多をおこしやすく、胎盤の異常がおおい。母親の血糖の管理がまずいと赤

うかもしれない。肝炎の程度によっては妊娠をつづ

(蛍光抗体法)テストでたしかめる。