

15 超音波による検査(エコー)

さいきんどプラー装置で、胎盤の血流をしらべられるようになったため、20週あたりで妊娠による高血圧がおこりそうだと予知できるようになった。また同じ装置で高血圧にタンパク尿のくわわった妊婦で子癇しかんのおこるのを予知し、胎児の成長とにらみあわせて、帝王切開をして母子ともにたすける。妊娠による高血圧は出産してしまえば10日ほどでおおつてしまう。

軽い高血圧(160—110程度)は安産できるのが普通である。降圧剤を使わなくていいという医者もいる。躁うつそううつの人は今かかっている医師に、出産後の計画(専業主婦か共ばたらきか)、夫の協力の程度を話して、妊娠していい時期をきめてもらう。さらに出産後うつになりやすいから産後もみてもらう。

15 超音波による検査(エコー)

超音波をつかってからだの中の様子をしらべることでできるようになって産科医は、以前にくらべて失敗からすくわれるようになった。

胎児の成長の様子が目でみえるだけでない。以前はむずかしかった双胎(ふたご)もかんたんにわかる。大きい奇形がわかって、人工中絶をえらぶ親もでてきた。胎児が子宮のなかで位置をかえて横になったり骨盤位(さかご)になったりしても、胎児の位置にあわせて、母親に側臥位そくがいになるように医師は命じる。1〜2週で自然にもとの位置にもどる。



33週では胎児の頭、腹、大腿骨だいたいこつの計測ができるから、正常にそだっているかどうか分かる。頭と腹との大きさをくらべると、水頭症や無脳児でないこともたしかめられる。泌尿器の大きな異常がみつかつて、胎内の時期に感染をふせぐ処置をとることもあろう。

胎児と比較した羊水の量がわかると、出産時の処置もかんがえられる。胎盤の位置、大きさ、成熟度がわかることで、産科医は生まれそうになってから、あわてなくてもよくなった。