

あわせて、母親に側臥位になるように医師は命じる。
1〜2週で自然にもとの位置にもどる。

がわかることで、産科医は生まれそうになってから、
あわてなくてもよくなった。

16 妊娠中してはいけないこと

おなかの赤ちゃんに、母親のつかった薬が危険なのは胎児の構造がととのいはじめる最初の3カ月である。おとなの神経に作用を及ぼす薬が、胎児のできかかっている神経系をくるわせるのもその例だ。

ところが妊娠とわかるまでの早期に薬をのんでしまっていることがおおい。妊娠の可能性のある女性は、医師にかからぬことだ。めまいがするとか、頭痛がするとか、肩がこるとかは、それで死ぬようなことはないばかりか、それが妊娠の症状であることが少なくない。だが医師は妊娠の可能性を深く尋ねず、めまい、頭痛、肩こりには薬をくれる。平衡障害治療剤とか、心身安定剤とか、筋緊張緩和剤とかの新薬は使用書を見ると、たいてい「妊婦への安全性は確立していないから、治療上の有益性が危険性を上回ると判断された場合にだけ投与する」とある。妊婦からすれば、頭痛や肩こりがとれる有益性より奇形児ができる危険性をさけたいにきま、まっているが、医師は苦痛をとることが、もつと有益だと思っている。だから死ぬかもしれないような病気でない限り妊娠可能な女性は、医者にかからないがいい。診察して薬をださない医者はまずいいから。もちろん検査で妊娠とわかった女性は、タバコや

「わたしはずっとビールをのんでいたわ」などと性交渉は33週がすんで、予定日があと6週になつたら避ける。しげきになって早期破水から早産をおこす危険がある。産道に細菌が入ることもある。

母親のむし歯から菌が赤ちゃんの口に移住して住みつき、後日むし歯をおこす。むし歯は放置しない。

17 里帰り分娩

地方からきた若い男と女とが大都市で知りあつて結婚し、家庭をもつことがおおくなつた。ふたりつきりだから、妻が出産となると困ってしまう。そのため妻の実家にもどつて、その近くの産科の病院で分娩するのがふつうである。

分娩は妊娠のいわば仕上げだから、はじめからみてもらっている産科の医師についてもらうのが、いちばんいいにきまつている。といって妊娠の初期からみてくれている病院で分娩すると、入院中は「基準看護」でうまくみてもらえても、赤ちゃんといっしょに家に帰ってきてから、家事をしてくれる人がいない。夫が出産休暇をもらうのが当然のことになり、夫もある程度家事ができて、ふたりでピンチをきりぬけるのが理想的だ。その苦労によつて夫は、父親になつた責任を実感してもつようになるから