

育児には体力がいるから、父親も母親も年が若いほど楽である。共ばたらきの夫婦でよくみられるのだが、結婚したとき女のほうの仕事が中断されるのが困るので、受胎調節をして妊娠をのぼしているうちに、仕事に以前ほどの熱意を失うか、年を気にするようになるかして、子どもがほしくなる。そこで妊娠、出産となるが、年がいつていると妊娠も出産も、若いときのようにいかない。育児も、もつと体力のあつたときにやればよかった、父親もあのころだったら、もつと応援してくれたらうにと、くやむことが少なくない。

だから結婚したら、自分たちは子どもをもつか、もたないかという大原則をふたりできめることだ。子どもをもつときめたら、なるべく早く妊娠したほうが万事楽である。

子どもをつくるまいと決心したら、たしかな方法をえらぶ。以前は受胎可能の時期だけ禁欲してそれ以外の日は自然にまかせた。荻野式とか基礎体温法とかが、それにあたるが確実でない。いま先進国でいちばんおおくやっているのは、卵胞ホルモンと黄体ホルモンとを組み合わせた、経口避妊法(ピル)である。推定2億人の女性がつかっている。

いろいろ副作用があるといわれたが、ホルモンの量をずつとへらした低用量ピルにしてから、副作用はほとんどない。諸外国では低用量ピルが市販されているが、日本では「審議中」で認可されていない。医師によって服用法がちがうが、一般におこなわれているのは、月経がはじまった日から毎日1錠を

21日のんで、7日間休む。その間に月経がある。毎日のむのを忘れないことだ。1日だけ忘れたら次の日に2錠のむ。2日つづけて忘れたときは、ピルをやめて、コンドームにかえる。ピルをやめたあと何日かで出血がはじまる(消退出血)。消退出血の5日目から、また次の服薬サイクルをはじめ。

ピルは血液の脂肪をたかめるから、高脂血症のある35歳以上の人には、つかわない。またタバコを吸っている人も副作用があるので、禁煙厳守にする。以前おそれられた血栓や乳がんは、低用量ならば心配ない。ただし外科手術をするときは、少なくとも1カ月前にピルをやめる。授乳はさしつかえない。

35歳以上の人は、定期的に血圧、肝機能、血液の中の脂肪をはかってもらつて、チェックする。

ピルについてよくおこなわれるのはIUD(子宮の中に金属のリングやループを入れておく)である。いままで出産をしたことのない人は子宮の入口がせまくて入れられない。金属のしげきで出血がおおくなるので、月経で出血量のおおい人にはつかえない。子宮には受精卵が着床しないが、子宮以外のところに着く子宮外妊娠はおこりうるから、子宮外妊娠の症状(16ページ)を知っていないといけない。副作用として感染をおこしやすい。感染がおれば、高い熱、下腹痛、大量の出血がある。そんな症状があつたらすぐ医師にみてもらう。自然にリングやループが出てしまうこともある。たしかに入っていることをたしかめるのに定期検査をする。

コンドームはわが国でひろくつかわれているが、