

INSTRUÇÕES DE COLETA

COLETA DE FEZES (PROTOPARASITOLÓGICO, pH FECAL, PESQUISA DE LEUCÓCITOS, GORDURA FECAL, SUBSTÂNCIAS REDUTORAS E ROTAVÍRUS)

- 1- Para a obtenção da amostra, coletar as fezes em recipiente fornecido pelo laboratório ou comprado em farmácias para tais fins. Evitar contato da amostra com urina ou água do vaso sanitário.
- 2- Em seguida, com auxílio da espátula, transfira pequena porção, correspondente a aproximadamente 1 colher de sobremesa ou 5ml (uma colher de sopa), caso as fezes sejam líquidas, para o coletor universal não estéril. Evitar contaminar a parte externa do frasco com fezes, tampar bem o coletor.
- 3- Sangue, muco, pus, eventualmente presentes, devem ser incluídos na amostra para exame.
- 4- Não utilizar leite de magnésia, supositórios ou laxantes oleosos (nujol, supositórios etc).
- 5- Não utilizar contraste radiológico por via oral, bário, bismuto, magnésio e carbonato de cálcio nas 72 horas que antecedem a coleta do material.
- 6- Seguir as orientações médicas, quanto ao uso de medicamentos. O ideal é não ter usado antiácido, antiparasitários e antibiótico nas 72 horas que antecedem a coleta.
- 7- Se forem solicitadas 3 amostras, colher em dias diferentes, ou à critério médico.
- 8- Não usar pomadas, ou talco na região anal nas 12 horas que antecedem a coleta.
- 9 - Para crianças que usam fraldas ou que apresentam quadro diarréico, as fezes devem ser colhidas no saquinho tipo "Coletor de Urina" para evitar a absorção do material pela fralda. O material pode ser mantido e entregue no próprio coletor.
- 10 - As amostras devem ser encaminhadas ao Laboratório até 2 horas em temperatura ambiente ou no máximo 24 horas, se refrigeradas. As amostras não devem ser congeladas.

IMPORTANTE: Este exame poderá ser realizado em todas as Unidades de coleta. Verifique os dias e horários de funcionamento de nossas Unidades em nosso site.

Informações: Central de Relacionamento com o Cliente - (13) 2127.7000

www.pasteur.com.br

FO-035/07

Referência: POPCOL 16 e DQ 27