

INSTRUÇÕES DE COLETA

TSH APÓS ESTÍMULO COM TRH

- 1- Para todas as idades, jejum mínimo necessário de 03 horas;
- 2- O teste é realizado somente pela manhã, na Unidade Ana Costa com agendamento prévio;
- 3- O teste é contra-indicado em clientes com doença cardíaca, gestantes e mulheres amamentando;
- 4- Não realizamos o teste de TRH em clientes com idade igual ou superior a 65 anos;
- 5- Informar todos os medicamentos em uso;
- 6- Logo após a administração da medicação, algumas pessoas podem apresentar efeitos colaterais por alguns segundos, como urgência miccional, náuseas, calor no rosto e no corpo, gosto amargo na boca, aperto no peito, sudorese, tontura, cefaleia, lipotímia, taquicardia, rubor facial, calor perineal e vontade de evacuar.

Atenção: O cliente deve adquirir por conta própria, e trazer ao laboratório no dia do exame, uma ampola do medicamento TRH® 0,2mg. Este medicamento não é vendido em farmácias e deve ser adquirido em empresas especializadas em importação de medicamentos.

Por determinação da Agência de Vigilância Sanitária, estabelecida no Decreto nº. 79094/77, medicamentos importados que ainda não possuem registro na Anvisa, podem ser importados por pessoas físicas, desde que sejam destinados a uso próprio, mediante prescrição médica.

Agendado para dia: ____ / ____ / ____

Horário: ____:____

Resp.: _____

Obs.: Se for necessário remarcar o exame ligar no tel.: 2127-7000 ou por e-mail: atendimentoaocliente@pasteur.com.br

IMPORTANTE: Este exame somente poderá ser realizado na Unidade Ana Costa de segunda à sexta-feira com agendamento prévio.

Informações: Central de Relacionamento com o Cliente - (13) 2127.7000

www.pasteur.com.br

FO-376/05

Referência: POPCOL 34 e DQ 27