

Inhaltsverzeichnis

1	Differentiation	2
2	Differenzierbare Funktionen auf Intervallen	9
3	Riemann-Integral	18
4	Differentiation und Integration	35
5	Erweiterungen des Integralbegriffs	40
5.1	Uneigentliche Integrale	40
5.2	Integrale über komplexwertige Funktionen	43
6	Differentialgleichungen	45
6.1	Trennung der Variablen	47

1 Differentiation

Definition 1.1. Sei $f : D(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in D(f)$ ein Punkt, um den ein offenes Intervall $B_\epsilon(x)$ (für geeignetes $\epsilon > 0$) komplett in $D(f)$ enthalten ist ($B_\epsilon(x) \subseteq D(f)$). Dann heißt f an der Stelle x_0 differenzierbar, wenn der Grenzwert

$$Df(x_0) := \frac{df}{dx}(x_0) := f'(x_0)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existiert.

Wir meinen mit $f'(x_0)$ die Ableitung (seltener Differentialquotient) von f an der Stelle x_0 .

Ist $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$ in jedem $x \in D(f)$ differenzierbar, dann heißt f schlechthin differenzierbar. Etwas irreführend wird auch die Abbildung

$$f' : D(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f'(x)$$

als Ableitung von f bezeichnet.

Satz 1.1. Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in I$. Dann sind äquivalent:

1. Es gibt ein $c \in \mathbb{R}$ und $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$, so dass

$$f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + \phi(x)$$

und

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\phi(x)}{x - x_0} = 0 \tag{1}$$

2. Es gibt ein $\tilde{c} \in \mathbb{R}$ und $u : I \rightarrow \mathbb{R}$, so dass

$$f(x) = f(x_0) + \tilde{c}(x - x_0) + u(x)(x - x_0)$$

und

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0$$

3. f ist in x_0 differenzierbar

Gelten die obigen Aussagen, so gilt

$$f''(x_0) = c = \tilde{c}$$

Das heißt insbesondere c und \tilde{c} sind eindeutig bestimmt

Bemerkung.

- Der springende Punkt in 1 ist Gleichung 1. Ohne Gleichung 1 kann man sich ein beliebiges $c \in \mathbb{R}$ wählen und setzt

$$\phi(x) := f(x) - f(x_0) - c(x - x_0)$$

- Vergisst man die Funktion ϕ , versteht man mit der Geradengleichung

$$x \mapsto f(x_0) + c(x - x_0)$$

Das ist per Definition die Gleichung der Tangente an f in x_0

Hier ist
der Satz
unvollständig

Beweis.

$1 \leftrightarrow 2$ Man setze einfach $u(x) = \frac{\phi(x)}{x-x_0}$ und $\tilde{c} = c$
(in $x = x_0$ setze man $u(x_0) = 0$)

$1 \rightarrow 2$ ZZ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existiert

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0) + c(x - x_0) + \phi(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} c + \frac{\phi(x)}{x - x_0} = c \end{aligned}$$

$3 \rightarrow 1$ Wir setzten $c = f'(x_0)$ und

$$\phi(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)$$

offensichtlich gilt dann:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \phi(x)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{\phi(x)}{x - x_0} \right| &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} \right| \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \\ &= f'(x_0) - f'(x_0) = 0 \end{aligned}$$

■

Satz 1.2. Es sind äquivalent: $f : I \rightarrow \mathbb{R}$

1. $f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \phi(x)$
mit: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\phi(x)}{|x - x_0|} = 0$
2. $f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \phi(x) + u(x) \cdot (x - x_0)$
mit: $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0$
3. Der Grenzwert $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existiert

Satz 1.3. Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in $x_0 \in I$. Dann ist f in x_0 stetig.

Beweis. ZZ ist: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Äquivalent dazu: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) = 0$.

Nun gilt: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{\frac{x - x_0}{x - x_0}} = f'(x_0) \cdot 0 = 0$ ■

Bemerkung.

- Die Umkehrung dieser Aussage ist im Allgemeinen falsch!
Es gibt sogar Funktionen, die überall stetig, aber nirgends differenzierbar sind.
(Beispiel: Weierhaus-Fkt: $\sum_{n \in \mathbb{N}} \cos(b_n \pi x)$ mit $a_n \in (0, 1)$ und $a_n b_n > 1$)
- Jede nicht stetige Funktion ist nicht differenzierbar

Satz 1.4. Seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ in $x \in I$ differenzierbar, $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall. Dann sind $f + g$, $f \cdot g$ und $\frac{f}{g}$ (sofern $g(x) \neq 0$) in x differenzierbar.
Es gilt:

1. $(f + g)' = f'(x) + g'(x)$ (Summenregel)
2. $(f \cdot g)' = f'(x)g(x) + f(x) \cdot g'(x)$ (Produktregel)
3. $(\frac{f}{g})' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$ (Quotientenregel)

Beweis.

1. $(f + g)'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) + g(y) - (f(x) + g(x))}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} + \frac{g(y) - g(x)}{y - x}$
 $= \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} + \lim_{y \rightarrow x} \frac{g(y) - g(x)}{y - x} = f'(x) + g'(x)$
2. $\lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y)g(y) - f(x)g(x)}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y)g(y) - f(y)g(x) + f(y)g(x) - f(x)g(x)}{y - x}$
 $= \lim_{y \rightarrow x} f(y) \frac{g(y) - g(x)}{y - x} + g(x) \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$
 $= \lim_{y \rightarrow x} f(y) \lim_{y \rightarrow x} \frac{g(y) - g(x)}{y - x} + g(x) \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$
 $\stackrel{\text{Satz 1.3}}{=} f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$

$$\begin{aligned}
3. \lim_{y \rightarrow x} \frac{\frac{f(y)}{g(y)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{y-x} &= \lim_{y \rightarrow x} \frac{\frac{f(y)}{g(y)} \frac{g(x)}{g(x)} - \frac{f(x)}{g(x)} \frac{g(y)}{g(y)}}{y-x} = \lim_{y \rightarrow x} \frac{1}{g(y)g(x)} \frac{f(y)g(x) - f(x)g(y)}{y-x} \\
&= \frac{1}{g^2(x)} \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y)g(x) - f(y)g(y) + f(y)g(y) - f(x)g(y)}{y-x} \\
&= \frac{1}{g^2(x)} \lim_{y \rightarrow x} f(y) \cdot \frac{g(x) - g(y)}{y-x} + g(y) \frac{f(y) - f(x)}{y-x} \\
&= \frac{1}{g^2(x)} \cdot \left(\lim_{y \rightarrow x} f(y) \frac{g(x) - g(y)}{y-x} + \lim_{y \rightarrow x} g(y) \frac{f(y) - f(x)}{y-x} \right) \\
&= \frac{1}{g^2(x)} (f(x) \cdot (-g'(x)) + g(x) f'(x)) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}
\end{aligned}$$

■

Beispiel 1.1.

- $f(x) = c \in \mathbb{R} (x \in \mathbb{R})$
 $\rightarrow f'(x) = \lim_{x \rightarrow y} \frac{f(y) - f(x)}{y-x} = \lim_{x \rightarrow y} \frac{c-c}{y-x} = 0$
- $f(x) = x (x \in \mathbb{R})$
 $f'(x) = \lim_{x \rightarrow y} \frac{y-x}{y-x} = 1$
- $f(x) = x^n, (x \in \mathbb{R})$ wobei $n \in \mathbb{N}$
 $f'(x) = nx^{n-1}$ per Induktion:
 $n = 1$ Stichpunkt 2 ✓
 $n \rightarrow n+1$: Sei also $f(x) = x^{n+1}$. Das gibt mit der Produktregel:
 $f'(x) = (x \cdot x^n)' = (x)' \cdot (x^n)' = 1 \cdot xn + x \cdot n \cdot x^{n-1} = x^n + nx^n = (n+1)x^n$

Damit sind alle Polynome differenzierbar und für $p(x) = \sum_{l=0}^n a_l x^l$ gilt (Summenregel):

$$p'(x) = \sum_{l=0}^n l \cdot a_l \cdot x^{l-1} = \sum_{l=1}^n l \cdot a_l x^{l-1}$$

- Seien P_1 und P_2 Polynome.
Dann nennt man die Abbildung
 $Q : \mathbb{R} \setminus \{x | P_2(x) = 0\} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{P_1(x)}{P_2(x)}$ eine rationale Funktion.
Mit obiger sehen wir: rationale Funktionen sind auf dem kompletten Definitionsbereich differenzierbar.
- Die Funktion $| \cdot | : x \mapsto |x| = \begin{cases} x & \text{für } x \geq 0 \\ -x & \text{sonst} \end{cases}$ ist nicht in 0 differenzierbar.
Denn:

$$\begin{aligned}
\lim_{y \searrow 0} \frac{|y| - |0|}{y - 0} &= \lim_{y \searrow 0} \frac{y - 0}{y - 0} = 1 \\
\lim_{y \nearrow 0} \frac{|y| - |0|}{y - 0} &= \lim_{y \nearrow 0} \frac{-y - 0}{y - 0} = -1
\end{aligned}$$

Satz 1.5 (Kettenregel). Seien I_f und I_g Intervalle, $x_0 \in I_f$ und $f : I_f \rightarrow \mathbb{R}$ in x_0 differenzierbar und $g : I_g \rightarrow \mathbb{R}$ sei in $f(x_0)$ differenzierbar und $f(I_f) \subseteq I_g$. Dann gilt:

$$\frac{dg \circ f}{dx}(x_0) = \frac{dg}{dx}(f(x_0)) \cdot \frac{df}{dx}(x_0)$$

Beweis. Da f in x_0 differenzierbar ist, gilt für alle $x \in I_f$:

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0) \cdot (f'(x_0) + u(x))$$

(Wobei $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0$)

Analog gilt für alle $y \in I_g$:

$$g(y) - g(f(x_0)) = (y - f(x_0)) \cdot (g'(f(x_0)) + v(y)),$$

wobei $\lim_{y \rightarrow f(x_0)} v(y) = 0$

Damit haben wir für alle $x \in I_f$:

$$\begin{aligned} g(f(x)) - g(f(x_0)) &= (f(x) - f(x_0)) \cdot (g'(f(x_0)) + v(f(x))) \\ &= (x - x_0)(f'(x_0) + u(x))(g'(f(x_0)) + v(f(x))) \end{aligned}$$

Damit gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} (f'(x_0) + u(x))(g'(f(x_0)) + v(f(x))) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} (f'(x_0) + u(x)) \lim_{x \rightarrow x_0} (g'(f(x_0)) + v(f(x))) \\ &= (f'(x_0) + 0)(g'(f(x_0)) + 0) = f'(x_0)g'(f(x_0)) \end{aligned}$$

■

Definition 1.6. Ist $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar und $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann heißt f stetig differenzierbar. Wir definieren weiterhin induktiv die k -te Ableitung (für $k \in \mathbb{N}$) durch:

$$\begin{aligned} f^{(0)} &:= f \\ f^{(k+1)} &:= f^{(k+1)'} \end{aligned}$$

sofern die Ableitungen definiert sind.

Ist $f^{(k)} : I \rightarrow \mathbb{R}$ für alle $k \in \mathbb{N}$ definiert, so heißt f beliebig oft beziehungsweise unendlich oft differenzierbar.

Bemerkung. Wir haben bereits gesehen: Polynome sind beliebig oft differenzierbar.

Satz 1.7. Sei $p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$, $a_k \in \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ eine Potenzreihe vom Konvergenzradius $R > 0$. Dann ist $p : x \mapsto p(x)$ auf ganz $(x_0 - R, x_0 + R)$ differenzierbar mit $p'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} (x - x_0)^k$. Insbesondere ist p' auch wieder eine Potenzreihe (die man durch gliedweises differenzieren erhält) mit Konvergenzradius R .

Bemerkung.

1. Damit erhalten wir:

$$\exp'(x) = \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{x^l}{l!} \right)' = \sum_{l=0}^{\infty} (l+1) \frac{x^l}{(l+1)!} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{x^l}{l!} = \exp(x)$$

2. Damit sind Potenzreihen ∞ oft differenzierbar

Beweis. Wir zeigen zunächst die Aussage über den Konvergenzradius. Beachte, dass:

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} (x - x_0)^k \right) (x - x_0) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} (x - x_0)^{k+1}$$

Ergo, für den Konvergenzradius der obigen Potenzreihe ergibt sich nach Cauchy-Hadamard:

$$R_{\phi'} = \left(\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k+1]{(k+1) a_{k+1}} \right)^{-1} = R \left(\text{da } \sqrt[k]{k} \rightarrow 1 \right)$$

Damit ist p' wohldefiniert.

Wir zeigen nun, dass p' tatsächlich die Ableitung von p darstellt. ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $x_0 = 0$.

Dann gilt für $y \in (-R, R)$:

$$p(x) - p(y) - p'(y)(x - y) = \sum_{k=\sigma}^{\infty} a_k (x^k - y^k) - (k+1) a_{k+1} y^k (x - y)$$

Wir setzen $\Delta(x, y) = \sum_{n=\sigma}^{\infty} a_n \frac{x^n - y^n}{x - y} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n y^{n-1}$.

Man sieht leicht (Teleskopsumme), dass:

$$\frac{x^n - y^n}{x - y} = \begin{cases} \sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k} y^k & n \geq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Also folgt:

$$\Delta(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left[\sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k} y^k - n y^{n-1} \right] \quad (2)$$

Für $n = 1$ ist $[...] = 0$ und für $n \geq 2$:

Hier nicht ... sondern Gleichungsnummer ?

$$\begin{aligned}
[...] &= \sum_{k=0}^{n-2} x^{n-1-k} y^k - (n-1)y^{n-1} \\
&= \sum_{k=0}^{n-2} (k+1)x^{n-1-k} y^k - \sum_{k=0}^{n-2} kx^{n-1-k} y^k \cdot (n-1)y^{k-1} \\
&= \sum_{k=0}^{n-2} (k+1)x^{n-1-k} y^k - \sum_{k=0}^{n-1} kx^{n-1-k} y^k \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} kx^{n-k} y^{k-1} - \sum_{k=1}^{n-1} kx^{n-1-k} y^k \\
&= (x-y) \sum_{k=1}^{n-1} kx^{n-1-k} y^{k-1}
\end{aligned} \tag{3}$$

Sein nun $|y| < r < R$ und $|x| \leq r$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
|\Delta(x, y)| &\leq \sum_{n=2}^{\infty} |a_n| |x-y| \cdot \sum_{k=1}^{n-1} k |x|^{n-1-k} |y|^{k-1} \\
&\leq \sum_{n=2}^{\infty} |a_n| |x-y| r^{n-2} \cdot \sum_{k=1}^{n-1} k \leq |a_n| r^{n-2} n^2 |x-y|
\end{aligned}$$

Nach Cauchy-Hadamard hat diese Reihe $q(z) = \sum_{n=2}^{\infty} |a_n| n^2 z^n$ den Konvergenzradius R , weshalb

$$\sum_{n=2}^{\infty} |a_n| r^{n-2} n^2 = \frac{1}{r^2} \sum_{n=2}^{\infty} |a_n| n^2 r^n$$

konvergiert. Damit folgt aber $\lim_{x \rightarrow y} \Delta(x, y) = 0$ ■

Proposition 1.1. Sei $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ streng monoton und differenzierbar in $p \in (a, b)$ mit $f'(p) \neq 0$. Dann ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in $q = f(p)$ und es gilt:

$$(f^{-1})'(q) = \frac{1}{f'(p)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(q))}$$

Beweis. Da f streng monoton ist, ist f^{-1} stetig.

Insbesondere gilt $f^{-1}(y) \rightarrow f^{-1}(q)$ für $y \rightarrow q$.

Damit gilt:

$$\begin{aligned}
\lim_{y \rightarrow q} \frac{1}{y - q} (f^{-1}(y) - f^{-1}(q)) &= \lim_{y \rightarrow q} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(q)}{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(q))} \\
&= \left(\lim_{y \rightarrow q} \frac{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(q))}{f^{-1}(y) - f^{-1}(q)} \right)^{-1} \\
&= (f'(f^{-1}(q)))^{-1} = \frac{1}{f'(f^{-1}(q))}
\end{aligned}$$
■

Beispiel 1.2.

- k -te Wurzel $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} : y \mapsto y^{\frac{1}{k}}$ ist differenzierbar mit $g'(y) = \frac{1}{k}y^{\frac{1}{k}-1}$
Denn g ist Umkehrfunktion zu $f(x) = x^k$
Damit gilt:

$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))} = \frac{1}{k(\sqrt[k]{y})^{k-1}} = \frac{1}{k}y^{\frac{1}{k}-1}$$

- Logarithmus $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} : y \mapsto \ln y$. Es ist $\ln'(y) = \frac{1}{y}$, **denn:**

$$\ln'(y) = \frac{1}{\exp'(\ln y)} = \frac{1}{\exp(\ln y)} = \frac{1}{y}$$

Bemerkung. Für $\alpha \in \mathbb{R}$ und $x > 0$ ist $x^\alpha := \exp(\alpha \ln(x))$

Anwendung: Die Funktion $(\circ)^\alpha : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty) : x \mapsto \alpha x^\alpha$ hat die Ableitung $((\circ)^\alpha)' : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty) : x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$ **denn**

$$\begin{aligned}(x^\alpha)' &= \exp'(\alpha \ln(x)) = \exp(\alpha \ln x) \frac{\alpha}{x} \\ &= \alpha \exp(\alpha \ln x) \exp(-\ln x) = \alpha \exp((\alpha - 1) \ln x) \\ &= \alpha x^{\alpha-1}\end{aligned}$$

Es folgen die bekannten Rechenregeln $x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}$ und $x^\alpha \cdot y^\alpha = (xy)^\alpha$

2 Differenzierbare Funktionen auf Intervallen

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall

Definition 2.1. Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Wir sagen, f hat in $x_0 \in I$ ein lokales Maximum (lokales Minimum), falls ein $\delta > 0$ gibt, so dass

$$\forall x \in B_\delta(x_0) : f(x) \leq f(x_0) \text{ (} f(x) \geq f(x_0) \text{) gilt.}$$

Gilt:

$$f(x) \leq f(x_0) \text{ (} f(x) \geq f(x_0) \text{)}$$

für alle $x \in I$, so sagen wir, dass x_0 ein globales Maximum (globales Minimum) ist. Sind die entsprechenden Ungleichungen strikt, so reden wir von strikten Maxima (strikte Minima). Maximum und Minimum werden unter dem Begriff Extremum zusammengefasst.

Satz 2.1. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Hat f ein lokales Maximum (lokales Minimum) in $x_0 \in (a, b)$ und existiert $f'(x_0)$, so gilt $f'(x_0) = 0$.

Beweis. Wir betrachten den Fall des Maximums. Es gilt:

$$\lim_{x \nearrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

und:

$$\lim_{x \searrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

Wegen Differenzierbarkeit in x_0 folgt:

$$\text{Gleichung 1} = \text{Gleichung 2} \Rightarrow f'(x_0) = 0$$

■

Satz 2.2 (verallgemeinerter Mittelwertsatz). Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und auf ganz (a, b) differenzierbar. Dann existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit:

$$(g(b) - g(a)) f'(\xi) = (f(b) - f(a)) g'(\xi)$$

Beweis. Wir betrachten $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$t \mapsto (g(b) - g(a)) f(t) - (f(b) - f(a)) g(t)$$

Offensichtlich (nach Summenregel) ist h differenzierbar auf (a, b) . Es gilt:

$$h'(t) = (g(b) - g(a)) f'(t) - (f(b) - f(a)) g'(t)$$

Wir zeigen: es existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit $h'(\xi) = 0$. Damit folgt dann die Aussage.


Beachte:

$$\begin{aligned} h(a) &= (g(b) - g(a)) f(a) - (f(b) - f(a)) g(a) \\ &= g(b) \cdot f(a) - f(b) \cdot g(a) \\ &= (g(b) - g(a)) f(b) - (f(b) - f(a)) g(b) \\ &= h(b) \end{aligned}$$

Fall 1: $h = \text{const}$ Dann gilt trivialerweise $h' = 0$ und wir sind fertig.

Fall 2: $h \neq \text{const}$ Offensichtlich ist h stetig auf dem abgeschlossenen Intervall $[a, b]$. Damit besitzt h ein globales Maximum und ein globales Minimum. Ohne Einschränkung existiert ein $\tilde{\xi} \in (a, b)$ mit $h(\tilde{\xi}) > h(a)$, sonst betrachte $-h$ statt h .

Also existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit $h(\xi) \geq h(x)$ ($x \in [a, b]$). Mit anderen Worten: ξ ist auch ein globales Maximum und daher auch ein lokales Maximum. Mit Satz 2.1 folgt: $h'(\xi) = 0$ ■



Satz 2.3 (Mittelwertsatz(MWS)). Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und differenzierbar auf (a, b) . Dann gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$f(b) - f(a) = (b - a) \cdot f'(\xi)$$

Bemerkung. Es ist oft wichtig, dass f nur auf (a, b) differenzierbar sein muss.

Beweis. Das folgt aus Satz 2.2 mit $g = \text{id}_{[a, b]}$, d.h. $g(x) = x$ ($x \in [a, b]$). ■

Satz 2.4. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und differenzierbar auf (a, b) . Dann gilt:

- a) $f = \text{const} \Leftrightarrow f'(x) = 0 \ (x \in (a, b))$
- b) f ist monoton wachsend $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0 \ (x \in (a, b))$
- c) f ist streng monoton wachsend $\Leftrightarrow f'(x) > 0 \ (x \in (a, b))$
- d) f ist monoton fallend $\Leftrightarrow f'(x) \leq 0 \ (x \in (a, b))$
- e) f ist streng monoton fallend $\Leftrightarrow f'(x) < 0 \ (x \in (a, b))$

Beweis. a) folgt aus b) und c).

Weiterhin folgt d) beziehungsweise e) aus b) beziehungsweise c).

Sei $y > x \in [a, b]$. Sei $f|_{[x, y]}$ die *Einschränkung* von f auf $[x, y]$, das heißt:

$$f|_{[x, y]} : [x, y] \rightarrow \mathbb{R}, z \mapsto f(z)$$

Offensichtlich erfüllt $f|_{[x, y]}$ die Bedingungen des MWS.

Es existiert ein $\xi \in (x, y)$ mit $f(y) - f(x) = (y - x) \cdot f'(\xi)$

Fall b) $f(y) - f(x) = (y - x) \cdot f'(\xi) \geq 0$

$$\hookrightarrow f(y) \geq f(x)$$

Fall c) $f(y) - f(x) > 0$

$$\hookrightarrow f(y) > f(x)$$

Beweis der Richtung \Leftarrow in Teil b): Ist $f'(x) \geq 0$ so gilt

$$\lim_{y \searrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \lim_{y \nearrow x} \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \geq 0$$

Da f monoton wachsend ist, gilt für $y > x$:

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$$

Folglich gilt:

$$\lim_{y \searrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$$

Äquivalent für $\lim_{y \nearrow x}$. ■

Korollar 2.1. Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und differenzierbar auf (a, b) mit $f'(x) = g'(x)$ für $x \in (a, b)$. Dann gilt $f - g = \text{const}$

Beweis. Es gilt:

$$(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

Damit folgt die Aussage mit Satz 2.4. ■

Satz 2.5. Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar ($I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall). Gibt es $\xi \in I$ mit $f'(\xi) = 0$ und $f''(\xi) < 0$ ($f''(\xi) > 0$), so nimmt f an der Stelle ξ ein striktes lokales Maximum (Minimum) an.

Beweis. Wir betrachten nur den Fall $f''(\xi) < 0$. Für den Fall $f''(\xi) > 0$ betrachte man $-f$.

Per Definition haben wir also:

$$f''(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f'(x) - f'(\xi)}{x - \xi} < 0$$

$$r := \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f'(x) - f'(\xi)}{x - \xi}$$

Das heißt es existiert für jedes $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ mit:

$$\left| \frac{f'(x) - f'(\xi)}{x - \xi} - r \right| < \epsilon$$

Für $\epsilon := \frac{r}{2}$ gilt daher:

$$\left| \frac{f'(\xi) - f'(x)}{\xi - x} - r \right| < \left| \frac{r}{2} \right| \text{ für ein entsprechend gewähltes } \delta > 0$$

Insbesondere gilt also:

$$\frac{f'(\xi) - f'(x)}{\xi - x} < 0$$

für alle $x \in (\xi - \delta, \xi + \delta)$.

Das heißt für $x < \xi$ gilt:

$$f'(\xi) - f'(x) < 0$$

und für $x > \xi$ gilt:

$$f'(\xi) - f'(x) > 0$$

Ergo: f' ist streng monoton fallend auf $(\xi - \delta, \xi]$ und streng monoton wachsend auf $[\xi, \xi + \delta)$

Da $f'(\xi) = 0$ folgt, dass $f'(x) > 0$ für $x \in (\xi - \delta, \xi]$ und $f'(x) < 0$ für $x \in [\xi, \xi + \delta)$.

Mit Satz 2.4 folgt:

$f|_{(\xi - \delta, \xi]}$ ist streng monoton wachsend und

$f|_{[\xi, \xi + \delta)}$ ist streng monoton fallend. ■

Satz 2.6 (Regel von l'Hospital). Seien $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$-\infty \leq a < b \leq \infty$$

differenzierbar und $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$. Weiter gelte:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

Wobei $-\infty \leq A \leq \infty$ sei und $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$,

sowie $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ bzw. $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$.

Dann gilt: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$. Die analoge Aussage gilt auch für $x \rightarrow b$.

Bemerkung.

- Wir verwenden hier den erweiterten Grenzwertbegriff, d.h. $\pm\infty$ sind als Grenzwerte zulässig.
- Zwei wesentliche Voraussetzungen:
 1. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert!
 2. ebenso ist essentiell, dass $f, g \rightarrow \frac{\circ}{\pm\infty}$
- Gegebenenfalls lässt sich l'Hospital iterieren:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\exp(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\exp(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\exp(x)} = 0$$

- Man kann l'Hospital auch verwenden um Ausdrücke der Form $0 \cdot \infty$ zu behandeln, indem wir diese in die Form

$$\frac{\infty}{\infty} = \frac{\infty}{\frac{1}{\infty}} \text{ beziehungsweise } \frac{0}{0} = \frac{0}{\frac{1}{\infty}}$$

umrechnen.

Beweis. Wir beschränken uns auf den Fall $x \rightarrow a$ ($x \rightarrow b$ läuft analog) und zeigen zunächst folgende Aussage:

Behauptung: Sei $A \in [-\infty, \infty)$.

Dann existiert für jedes $q > A$ ein $c > a$ mit $\frac{f(x)}{g(x)} < q$ ($x \in (a, c)$).

Beweis der Behauptung:

Da $\frac{f'(x)}{g'(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} A$ existiert ein $c' > a$ mit: $\frac{f'(x)}{g'(x)} < r$ für ein beliebiges $r \in (A, q)$ und $x \in (a, c')$.

Nach dem verallgemeinerten Mittelwertsatz gilt:

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(t)}{g'(t)} \quad (4)$$

für ein geeignetes t zwischen x und y .

Für $a < x < y < c'$ gilt daher:

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} < r \quad (5)$$

Fall 1: $f, g \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$. Nach Gleichung (5) gilt für $x \rightarrow a$

$$\frac{-f(y)}{-g(y)} = \frac{f(y)}{g(y)} < r < q \quad (y \in (a, c'))$$

Fall 2: $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \pm\infty$ Multipliziere (4) mit $\frac{g(x) - g(y)}{g(x)}$.

Dann erhalten wir:

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(y)}{g(y)} &= \frac{f'(t)}{g'(t)} \left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right) \\ \rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f'(t)}{g'(t)} \left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right) + \frac{f(y)}{g(y)} \end{aligned}$$

Für $x \rightarrow a$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \leq r < q$$

Es muss also ein $c > a$ existieren mit: $\frac{f(x)}{g(x)} < r$ ($x \in (a, c)$)

Analog kann man zeigen:

Behauptung': Sei $A \in (-\infty, \infty]$. Dann existiert für jedes $p < A$ ein $d > a$, so dass $p < \frac{f(x)}{g(x)}$ ($x \in (a, d)$)

Für $A = +\infty$ folgt die Aussage aus der letzten Behauptung, für $A = -\infty$ aus der ersten Behauptung.

Für $A \in \mathbb{R}$ argumentieren wir wie folgt:

Sei $\epsilon > 0$ gegeben. Nach der ersten Behauptung existiert $c > a$, so dass $\frac{f(x)}{g(x)} < A + \epsilon$ ($x \in (a, c)$). Nach der zweiten Behauptung existiert $d > a$ mit:

$$\frac{f(x)}{g(x)} > A - \epsilon \quad (x \in (a, d))$$

Für $x \in (a, \min\{c, d\})$ gilt daher

$$\frac{f(x)}{g(x)} \in B_\epsilon(A)$$

■

Beispiel 2.1. $f(x) = 1, g(x) = x + 7$

Dann gilt: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{7}$

aber: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{0}{1} = 0$

Beispiel 2.2.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0+} x^\alpha \ln(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln(x)}{x^{-\alpha}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{x}}{-\alpha x^{-\alpha-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^\alpha}{-\alpha} = 0 \text{ für } \alpha > 0\end{aligned}$$

Definition 2.2. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Wir sagen, dass f in a (rechtsseitig) differenzierbar ist, falls der Grenzwert

$$\lim_{x \searrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existiert. Analog sagen wir, dass f in b (linksseitig) differenzierbar ist, falls der Grenzwert

$$\lim_{x \nearrow b} \frac{f(x) - f(b)}{x - b}$$

existiert. Wir sagen, f ist auf $[a, b]$ differenzierbar, wenn f in (a, b) differenzierbar und in a rechtsseitig sowie in b linksseitig differenzierbar ist. Entsprechend verallgemeinern sich die Begriffe n -Mal (stetig) differenzierbar etc...

Definition 2.3. Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ n -Mal differenzierbar. Dann heißt

$$\begin{aligned}P_{n,\alpha} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sum_{l=0}^n \frac{f^{(l)}(\alpha)}{l!} (x - \alpha)^l\end{aligned}$$

das n -te Taylorpolynom, wobei $\alpha \in I$ sei, von f an der Stelle α .

Bemerkung. Offensichtlich gilt: $f(\alpha) = P_{n,\alpha}(\alpha)$. Weiter gilt:

$$f'(\alpha) = P'_{n,\alpha}(\alpha) = \left(\sum_{l=0}^n l \cdot \frac{f^{(l)}(\alpha)}{l!} (x - \alpha)^{l-1} \right)$$

und analog:

$$\begin{aligned}f^{(l)}(\alpha) &= P_{n,\alpha}^{(l)} = P_{n,\alpha}^{(l)}(\alpha) \\ &\quad (l = 1, \dots, n)\end{aligned}$$

ich vermute, die Summe sollte bei 0 beginnen

Satz 2.7 (Satz von Taylor (mit Lagrange-Restglied)). Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ und f $(n-1)$ -mal stetig differenzierbar (auf $[a, b]$) und n -mal differenzierbar auf (a, b) . Seien $\alpha \neq \beta$ in $[a, b]$ gegeben. Dann existiert ein x zwischen α und β , so dass gilt:

$$f(\beta) = P_{n-1,\alpha}(\beta) + \frac{f^{(n)}(x)}{n!} (\beta - \alpha)^n$$

Beweis. Wähle $M \in \mathbb{R}$ mit

$$f(\beta) = P_{n-1,\alpha}(\beta) + M(\beta - \alpha)^n$$

Man beachte, dass die $n - te$ Ableitung der rechten Seite gegeben ist durch:

$$P_{n-1,\alpha}^{(n)}(t) + n! \cdot M \text{ (für } t \in [a, b])$$

Daher ist zu zeigen: Es existiert ein x zwischen α und β mit:

$$f^{(n)}(x) = n! \cdot M$$

Wir definieren die Hilfsfunktion

$$\begin{aligned} h(t) &= f(t) - P_{n-1,\alpha}(t) - M(t - \alpha)^n \text{ für } t \in [a, b] \\ h(\beta) &= f(\beta) - P_{n-1,\alpha}(\beta) - M(\beta - \alpha)^n = 0 \\ h(\alpha) &= f(\alpha) - P_{n-1,\alpha}(\alpha) - M(\alpha - \alpha)^n = 0 \text{ siehe obige Bemerkung} \\ h'(\alpha) &= f'(\alpha) - P_{n-1,\alpha}'(\alpha) - n \cdot M(\alpha - \alpha)^{n-1} = 0 \end{aligned}$$

Man sieht analog:

$$h^{(l)}(\alpha) = 0 \text{ für } l = 1, \dots, n-1$$

Damit existiert aufgrund des Mittelwertsatzes ein x_1 zwischen α und β mit $h'(x_1) = 0$. Analog gibt es zwischen α und x_1 ein x_2 mit $h''(x_2) = 0$. Man findet also x_1, \dots, x_{n-1} mit $h^{(l)}(x_l) = 0$ ($l = 1, \dots, n-1$). Insbesondere existiert ein x zwischen α und x_{n-1} (also zwischen α und β) mit $h^{(n)}(x) = 0$. Damit gilt

$$0 = h^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) - P_{n-1,\alpha}^{(n)}(x) - M \cdot n! \cdot (x - \alpha)^0$$

und daher $f^{(n)}(x) = M \cdot n!$ ■

Bemerkung. Die obige Darstellung des Restgliedes ist die sogenannte *Lagrange'sche Darstellung*

Beispiel 2.3. Sei $f(x) = \sqrt{1+x}$. Offensichtlich:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+x}} \\ f''(x) &= -\frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt[3]{1+x}} \end{aligned}$$

Damit erhalten wir:

$$P_{1,0}(t) = 1 + \frac{1}{2}t$$

Nach dem Satz von Taylor gilt:

$$\sqrt{1+t} - P_{1,0}(t) = -\frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt[3]{1+x}} \cdot \frac{1}{2}t^2 = -\frac{1}{8} \frac{1}{\sqrt[3]{1+x}}t^2$$

für ein x zwischen 0 und t .

Für $t > 0$ ergibt sich damit:

$$|\sqrt{1+t} - P_{1,0}(t)| < \frac{t^2}{8}$$

Korollar 2.2. Ist $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ n – Mal differenzierbar und $g^{(n)} = 0$, so ist g ein Polynom höchstens $(n - 1)$ – ten Grades

Korollar 2.3. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ $(n + 1)$ – mal stetig differenzierbar und $\alpha \in I$ mit $f^{(l)}(\alpha) = 0$ für alle $l = 1, \dots, n - 1$ und $f^{(n+1)}(\alpha) \neq 0$.
Dann gilt:

- ist n ungerade, so ist α keine Extremstelle
- ist n gerade, so ist α eine Extremstelle. Genauso gilt: Ist $f^{(n)}(\alpha) < 0$, so ist α eine Maximalstelle. Ist $f^{(n)}(\alpha) > 0$, so ist α Minimalstelle.

Beweis.

- Wir betrachten nur den Fall n gerade und $f^{(n)}(\alpha) > 0$.
Nach dem Satz von Taylor gilt für alle $x \in I$:

$$\begin{aligned} f(x) &= P_{n,\alpha}(x) + \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!}(x-\alpha)^{n+1} \\ &= f(\alpha) + \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!}(x-\alpha)^n + \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!}(x-\alpha)^{n+1} \\ &= f(\alpha) + \frac{(x-\alpha)^n}{n!} \left(f^{(n)}(\alpha) + \left(\frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)}(x-\alpha) \right) \right) \end{aligned}$$

für ein t zwischen x und α . Für x hinreichend nah an α erhalten wir:

$$f^{(n)}(\alpha) + \frac{f^{(n+1)}(t)}{n+1}(x-\alpha)$$

Ergo:

$$f(x) = f(\alpha) + \frac{(x-\alpha)^n}{n!} \cdot r(x)$$

Da ist also $f(x) > f(\alpha)$ für x hinreichend nah an α .
Sprich: α ist strikte lokale Minimalstelle

■

Definition 2.4. Ist $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ beliebig oft differenzierbar, so definieren wir die Taylorreihe am Entwicklungspunkt $\alpha \in I$.

$$T_{f,\alpha}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} (x - \alpha)^n$$

Bemerkung.

- im Allgemeinen konvergiert $T_{f,\alpha}(x)$ für $x \neq \alpha$ nicht
- Der Satz von Taylor behandelt nicht die Taylorreihe
- Selbst wenn $T_{f,\alpha}(x)$ konvergiert, muss $T_{f,\alpha}(x) = f(x)$ nicht gelten
- Sei $R_n(x) = P_{n,\alpha}(x) - f(x)$ Dann gilt :

$$P_{n,\alpha}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x) \Leftrightarrow R_n(x) \rightarrow 0$$

Satz 2.8. Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - \alpha)^n$ und $R > 0$ der zugehörige Konvergenzradius von f .

Dann ist f auf $(\alpha - R, \alpha + R)$ beliebig oft differenzierbar und es gilt:

$$f^{(l)}(\alpha) = l! \cdot a_l$$

das heißt, die Taylorreihe $T_{f,\alpha}$ stimmt mit der definierten Potenzreihe überein.

Beweis. Wir wissen bereits, dass Potenzreihen gliedweise differenziert werden. Daher gilt:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - \alpha)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n(x - \alpha)^{n-1} \\ &\vdots \\ f^{(l)} &= l! \cdot a_l + \sum_{n=l-1}^{\infty} n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-l) a_n(x - \alpha)^{n-l} \end{aligned}$$

für $l \in \mathbb{N}$:

$$x - \alpha = 0 \text{ für } x = \alpha$$

Also: $f^{(l)}(\alpha) = l! \cdot a_l$ ■

3 Riemann-Integral

Ziel: Wir wollen auf „natürliche“ Weise einen Flächeninhaltsbegriff definieren, der uns erlaubt die Fläche zwischen den Graphen einer Funktion und der x -Achse zu bestimmen (Abbildung 1).

Dabei heißt auf *natürliche Weise* insbesondere:

- gilt $f(x) = c = \text{const}$ für alle $x \in D(f) = [a, b]$, so soll gelten (Abbildung 2)

$$\int_a^b f \, dx = c \cdot (b - a)$$




Abbildung 1: Vorgehen




Abbildung 2: Konstante Funktion

- gilt $f(x) \leq g(x)$ ($x \in [a, b]$) so fordern wir (Abbildung 3)

$$\int_a^b f \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$$

- für $c \in [a, b]$ soll gelten (Abbildung 4)

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx$$

Vorgehen: Man unterteile $[a, b]$ in „viele“ Teilintervalle, auf denen f nahezu konstant ist.

Definition 3.1. Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall. Eine Partition P (Abbildung 5) von $[a, b]$ ist eine endliche Menge von Punkten $a = x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_n = b$. Wir schreiben $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

Definition 3.2. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ eine Partition von $[a, b]$.

Wir schreiben:

$$M_i(P) := \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

$$m_i(p) := \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

das geht besser auch mit Stichwortverzeichnis. Baue ich später ein.




Abbildung 3: Flächeninhalt zweier Funktionen




Abbildung 4: Integral aufteilen

Weiter definieren wir:

$$S(P, f) := \sum_{i=1}^n M_i \cdot \Delta x_i$$

$$s(P, f) := \sum_{i=1}^n m_i \cdot \Delta x_i$$

Wir setzen:

$$\overline{\int_a^b} f \, dx = \inf S(P, f)$$

$$\underline{\int_a^b} f \, dx = \sup s(P, f)$$

wobei Infimum und Supremum über alle Partitionen von $[a, b]$ genommen werden. Wir nennen

$$\overline{\int_a^b} f \, dx \text{ das obere und}$$

$$\underline{\int_a^b} f \, dx \text{ das untere}$$




Abbildung 5: Partition

Riemannintegral von f über $[a, b]$

Gilt:

$$\int_a^{\bar{b}} f \, dx = \int_a^b f \, dx$$

so sagen wir f ist Riemann-integrierbar (integrierbar) und nennen

$$\int_a^b f(x) \, dx := \int_a^b f \, dx = \overline{\int_a^b f \, dx}$$

das Riemannintegral von f über $[a, b]$.

Die Menge der Riemannintegrierbaren Funktionen auf $[a, b]$ bezeichnen wir mit \mathcal{R} beziehungsweise $\mathcal{R}_{[a, b]}$.




Abbildung 6: oberes Riemann-Integral

Bemerkung.

- Da f beschränkt ist, gibt es $m \leq M$ in \mathbb{R} mit:

$$m \leq f(x) \leq M \quad (x \in [a, b])$$

Damit gilt für jede Partition P :

$$m \cdot (b - a) \leq s(P, f) \leq S(P, f) \leq M \cdot (b - a)$$

Ergo: $\overline{\int_a^b f \, dx}, \underline{\int_a^b f \, dx}$ sind wohldefiniert.

- im gesamten Kapitel 3 werden wir Funktionen stets als beschränkt annehmen

Definition 3.3. Seien P_1, P_2 zwei Partitionen eines Intervalls. Dann heißt P_1 Verfeinerung von P_2 , wenn gilt: $P_2 \subseteq P_1$. Weiterhin nennen wir $P_1 \cup P_2$ die gemeinsame Verfeinerung von P_1 und P_2 .

Satz 3.1. Ist P' eine Verfeinerung der Partition P von $[a, b]$, dann gilt:

$$\begin{aligned} S(P, f) &\geq S(P', f) \\ s(P, f) &\leq s(P', f) \end{aligned}$$

(wobei f wie in Definition 3.2 sei).

Beweis. Wir zeigen nur die obere Ungleichung, die andere folgt analog. Wir nehmen zunächst an, dass P' sich von P in nur einem Element x' unterscheidet.

Das heißt: $P' = P \cup \{x'\}$

Dann gibt es ein $i \in \mathbb{N}$ mit $x' \in [x_{i-1}, x_i]$

(wobei $P = \{x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, \dots, x_n\}$ sei).

Wir definieren:

$$\begin{aligned} W_1 &:= \sup_{[x_{i-1}, x']} f(x) \\ W_2 &:= \sup_{[x', x_i]} f(x) \end{aligned}$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} S(P, f) - S(P', f) &= M_i \Delta x_i - W_1 \cdot (x' - x_{i-1}) - W_2 \cdot (x_i - x') \\ &= (M_i - W_1) \cdot (x' - x_{i-1}) + (M_i - W_2) \cdot (x_i - x') \geq 0 \end{aligned}$$

Enthält von P' k Punkte, die nicht in P enthalten sind, so führen wir obiges Verfahren insgesamt k -mal durch. ■

Satz 3.2. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt. Dann gilt:

$$\overline{\int_a^b f \, dx} \geq \underline{\int_a^b f \, dx}$$

Beweis. Seien P_1, P_2 zwei Partitionierungen von $[a, b]$ und P' die gemeinsame Verfeinerung. Dann gilt:

$$s(P_1, f) \leq s(P', f) \leq S(P', f) \leq S(P_2, f)$$

Mit anderen Worten:

$$s(P_1, f) \leq S(P_2, f)$$

für alle Partitionierungen P_1, P_2 .

Sprich: $S(P_2, f)$ ist stets obere Schranke von $s(P, f)$ für alle Partitionen P von $[a, b]$. Ergo:

$$\sup s(P, f) \leq S(P_2, f)$$

Damit ist also $\sup s(P, f)$ untere Schranke von $S(P, f)$ (P beliebige Partition).

Ergo: $\sup s(P, f) \leq \inf S(P, f)$

Wir haben also gezeigt:

$$\int_a^b f \, dx = \sup s(P, f) \leq \inf S(P, f) = \int_a^b f \, dx$$

■

Satz 3.3. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt. Dann ist $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ genau dann, wenn für jedes $\epsilon > 0$ eine Partition P_ϵ existiert mit:

$$S(P_\epsilon, f) - s(P_\epsilon, f) < \epsilon$$

Beweis. Per Definition gilt

$$s(P_\epsilon, f) \leq \int_a^b f \, dx \stackrel{\text{Satz 3.2}}{\leq} \overline{\int_a^b f \, dx} \leq S(P_\epsilon, f)$$

Damit erhalten wir:

$$\overline{\int_a^b f \, dx} - \int_a^b f \, dx \leq S(P_\epsilon, f) - s(P_\epsilon, f) < \epsilon$$

Das heißt, da ϵ beliebig, dass:

$$\int_a^b f \, dx = \overline{\int_a^b f \, dx}$$

Ergo: $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$

Per Definition gibt es für alle $\epsilon > 0$ ein P'_ϵ mit:

$$\int_a^b f \, dx - s(P'_\epsilon, f) < \frac{\epsilon}{2} \quad (6)$$

Analog existiert ein P''_ϵ mit

$$S(P''_\epsilon, f) - \overline{\int_a^b f \, dx} < \frac{\epsilon}{2} \quad (7)$$

Wir setzen P_ϵ gleich der gemeinsamen Vereinigung von P'_ϵ und P''_ϵ . Man beachte: Wegen Satz 3.1 gelten Gleichung 6 und Gleichung 7, wenn wir P'_ϵ , beziehungsweise P''_ϵ , durch P_ϵ ersetzen. Da $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ gilt außerdem:

$$\int_a^b f \, dx = \overline{\int_a^b f \, dx}$$

Addition von Gleichung 6 und Gleichung 7 liefert:

$$S(P_\epsilon, f) - s(P_\epsilon, f) < \epsilon$$

■

Satz 3.4. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und $P_\epsilon = \{x_0, \dots, x_n\}$ eine Partition von $[a, b]$ mit $S(P_\epsilon, f) - s(P_\epsilon, f) < \epsilon$ für ein $\epsilon > 0$.

1. Ist P eine Verfeinerung von P_ϵ , so gilt $S(P, f) - s(P, f) < \epsilon$
2. Sind s_i, t_i beliebige Punkte in $[x_{i-1}, x_i]$, so gilt:

$$\sum_{i=1}^n |f(s_i) - f(t_i)| \cdot \Delta x_i < \epsilon$$

3. Ist $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ und $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$, so gilt

$$\left| \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x_i - \int_a^b f \, dx \right| < \epsilon$$

Beweis.

1. Das folgt aus Satz 3.1

2.

$$\sum_{i=1}^n |f(s_i) - f(t_i)| \cdot \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \cdot \Delta x_i = S(P_\epsilon, f) - s(P_\epsilon, f) < \epsilon$$

3. Da $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$, gilt $m_i \leq f(t_i) \leq M_i$
Damit folgt die Aussage aus

$$s(P_\epsilon, f) \leq \sum_{i=1}^n m_i \cdot \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M_i \cdot \Delta x_i = S(P_\epsilon, f)$$

$$\text{und } s(P_\epsilon, f) \leq \int_a^b f \, dx \leq S(P_\epsilon, f)$$

■

Wir wollen im Folgenden wichtige Vertreter Riemann-integrierbarer Funktionen kennenlernen.

Satz 3.5. Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$.

Beweis. Da stetige Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen beschränkt sind, ist f offensichtlich beschränkt. Weiterhin ist f als stetige Funktion auf dem abgeschlossenen Intervall $[a, b]$ gleichmäßig stetig.

Sei $\epsilon > 0$ gegeben. Wegen der gleichmäßigen Stetigkeit von f existiert ein $\delta > 0$, so dass folgende Implikation gilt:

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

Wir wählen eine Partition $P_\epsilon = \{x_0, \dots, x_n\}$, so dass $\Delta x_i < \delta$. Dann gilt:

$$M_i - m_i < \epsilon \text{ und daher}$$

$$S(P_\epsilon, f) - s(P_\epsilon, f) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \leq \epsilon \cdot \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \epsilon \cdot (b - a)$$

Da $\epsilon > 0$ beliebig, folgt die Aussage mit Satz 3.3. ■

Satz 3.6. Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton, so ist $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$

Beweis. Da f monoton ist, gilt für alle $x \in [a, b]$: $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$.

Das heißt f ist beschränkt. Zu $n \in \mathbb{N}$ wählen wir eine Partition $P_n = \{x_0, \dots, x_k\}$ mit $\Delta x_i < \frac{1}{n}$. Dann gilt:

$$S(P_n, f) - s(P_n, f) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i$$




Abbildung 7: Monotone Funktion

Ohne Einschränkung sei f monoton wachsend (der andere Fall läuft analog).
Dann gilt:

$$M_i = f(x_i) \text{ und} \\ m_i = f(x_{i-1})$$

und daher:

$$\begin{aligned} S(P_n, f) - s(P_n, f) &= \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \cdot \Delta x_i \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) - f(x_{i-1}) = \frac{1}{n} (f(b) - f(a)) \end{aligned}$$

Sei $\epsilon > 0$ gegeben. Wähle n_ϵ so dass gilt:

$$\frac{1}{n_\epsilon} (f(b) - f(a)) < \epsilon$$

Dann gilt mit $P_\epsilon := P_{n_\epsilon}$ die Aussage nach Satz 3.3

■

Satz 3.7. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt mit endlich vielen Unstetigkeitsstellen
Dann gilt $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$.




Abbildung 8: Funktion mit endlich vielen Unstetigkeitsstellen

Beweis. Sei $\epsilon > 0$ gegeben und $E = \{P_1, \dots, P_n\}$ die Menge der Unstetigkeitsstellen von f . Wir nehmen der Einfachheit halber an, dass $\{a, b\} \cap E = \emptyset$ (der andere Fall läuft analog). Sei

$$M := \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

Wir wählen $u_j, v_j \in [a, b]$, $j = (1, \dots, n)$, so dass

$$P_s \in [u_j, v_j] \text{ und} \\ 2M(u_j - v_j) < \frac{\epsilon}{2n}$$

Sei

$$I_1^\epsilon = [a, u_1], \\ I_l^\epsilon = [v_{l-1}, u_l] \quad (l = 2, \dots, n) \\ I_n^\epsilon = [v_n, b]$$

Per Voraussetzung ist $f|_{I_j^\epsilon}$ ($j = 1, \dots, n+1$) stetig. Daher existiert nach Satz 3.5 eine Partition P_j^ϵ , so dass:

$$S(P_j^\epsilon, f|_{I_j^\epsilon}) - s(P_j^\epsilon, f|_{I_j^\epsilon}) < \frac{\epsilon}{2(n+1)}$$

Wir setzen $P^\epsilon = \cup_{l=1}^n P_l^\epsilon \cup U_{l=1}^n \{u_l, v_l\}$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} S(P^\epsilon, f) - s(P^\epsilon, f) &= \sum_{l=1}^{n+1} S(P_l^\epsilon, f|_{I_l^\epsilon}) - s(P_l^\epsilon, f|_{I_l^\epsilon}) \\ &\quad + \sum_{l=1}^n \left(\sup_{x \in [u_l, v_l]} f(x) - \inf_{x \in [u_l, v_l]} f(x)(v_l - u_l) \right) \\ &\leq \sum_{l=1}^{n+1} \frac{\epsilon}{2(n+1)} + \sum_{l=1}^n 2M \cdot (v_l - u_l) \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

■

Definition 3.4. Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Treppenfunktion (Abbildung 9), wenn es eine Partition $Z = \{y_0, \dots, y_m\}$ von $[a, b]$ gibt und für alle $i \in \{0, \dots, m\}$ für $c_i \in \mathbb{R}$ gibt, so dass

$$f(x) = c_i \quad (x \in (y_{i-1}, y_i))$$

Satz unvollständig / falsch

Nach Satz 3.7 ist jede Treppenfunktion Riemann-integrierbar.

Zur Berechnung des Intervalls bedienen wir uns der Notation von Satz 10 und verwenden Satz 3.4c.

Zur Vereinfachung nehmen wir wieder an, dass f in a und b stetig ist. Das heißt die Menge der Unstetigkeitsstellen ist gegeben durch $E = \{y_1, \dots, y_{m-1}\}$.

Für $x \in I_l^\epsilon$ gilt dann $f(x) = c_l$ für alle $l = 1, \dots, m$. Dann gilt nach Satz 3.4c:

falsche Referenz -> hardgecodet

$$\left| \int_a^b f \, dx - \sum_{i=1}^{m+1} c_i \cdot |I_i^\epsilon| + \sum_{i=1}^{m-1} f(y_i) \cdot (v_i - u_i) \right| < \epsilon$$




Abbildung 9: Treppenfunktion

Für $\lim_{\epsilon \rightarrow 0}$ gilt:
$$\begin{cases} |I_1^1| \rightarrow y_1 - a \\ |I_l^2| \rightarrow y_l - y_{l-1} & (l = 2, \dots, m) \\ |I_{m+1}^\epsilon| \rightarrow b - y_m \end{cases}$$

Das heißt

$$\sum_{i=1}^{m+1} c_i |I_\epsilon^l| \rightarrow c_i (y_i - a) \sum_{i=2}^m c_i \cdot (y_i - y_{i-1}) + c_m (b - y_m) \quad (8)$$

Außerdem gilt $v_i - u_j \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$ gilt $\int_a^b f \, dx = \text{Gleichung 8}$

Korollar 3.1. Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, beziehungsweise monoton, beziehungsweise besitzt f höchstens endlich viele Unstetigkeitsstellen und ist beschränkt, so ist $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$.

Bemerkung. Mit Hilfe des Lebesgueschen Integrabilitätskriterium kann man sogar zeigen, dass beschränkte Funktionen mit abzählbar vielen Unstetigkeitsstellen Riemann-integrierbar sind.

Beispiel 3.1.

$$\int_0^a x \, dx$$

Da $id : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig ist, existiert das Integral.

Sei $P_n = \{0, \frac{a}{n}, \frac{2a}{n}, \dots, \frac{(n-1)a}{n}, a\}$ eine Partition von $[a, b]$.

Es gilt:

$$\begin{aligned} S(P_n, x) &= \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{n} \cdot \frac{a}{n} \\ &= \frac{a^2}{n^2} \sum_{i=1}^n i \\ &= \frac{a^2}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{a^2}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s(P_n, x) &= \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{n} \cdot \frac{a}{n} \\ &= \frac{a^2}{n^2} \cdot \frac{(n-1)n}{2} \\ &= \frac{a^2}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

Da id integrierbar ist, gilt:

$$\int_0^a x \, dx \in [s(P_n, x), S(P_n, x)] = \left[\frac{a^2}{2} - \frac{1}{n}, \frac{a^2}{2} + \frac{1}{n} \right] \quad n \in \mathbb{N}$$

Das heißt:

$$\int_0^a x \, dx \cap_{n \in \mathbb{N}} \left[\frac{a^2}{2} - \frac{1}{n}, \frac{a^2}{2} + \frac{1}{n} \right]$$

Also: $\int_0^a x \, dx = \frac{a^2}{2}$

Beispiel 3.2. Sei $D : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ die *Dirichlet-Funktion*, d.h

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Daher gilt für jede Partition $P = \{x_0, \dots, x_n\}$, dass

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = 1 \text{ und} \\ m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = 0$$

Damit gilt:

$$S(P, f) - s(P, f) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \cdot \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 1$$

Ergo: D ist nicht Riemann-integrierbar

Satz 3.8. Sei $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ und $m \leq f(x) \leq M$ ($x \in [a,b]$). Sei ferner $\Phi : [m, M] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist $\Phi \circ f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$

Beweis. Sei $\epsilon > 0$ gegeben. Da Φ auf dem abgeschlossenen Intervall $[m, M]$ stetig ist, existiert ein $\delta > 0$ (Ohne Einschränkung sei $\delta < \epsilon$) mit :

$$|s - t| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(t)| < \epsilon$$

Da f integrierbar ist, gibt es eine Partition $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ mit

$$S(P, f) - s(P, f) < \delta^2$$

Wie üblich bezeichnen wir

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \text{ und} \\ m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \text{ und weiterhin} \\ M_i^+ = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \Phi \circ f \text{ sowie} \\ m_i^* = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \Phi \circ f(x)$$

Seien

$$A = \{i = 1, \dots, n \mid M_i - m_i < \delta\} \\ B = \{i = 1, \dots, n\} \setminus A$$

Aufgrund der Wahl von δ gilt für alle $i \in A$: $M_i^+ - m_i^* < \epsilon$ Weiter gilt:

$$\delta \cdot \sum_{i \in B} \Delta x_i = \sum_{i \in B} \delta \cdot \Delta x_i \leq \sum_{i \in B} (M_i - m_i) \Delta x_i \leq \delta^2$$

Ergo: $\sum_{i \in B} \Delta x_i \leq \delta$.

Damit gilt:

$$\begin{aligned}
S(P, \Phi \circ f) - s(P, \Phi \circ f) &= \sum_{i=1}^n (M_i^+ - m_i^*) \cdot \Delta x_i \\
&= \sum_{i \in A} (M_i^+ - m_i^*) \cdot \Delta x_i + \sum_{i \in B} (M_i^+ - m_i) \Delta x_i \\
&\leq \epsilon \sum_{i \in A} \Delta x_i + 2 \sup_{x \in [m, M]} |\Phi \circ f| \cdot \sum_{i \in B} \Delta x_i \\
&\leq \epsilon \left(|b - a| + 2 \sup_{x \in [m, M]} |\Phi \circ f(x)| \right)
\end{aligned}$$

Da $\epsilon > 0$ beliebig, folgt die Behauptung mit 3.3. ■

Satz 3.9. Seien $f_1, f_2, f \in \mathcal{R}_{[a, b]}$ Dann gilt:

1.

$$\int_a^b f_1 + f_2 \, dx = \int_a^b f_1 \, dx + \int_a^b f_2 \, dx$$

und für $c \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\int_a^b cf \, dx = c \int_a^b f \, dx$$

2. Insbesondere gilt also

$$\begin{aligned}
f_1 + f_2 &\in \mathcal{R}_{[a, b]} \text{ und} \\
cf &\in \mathcal{R}_{[a, b]}
\end{aligned}$$

3. Gilt $f_1(x) \leq f_2(x)$ ($x \in [a, b]$) so folgt

$$\int_a^b f_1 \, dx \leq \int_a^b f_2 \, dx$$

4. Ist $c \in (a, b)$, und $f \in \mathcal{R}_{[a, b]}$ so gilt

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx$$

5. Gilt $M \geq f(x)$ ($x \in [a, b]$) so gilt

$$M \cdot (b - a) \geq \int_a^b f \, dx$$

Beweis. 1. Da $f_i \in \mathcal{R}_{[a, b]}$ ($i = 1, 2$) gibt es Partitionen P_i von $[a, b]$ mit

$$S(P_i, f) - s(P_i, f) \leq \epsilon \text{ für ein festes } \epsilon > 0$$

Dann gilt für die gemeinsame Verfeinerung $P = P_1 \cup P_2 = \{x_0, \dots, x_n\}$ nach Satz 3.1, dass

$$S(P, f_i) - s(P, f_i) \leq \epsilon \quad (i = 1, 2)$$

2. Es gilt

$$\sup_{x \in [x_{i-1}-x_i]} f_1(x) + f_2(x) \leq \sup_{x \in [x_{i-1}-x_i]} f_1(x) + \sup_{x \in [x_{i-1}-x_i]} f_2(x)$$

Analog gilt:

$$\inf_{x \in [x_{i-1}-x_i]} f_1(x) + f_2(x) \geq \inf_{x \in [x_{i-1}-x_i]} f_1(x) + \inf_{x \in [x_{i-1}-x_i]} f_2(x)$$

Damit folgt:

$$s(P, f_1) + s(P, f_2) \leq s(P, f_1 + f_2) \leq S(P, f_1 + f_2) \leq S(P, f_1) + S(P, f_2)$$

Also gilt:

$$\begin{aligned} S(P, f_1 + f_2) - s(P, f_1 + f_2) &\leq S(P, f_1) - s(P, f_1) + S(P, f_2) - s(P, f_2) \\ &\leq 2\epsilon \end{aligned}$$

Da $\epsilon > 0$ beliebig gewählt war, gilt $f_1 + f_2 \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ nach Satz 3.3.

Weiter gilt:

$$\begin{aligned} s(P, f_1 + f_2), S(P, f_1 + f_2) &\in [s(P, f_1) - s(P, f_2), S(P, f_1) + S(P, f_2)] \\ &\subseteq \left[\int_a^b f_1 \, dx + \int_a^b f_2 \, dx + 2\epsilon \right] \end{aligned}$$

Da $\epsilon > 0$ beliebig gewählt wurde, gilt:

$$\int_a^b f_1 + f_2 \, dx = \int_a^b f_1 \, dx + \int_a^b f_2 \, dx$$

Die Aussage bezüglich $c \cdot f$ zeigt man analog.

3. Sei $f_2(x) \geq f_1(x)$ ($x \in [a, b]$). Dann gilt

$$\begin{aligned} f_2(x) - f_1(x) &\geq 0 \text{ und daher} \\ s(P, f_2 - f_1) &\geq 0 \end{aligned}$$

für jede Partition P von $[a, b]$ Wegen 1 ist $f_2 - f_1 \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ und es gilt:

$$\int_a^b f_2 \, dx = \int_a^b f_1 \, dx + \int_a^b f_2 - f_1 \, dx \geq \int_a^b f_1 \, dx$$

4. Für 3. betrachtet man zu beliebiger Partition P von $[a, b]$ die Partition $P' = \{c\} \cup P$

5. Folgt aus 2. mit $f_1 = f$ und $f_2 = M$ soweit

$$\int_a^b M \, dx = M \cdot (b - a)$$

■

Bemerkung.

- Eigenschaft 1 sagt, dass $\mathcal{R}_{[a,b]}$ ein bezüglich der Addition von Funktionen und Multiplikation mit Skalaren ein Vektorraum ist
- Eigenschaft 1 sagt weiterhin, dass die Abbildung

$$\int_a^b dx : \mathcal{R}_{[a,b]} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$f \mapsto \int_a^b f \, dx$$

ein lineares Funktional ist

- Eigenschaft 2 sagt, dass dieses Funktional positiv ist (also nicht-negative Funktionen einen nicht negativen Wert zuordnet)
- Eigenschaft 4 impliziert eine gewisse Stetigkeit

Satz 3.10. Für $f, g \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ gilt:

- $f \cdot g \in \mathcal{R}_{[a,b]}$
- $|f| \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ und $\int_a^b |f| \, dx \geq \left| \int_a^b f \, dx \right|$

Beweis. Sei $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto t^2$.

Dann ist Φ stetig und damit $\Phi \circ (f + g)$ bzw. $\Phi \circ (f - g)$ aufgrund von Satz 3.9 und Satz 3.8 Riemann-integrierbar über $[a, b]$. Beachte:

$$fg = \frac{1}{4}((f + g)^2 - (f - g)^2) \in \mathcal{R}_{[a,b]}$$

Nach Satz 3.8 gilt wieder $|f| \in \mathcal{R}_{[a,b]}$. Sei nun $c \in \{-1, 1\}$ so gewählt, dass

$$c \int_a^b f \, dx \geq 0$$

Offensichtlich gilt

$$|f(x)| = |cf(x)| \geq cf(x) \quad (x \in [a, b])$$

Damit gilt mit Satz 3.9

$$\left| \int_a^b f \, dx \right| = c \int_a^b f \, dx = \int_a^b cf \, dx \stackrel{\text{Satz 3.9}}{\leq} \int_a^b |f| \, dx$$

■

Satz 3.11 (Mittelwertsatz der Integralrechnung). Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $g(x) \geq 0$ ($x \in [a, b]$).

(Abbildung 10)

Dann existiert ein $\xi \in [a, b]$ mit

$$\int_a^b fg \, dx = f(\xi) \int_a^b g \, dx$$




Abbildung 10: Mittelwertsatz der Integralrechnung

Bemerkung: Für $g = 1$ gilt dann:

$$\int_a^b f \, dx = f(\xi) \cdot (b - a)$$

Beweis. Man setze: $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto f(y) \cdot \int_a^b g \, dx$. h ist stetig und es gilt:

$$\begin{aligned} \inf_{y \in [a, b]} h(y) &= \inf_{y \in [a, b]} \int_a^b f(y)g(x) \, dx \\ &\leq \int_a^b \int_{y \in [a, b]} f(y)g(x) \, dx \\ &\stackrel{\text{Satz 3.9}}{\leq} \int_a^b f(x)g(x) \, dx \stackrel{\text{Satz 3.9}}{\leq} \int_a^b \sup_{y \in [a, b]} f(y)g(x) \, dx = \sup_{y \in [a, b]} h(y) \end{aligned}$$

Das heißt wir haben eine stetige Funktion h mit:

$$\int_a^b fg \, dx \in \left[\inf_{y \in [a, b]} h(y), \sup_{y \in [a, b]} h(y) \right]$$

■

Bemerkung. Wir haben bereits gesehen: Polynome sind beliebig oft differenzierbar.

4 Differentiation und Integration

Bemerkung. Bisher hatten wir stets $\int_a^b f \, dx$ mit $a \leq b$ betrachtet. Für $a \geq b$ setze man

$$\int_a^b f \, dx := - \int_b^a f \, dx$$

Satz 4.1. Sei $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$. Für $a \leq x \leq b$ setze man

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

Dann gilt

1. F ist stetig auf $[a, b]$
2. Ist f stetig in $x_0 \in [a, b]$, so ist F in x_0 differenzierbar und es gilt: $F'(x_0) = f(x_0)$

Beweis.

1. Da $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$, ist f insbesondere beschränkt. Das heißt es existiert ein $M \in \mathbb{R}$ mit

$$|f(x)| \leq M \quad (x \in [a, b])$$

Sei nun $\epsilon > 0$ gegeben. Setze $\delta := \frac{\epsilon}{M}$. Für $x, y \in [a, b]$ mit $|x - y| < \delta$ erhalten wir:

$$\begin{aligned} |F(x) - F(y)| &= \left| \int_a^x f \, dt - \int_a^y f \, dt \right| \\ &= \left| \int_a^x f \, dt + \int_y^x f \, dt - \int_a^y f \, dt \right| \\ &= \left| \int_y^x f \, dt \right| \leq \int_y^x |f| \, dt \\ &\leq M \cdot \int_y^x 1 \, dt = M(x - y) \leq \epsilon \end{aligned}$$

Da $\epsilon > 0$ beliebig gewählt war, folgt die Aussage

Sei $h \in \mathbb{R}$, so dass $x_0 + h \in [a, b]$. Dann gibt es ein ξ_h zwischen x_0 und $x_0 + h$ mit:

$$\begin{aligned} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} &= \frac{\int_a^{x_0+h} f(t) \, dt - \int_a^{x_0} f(t) \, dt}{h} \\ &= \int_{x_0}^{x_0+h} \frac{f(t) \, dt}{h} \\ &= f(\xi_h) \cdot \frac{\int_{x_0}^h dt}{h} \\ &= f(\xi_h) \cdot \frac{h}{h} \quad \text{Damit gilt:} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} f(\xi_h) = f(x_0) \end{aligned}$$

■

Satz 4.2. Ist $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ und es gilt $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar mit $F' = f$. Dann gilt

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a)$$

Bemerkung.

- Eine Funktion F mit $F' = f$ nennt man eine Stammfunktion von f
- Man schreibt gerne $F(x)|_a^b := F(b) - F(a)$

Beweis. Sei $\epsilon > 0$ gegeben. Man wähle eine Partition $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ mit

$$S(P, f) - s(P, f) < \epsilon$$

Weiter existiert aufgrund des Mittelwertsatzes der Differential-Rechnung (Satz 2.3) $\xi \in [x_{i-1}, x_i]$ mit

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

Nach Satz 3.4 gilt

$$\begin{aligned} \epsilon &> \left| \int_a^b f \, dx - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| \\ &= \left| \int_a^b f \, dx - \sum_{i=1}^n F(x_i) - F(x_{i-1}) \right| \\ &= \left| \int_a^b f \, dx - (F(b) - F(a)) \right| \end{aligned}$$

Da $\epsilon > 0$ beliebig gewählt war, folgt die Behauptung. ■

Bemerkung.

- Sei $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$. Dann bezeichnet man die Funktion

$$\begin{aligned} \int_a^\circ f \, dx : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \int_a^t f \, dx \end{aligned}$$

als unbestimmtes Integral von f .

- Satz 4.2 sagt also das jede Stammfunktion ein unbestimmtes Integral von f ist

Proposition 4.1. Sei $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$. Eine Funktion $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ genau dann Stammfunktion von f , wenn $F - G = \text{konst.}$

Beweis. \Leftarrow

Sei $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt für $F + c$

$$(F + c)' = F' = f$$

\Rightarrow

Das war eine Folgerung des Mittelwertsatzes der Differentialrechnung (Satz 2.3). ■

ich bin mir hier nicht sicher ob das nicht $t \mapsto \int_a^x f \, dt$ sein müsste

Bemerkung. Oftmals wird ignoriert, dass sobald es eine Stammfunktion F von f gibt, es automatisch unendlich viele gibt. So schreibt man beispielsweise

$$\int f \, dx = F$$

oder spricht von „der“ Stammfunktion. Die obige Gleichung ist insofern problematisch, da die rechte Seite (und damit per Definition auch die linke Seite) nur bis auf eine Konstante bestimmt ist. Oftmals ist daher der etwas laxer Umgang mit den Begriffen unkritisch.

Satz 4.3 (Partielle Integration). Seien $F, G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar mit

$$F' = f \text{ und } G' = g$$

wobei $f, g \in \mathcal{R}_{[a,b]}$. Dann gilt:

$$\int_a^b F \cdot g \, dx = FG|_a^b - \int_a^b f \cdot G \, dx$$

Beweis.

$$\begin{aligned} \left(FG|_a^x - \int_a^x f \cdot G \, dt \right)' &= \left(F(x) \cdot G(x) - F(a) \cdot G(a) - \int_a^x f G \, dt \right)' \\ &= F'(x)G(x) + F(x)G'(x) - f(x)G(x) \\ &= f(x)G(x) + F(x)g(x) - f(x)G(x) \end{aligned}$$

Ergo: die rechte Seite ist eine Stammfunktion des Integranden der linken Seite. Damit folgt die Aussage aus Satz 4.2. ■

Beispiel 4.1.

$$\begin{aligned} \int_a^b \cos^2(x) \, dx &= \int_a^b \cos(x) \cdot \cos(x) \, dx \\ &= \cos(x) \cdot \sin(x)|_a^b + \int_a^b \sin^2 \, dx \\ &= \cos(x) \cdot \sin(x)|_a^b + \int_a^b 1 - \cos^2(x) \, dx \\ &= \cos(x) \cdot \sin(x)|_a^b + \int_a^b 1 \, dx - \int_a^b \cos^2(x) \, dx \Bigg| + \int_a^b \cos^2(x) \, dx \\ \Leftrightarrow 2 \int_a^b \cos^2(x) \, dx &= \cos(x) \cdot \sin(x)|_a^b + x|_a^b \cdot \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow \int_a^b \cos^2(x) \, dx &= \frac{1}{2} \cdot (\cos(x) \cdot \sin(x) + x)|_a^b \\ \text{Ergo: } \int_a^b \cos^2(x) \, dx &= \frac{1}{2} (\cos(x) \sin(x)|_a^b + (b-a)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_a^b \ln(x) \, dx & \text{ wobei } 0 \notin [a, b] \\
\int 1 \cdot \ln(x) \, dx &= x \cdot \ln(x) \Big|_a^b - \int_a^b x \cdot \frac{1}{x} \, dx \\
&= x \cdot \ln(x) \Big|_a^b - \int_a^b 1 \, dx \\
&= x \cdot \ln(x) \Big|_a^b - x \Big|_a^b \\
&= x \cdot \ln(x) \Big|_a^b - (b - a)
\end{aligned}$$

Satz 4.4. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ stetig differenzierbar. Dann gilt:

$$\int_a^b f(\phi(t)) \cdot \phi'(t) \, dt = \int_{\phi(c)}^{\phi(d)} f(x) \, dx$$

Beweis. Sei $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f . Dann gilt für $t \in [c, d]$:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} F(\phi(t)) &= F'(\phi(t)) \cdot \phi'(t) \\
&= f(\phi(t)) \cdot \phi'(t) \\
\text{Ergo: } \int_{\phi(c)}^{\phi(d)} &= \int F(\phi(d)) - F(\phi(c)) \\
&= \int_a^b f(\phi(t)) \phi'(t) \, dt
\end{aligned}$$

■

Bemerkung.

- Die Substitutionsregel lässt sich wie folgt nachrechnen

$$\phi'(t) dt = \frac{d\phi}{dt} dt$$

Dann lässt sich die Substitutions-Regel

$$\int_c^d f(\phi) \, d\phi = \int_{\phi(c)}^{\phi(d)} f(x) \, dx$$

Beispiel 4.2.

$$\int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx = r \int_{-r}^r \sqrt{1 - \frac{x^2}{r^2}} \, dx$$

Wir wählen $\phi(t) = r \cdot \sin(t)$ für $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Dann gilt mit der Substitutionsregel

(man beachte dass $\phi(\frac{-\pi}{2}) = -r$ und $\phi(\frac{\pi}{2}) = r$):

$$\begin{aligned} r \cdot \int_{-r}^r \sqrt{1 - \frac{x^2}{r^2}} dx &= r \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \frac{\phi^2(t)}{r^2}} \cdot \phi'(t) dt \\ &= r \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^2(t)} \cdot \cos(t) \cdot r dt \\ &= r^2 \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) dt \\ &= \frac{r^2}{2} \cdot \pi \end{aligned}$$

Beispiel 4.3.

$$\int_a^b \frac{dx}{1-x^2} \text{ wobei } -1, 1 \notin [a, b]$$

Vorgehen Partialbruchzerlegung: Man zerlegt den Nennen in seine Linearfaktoren und bestimmt Konstanten $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mit:

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{\alpha}{1+x} + \frac{\beta}{1-x}$$

Man beachte, dass $(1-x)(1+x) = 1-x^2$

Wir multiplizieren die Gleichung mit $(1+x)(1-x)$ und erhalten:

$$1 = \alpha(1-x) + \beta(1+x) = \alpha + \beta(\beta - \alpha)x \quad (x \in [a, b])$$

Also: $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ Damit gilt:

$$\int_a^b \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \left(\int_a^b \frac{dx}{1-x} + \int_a^b \frac{dx}{1+x} \right)$$

Nun gilt für $\phi(t) = 1-t$:

$$\int_a^b \frac{dx}{1-x} = \int_{1-a}^{1-b} \frac{-1 dt}{1\phi(t)} = - \int_{-a}^{1-b} \frac{dt}{t} = -\ln(t)|_a^b$$

Weiter gilt mit $\phi(t) = t-1$:

$$\int_a^b \frac{dx}{1+x} = \int_{1+a}^{1+b} \frac{dt}{t} = \ln(t)|_{1+a}^{1+b}$$

Ergo:

$$\frac{1}{2}(\ln(1+b) - \ln(1-b) - (\ln(1+a) - \ln(1-a))) = \frac{1}{2} \ln \left. \frac{1+x}{1-x} \right|_a^b$$

5 Erweiterungen des Integralbegriffs

5.1 Uneigentliche Integrale

Ziel: Die Erweiterung des Integralbegriffs auf Integranden, die möglicherweise nicht beschränkt sind, beziehungsweise auf Integrationsintervalle, die nicht beschränkt sind.

1. Eine Intervallgrenze ist unendlich.

Definition 5.1. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ auf jedem Intervall $[a, b] \subsetneq [a, \infty)$ Riemann-integrierbar.

Wir sagen f ist auf $[a, \infty)$ uneigentlich integrierbar beziehungsweise $\int_a^\infty f \, dx$ existiert, sofern der folgende Grenzwert existiert:

$$\int_a^\infty f \, dx := \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f \, dx$$

Analog definiert man $\int_{-\infty}^b f \, dx$ für $f : (-\infty, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

Beispiel 5.1.

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^s} = \frac{1}{s-1} \text{ für } s > 1$$

Denn: für $b > 1$ gilt:

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{dx}{x^s} &= \int_a^b x^{-s} \, dx = \left. \frac{x^{-s+1}}{-s+1} \right|_a^b \\ &= \frac{(b^{-s+1} - a^{-s+1})}{-s+1} \stackrel{a=1}{=} \frac{1}{s-1} (1 - b^{-s+1}) \xrightarrow{b \rightarrow \infty} \frac{1}{s-1} \end{aligned}$$

Hingegen ist $\frac{1}{x^s}$ nicht unendlich integrierbar über $[1, \infty)$, falls $s \leq 1$. Für $s = 1$ folgt das wie folgt:

$$\int_1^b \frac{dx}{x} = \ln(x) \Big|_1^b = \ln b \xrightarrow{b \rightarrow \infty} \infty$$

2. Der Integrand ist an einer Intervallgrenze kritisch (also beispielsweise unbeschränkt).

Definition 5.2. Sei $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ für jedes $\epsilon \in (0, b-a)$ über $[a+\epsilon, b]$ Riemann-integrierbar. Dann sagen wir, dass f über $(a, b]$ uneigentlich integrierbar ist beziehungsweise dass $\int_a^b f \, dx$ existiert, sofern folgender Grenzwert existiert:

$$\int_a^b f \, dx := \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{a+\epsilon}^b f \, dx$$

Analog bestimmt man $\int_a^b f \, dx$, falls a kritisch ist.

Beispiel 5.2.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^s} \text{ existiert für } s < 1$$

für $\epsilon > 0$ gilt:

$$\int_{\epsilon}^1 \frac{dx}{x^s} = \int_{\epsilon}^1 x^{-s} dx = \left. \frac{x^{-s+1}}{-s+1} \right|_{\epsilon}^1 = \frac{1}{1-s} (1 - \epsilon^{1-s}) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{1-s}$$

3. Beide Integrationsgerenzen sind kritisch

Definition 5.3. Sei $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $a \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ und $b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ für alle $\alpha \in (a, b)$ und $\beta \in (\alpha, b)$ Riemann-integrierbar über $[\alpha, \beta]$. Dann definiert man das uneigentliche Integral von f über $[a, b]$ und sagt $\int_a^b f dx$ existiert, sofern folgender Grenzwert existiert:

$$\int_a^b f dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{a+\epsilon}^c f dx + \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_c^{b-\delta} f dx \text{ wobei } c \in (a, b) \text{ sei}$$

Bemerkung.

- Die obige Definition ist unabhängig von der konkreten Wahl der Zwischenstelle c
- Ist $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ so stimmt das Riemann-Integral von f über $[a, b]$ mit dem uneigentlichen Integral überein.

Satz 5.1. Sei $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ eine monoton fallende positive Funktion. Dann gilt:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \text{ konvergiert} \Leftrightarrow \int_1^{\infty} f dx \text{ existiert}$$

Beweis. \Rightarrow Wir setzen $g(x) = f(\lfloor x \rfloor)$

Dann gilt:

- $g(x) \geq f(x)$ ($x \in [1, \infty)$)
- $g \in \mathcal{R}_{[1,b]}$ für alle $b > a$

$$\int_1^b f dx \leq \int_1^b g dx \leq \sum_{n=1}^{\lfloor b \rfloor} f(n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} f(n) < \infty$$

\Leftarrow Sei $h(x) = f(\lceil x \rceil)$ Dann gilt:

- $h \in \mathcal{R}_{[1,b]}$ für $b > a$
- $h(x) \leq f(x)$ ($x \in [1, \infty)$)

Damit gilt:

$$\sum_{n=1}^{\lfloor b \rfloor} f(n) = f(1) + \int_1^{\lfloor b \rfloor} h(x) dx \leq f(1) + \int_1^{\lfloor b \rfloor} f dx < \infty$$

■

Anwendung: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ konvergiert für jedes $s > 1$

Bemerkung (Gauß-Klammer).

- für $x \in \mathbb{R}$ bezeichnet $\lfloor x \rfloor$ die größte ganze Zahl kleiner gleich x und $\lceil x \rceil$ die kleinste ganze Zahl größer gleich x
- Die *Gamma-Funktion*

$$\begin{aligned}\Gamma : (0, \infty) &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \int_0^{\infty} t^{x-1} \exp(-t) \, dt \\ \Gamma(n) &= \int_0^1 (-\log x)^{n-1} \, dx\end{aligned}$$

Die Γ -Funktion ist wohldefiniert. Da

$$t^{x-1} \exp(-t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

existiert ein $t_0 \in (0, \infty)$ mit:

$$t^{x-1} \exp(-t) < \frac{1}{t^2} \quad (t \geq t_0)$$

Damit gilt:

- $\int_{t_0}^{\infty} t^{x-1} \exp(-t) \, dt \leq \int_{t_0}^{\infty} \frac{dt}{t^2} < \infty$
- $\int_0^{t_0} t^{x-1} \exp(-t) \, dt \leq \int_0^{t_0} t^{x-1} \, dt < \infty$ (siehe Beispiel 5.2)

Satz 5.2 (Funktionsgleichung der Γ -Funktion). Für $x > 0$ gilt:

$$\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x)$$

Bemerkung.

- $\Gamma(1) = 1$ (einfach nachrechnen)
- $\Gamma(2) = 2 \cdot \Gamma(1) = 2$

und so weiter. Wir sehen:

$$\Gamma(n+1) = n!$$

Beweis. Sei $\epsilon > 0, R > \epsilon$. Dann gilt:

$$\int_{\epsilon}^R t^{x-1} \exp(-t) \, dt = -t^{x-1} \cdot \exp(-t) \Big|_{\epsilon}^R + \int_{\epsilon}^R (x-1)t^{x-2} \exp(-t) \, dt$$

Für $x > 1$ gilt daher $\Gamma(x) = (x-1)\Gamma(x-1)$

■

Bemerkung
statt $x-1$
-> $x+1$?

5.2 Integrale über komplexwertige Funktionen

Definition 5.4. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. Dann heißt f auf $[a, b]$ Riemann-integrierbar, falls $\operatorname{Re}(f)$ und $\operatorname{Im}(f)$ (Realteil beziehungsweise Imaginärteil von f) Riemann-integrierbar sind über $[a, b]$. In diesem Falle definieren wir:

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^b \operatorname{Re}(f) \, dx + i \int_a^b \operatorname{Im}(f) \, dx$$

Satz 5.3. Seien $f, f_1, f_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ Riemann-integrierbar über $[a, b]$, dann gilt:

- a) Für $c \in \mathbb{C}$ ist $c \cdot f$ Riemann-integrierbar über $[a, b]$ sowie $f_1 + f_2$ und es gilt:

$$\begin{aligned} \int_a^b f_1 + f_2 \, dx &= \int_a^b f_1 \, dx + \int_a^b f_2 \, dx \\ \int_a^b c \cdot f \, dx &= c \cdot \int_a^b f \, dx \end{aligned}$$

- b) Ist $c \in (a, b)$, so ist f über $[a, c]$ und über $[c, b]$ integrierbar und es gilt:

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx$$

- c) $f_1 \cdot f_2$ ist integrierbar über $[a, b]$
d) \overline{f} ist integrierbar über $[a, b]$
e) $|f|$ ist integrierbar und es gilt:

$$\left| \int_a^b f \, dx \right| \leq \int_a^b |f| \, dx$$

Beweis. a)-d) folgen sofort aus den Eigenschaften des Integrals über reellwertige Funktion

Punkt f
fehlt oben
?

- e) $|f| = \sqrt{f \cdot \overline{f}}$ ist integrierbar, auf Grund von c), d) und Satz 3.9
f) Wähle $\varphi \in [0, 2\pi)$, so dass:

$$\exp(i\varphi) \cdot \int_a^b f \, dx \in \mathbb{R} \text{ Dann gilt:}$$

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f \, dx \right| &= \left| \exp(i\varphi) \cdot \int_a^b f \, dx \right| \\ &= \left| \int_a^b \exp(i\varphi) \cdot f \, dx \right| = \left| \int_a^b \operatorname{Re}(\exp(i\varphi)f) \, dx \right| \\ &\leq \int_a^b |\operatorname{Re}(\exp(i\varphi)f)| \, dx \leq \int_a^b |\exp(i\varphi)f| \, dx \\ &= \int_a^b |f| \, dx \end{aligned}$$

■

Bemerkung. $|\exp(i\varphi)| > 0$

6 Differentialgleichungen

Differentialgleichungen sind eine spezielle Form von Funktionalgleichungen. Funktionalgleichungen sind Gleichungen, in denen nach einer Funktion gesucht wird.

Beispiel 6.1 (Welche Funktion erfüllt $f^2 = f$?). Beispielsweise $f(x) = 0$ oder $f(x) = 1$.

Oftmals ist die Lösung einer Funktionalgleichung in dieser Allgemeinheit gar nicht von Interesse und man schränkt den Lösungsraum in einer naheliegenden Weise ein. Man könnte beispielsweise für obige Gleichung fordern, dass f stetig sein soll. Aber selbst dann sind wir von einer eindeutigen Lösung entfernt. (Man betrachte beispielsweise

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = 1; \\ f_0 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, f_0(x) = 0; \\ f_2 : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}, f_2(x) = 0; \\ &\vdots \end{aligned}$$

).

Uns sind bereits Funktionalgleichungen begegnet. Beispielsweise

$$\Phi(x + y) = \Phi(x) \cdot \Phi(y)$$

$$\text{Mögliche Lösung: } \Phi(x) = a^x \text{ für } a > 0$$

Eine spezielle Form von Funktionalgleichungen die insbesondere in den Natur-, Ingenieurs-, oder Wirtschaftswissenschaften eine zentrale Rolle spielt, sind sogenannte *Differentialgleichungen (DGLs)*, das heißt Funktionalgleichungen, die neben der Funktion selbst auch deren Ableitung beinhalten.

Beispiel 6.2. Sämtliche physikalische Grundgesetze beinhalten Differentialgleichungen.

Das 2. Newton'sche Gesetz: Das besagt, dass wenn ein Teilchen zur Zeit $t_0 \in \mathbb{R}$ an einem Ort x_0 mit einer Geschwindigkeit v_0 ist, dass das Teilchen zur Zeit $t \in \mathbb{R}$ an der Stelle $x(t)$ ist, wobei die Funktion $t \mapsto x(t)$ folgende Differentialgleichung erfüllt:

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} = \frac{F(x(t))}{m}$$

Hierbei ist $F(\cdot)$ die im jeweiligen Ort wirkende Kraft und $x(t_0) = x_0, \frac{dx}{dt}(x_0) = v_0$.

Konkretes Beispiel: Ein Massepunkt zwischen zwei Federn

Physik: $F(x) = -k \cdot x$ (k Federkonstante)

Das heißt wir haben die folgende Differentialgleichung zu lösen:

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} = \frac{-k}{m} \cdot x$$

Mögliche Lösung:

$$x(t) = \alpha \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + \beta \cos\left(\frac{k}{m}t\right)$$

Überprüfung:

$$\begin{aligned}\frac{d^2x(t)}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\alpha \cdot \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t \right) - \beta \cdot \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t \right) \right) \\ &= -\alpha \cdot \frac{k}{m} \cdot \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t \right) - \beta \cdot \frac{k}{m} \cdot \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t \right) \\ &= -\frac{k}{m} \cdot x(t)\end{aligned}$$

Wobei $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Durch Festlegen der Anfangsposition und Geschwindigkeit, können wir α, β festlegen und erhalten eine eindeutig bestimmte (ohne Beweis) Lösung des Anfangswertproblems (das heißt Lösung der Differentialgleichung und Erfüllen der Anfangsbedingung).

Der Satz
kling doof
formuliert

Bemerkung.

- *Offensichtlich besitzt die Differentialgleichung alleine noch keine eindeutige Lösung. Für die Eindeutigkeit benötigen wir zusätzliche Informationen, zum Beispiel in Form von Anfangsbedingungen.*
- *Auch wenn man nicht jede Differentialgleichung analytisch lösen kann, kann man Lösungen raten und durch Einsetzen verifizieren.*

Beispiel 6.3. Die logistische Differentialgleichung (Anwendung in der Ökologie [Populationsentwicklung] beziehungsweise in der Ökonometrie [Wachstum eines Marktes])

Sei $N(t)$ die Populationsgröße einer Bakterienkultur zum Zeitpunkt $t \in \mathbb{R}$. Wir erwarten, dass die Änderungsrate $\frac{dN(t)}{dt}$ einerseits proportional zur aktuellen Populationsgröße $N(t)$ ist, andererseits aber natürlichen Grenzen (*Carrying capacity*) unterliegt.

$$\frac{dN(t)}{dt} = A \cdot N(t) \cdot (B - N(t)) \text{ wobei } A, B > 0$$

Allgemeine Lösung:

$$N(t) = \frac{1}{\alpha \cdot \exp(-ABt) + 1} \quad (t \geq 0)$$

wobei $\alpha > -1$.

Definition 6.1. Sei $G \subseteq \mathbb{R}^2$ und $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann nennen wir

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(t, x(t)) \tag{9}$$

eine (explizite gewöhnliche) Differentialgleichung 1. Ordnung. Wir sagen:
 $y : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ist eine Lösung von Gleichung 9, wenn y differenzierbar ist und es gilt:

- i) $\{(t, y(t)) | t \in (a, b)\} \subseteq G$
- ii) $\frac{dy(t)}{dt} = f(t, y(t)) \quad (t \in (a, b))$

Bemerkung.

- Punkt 1 ist nötig, um Punkt 2 überhaupt formulieren zu können.
- Gleichung 9 heißt Differentialgleichung erster Ordnung, da nur die erste Ableitung der gesuchten Funktion vorkommt. Allgemein kann man auch n -te Ableitungen zulassen und entsprechende Differentialgleichungen n -ter Ordnung betrachten (siehe Newton), was wir aber mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln nicht schematisch machen können.
- Im konkreten Fall der logistischen Differentialgleichung können wir setzen:

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ (t, x) &\mapsto A \cdot x \cdot (B - x) \end{aligned}$$

Wir sehen: f ist unabhängig von t . Eine solche Differentialgleichung nennen wir autonom.

6.1 Trennung der Variablen

Die Trennung der Variablen ist ein Verfahren, welches für Differentialgleichungen der folgenden Form geeignet ist:

Seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ offene Intervalle und $f : I \rightarrow \mathbb{R}, g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $g(x) \neq 0$ ($x \in J$). Dann heißt

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(t) \cdot g(x(t)) \quad (10)$$

eine Differentialgleichung mit *getrennten Variablen*

das konnte keiner lesen

Satz 6.1. Seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ und f, g wie oben. Sei $(t_0, x_0) \in I \times J$. Wir definieren:

$$F(t) := \int_{t_0}^t f(s) ds, G(x) := \int_{x_0}^x \frac{ds}{g(s)}$$

Sei $I' \subseteq I$ ein Intervall mit $t_0 \in I'$ und $F(I') \subseteq G(J)$. Dann gibt es genau eine Funktion $y : I' \rightarrow \mathbb{R}$, die Gleichung 10 löst und $y(t_0) = x_0$ erfüllt und y genügt der Gleichung:

$$G(y(t)) = F(t)$$

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass jede Funktion $y : I' \rightarrow \mathbb{R}$ die Gleichung 10 erfüllt, auch die Gleichung $G(y(t)) = F(t)$ erfüllt.

$$\begin{aligned} G(y, t) &= \int_{y(t_0)=x_0}^{y(t)} \frac{ds}{g(s)} \\ &\stackrel{\text{Sub.-regel}}{=} \int_{t_0}^t \frac{y'(r)}{g(y(r))} dr = \int_{t_0}^t \frac{f(r)g(y(r))}{g(y, r)} dr \\ &= \int_{t_0}^t f(r) dr = F(t) \end{aligned}$$

Nun zur Eindeutigkeit:

Da $g \neq 0$, ist G streng monoton wachsend (falls $g > 0$) oder streng monoton

fallend, falls $g < 0$. Da G differenzierbar ist (Satz vor dem Hauptsatz der Differentialrechnung) und invertierbar (wegen der Monotonie) existiert also eine differenzierbare Umkehrfunktion G^{-1} . Damit haben wir, dass für jede Lösung $y : I' \rightarrow \mathbb{R}$ von Gleichung 10 mit $y(t_0) = x_0$ gilt:

Referenzierung
Satz 1 § 3

$$y(t) = G^{-1}(F(t)) \quad (t \in I')$$

Bleibt die Existenz nachzuweisen:

Wir setzen einfach $G^{-1}(F(\cdot))$ in Gleichung 10 ein. Dann erhalten wir:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} G^{-1}F(t) &= \left(\frac{d}{dt} G^{-1} \right) (F(t)) \cdot \frac{d}{dt} F(t) \\ &= \left(\frac{d}{dt} G^{-1} \right) \cdot (F(t)) \cdot f(t) \\ &= \frac{1}{\left(\frac{d}{dt} (G^{-1}(F(*))) \right)} \cdot f(t) \\ &= g(G^{-1}(F(t))) f(t) \end{aligned}$$

■

Bemerkung. Satz 6.1 lässt sich wie folgt merken:

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} &= f(t) \cdot g(x(t)) \\ \Leftrightarrow \frac{1}{g(x(t))} \frac{dx(t)}{dt} &= f(t) \quad | \cdot „dt“ \\ \frac{dx}{g(x)} &= f(t) dt \end{aligned}$$

und integriere anschließend von $x_0 \rightarrow x$ beziehungsweise $t_0 \rightarrow t$