



QFT 中用西海岸度规 $(1, -1)$

Feynman Rule of Scalar Field

费曼规则解决 $S_{fi} = \langle f|S|i\rangle \sim \langle \Omega|T\{\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)\}|\Omega\rangle$ 后面式子的计算, $|\Omega\rangle$ 是相互作用理论的基本态/真空, $|0\rangle$ 是自由理论的基本态。

$$D_F(x, y) \equiv \langle 0|T\{\phi_0(x)\phi_0(y)\}\rangle = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{i}{k^2 - m^2 + i\epsilon} e^{ik(x-y)} \quad (2)$$

Schwartz 书中 **Schwinger-Dyson equations**:

$$(\square_x + m^2) \langle \phi_x \phi_1 \cdots \phi_n \rangle = \langle \mathcal{L}'_{\text{int}}[\phi_x] \phi_1 \cdots \phi_n \rangle - i\hbar \sum_j \delta^4(x - x_j) \langle \text{没有} \phi_j \rangle \quad (3)$$

这里 $\langle \cdots \rangle = \langle \Omega|T\{\cdots\}|\Omega\rangle$, 以及相应的 $m = 0$ (为了描述简便, $m \neq 0$ 是简单的推广) 下的 $\square_x D_{x1} = -i\delta_{x1}$, $\langle \phi_1 \phi_2 \rangle = \int d^4x D_{x1} \square_x \langle \phi_x \phi_2 \rangle$.

Wick 定理, 时序算符和收缩的来源:

$$\langle \Omega|T\{\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)\}|\Omega\rangle = \frac{\langle 0|T\{\phi_0(x_1) \cdots \phi_0(x_n)\}e^{i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{int}}[\phi_0]}\}|0\rangle}{\langle 0|T\{e^{i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{int}}[\phi_0]}\}|0\rangle} \quad (4)$$

Wick's Theorem: 真空场正负展开 $\phi_0(x) = \phi_+(x) + \phi_-(x)$ 其中 $\phi_{\pm} = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\sqrt{2\omega_p}} a_p^{\pm} e^{\pm ipx}$

最后 $\langle 0|T\{\cdots\}|0\rangle$ 值只会在所有都收缩下存在。收缩: ϕ_+ 和 ϕ_- 配对。

对称因子的计算: 1. 如果一个传播子首尾连接于一个顶点, 那么贡献对称因子 2; 2. 如果两个点之间连接 n 个全同传播子, 那么贡献对称因子 $n!$; 3. 如果费曼图中有一个 n 阶旋转对称轴, 即存在一个 n 阶置换对称不变性, 贡献 $n!$

相互作用顶点: 接上的线的数量取决于相互作用项, 如 ϕ^4 理论就能接入 4 条线, 又如 $\frac{-g}{1 \times 2!} \Phi \phi^2$ 理论接线数是 1 条 Φ 线和 2 条 ϕ 线。

位置空间的费曼规则: 以 $\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{\lambda}{4!} \phi^4$ 理论为例——

- 内部传播子:

- 顶点:

- 外线:

- 除以对称因子

动量空间 ϕ^4 费曼规则:

- 传播子:

- 对于每个相互作用顶点:

- 外点:

- 对每个相互作用顶点应用动量守恒 $\delta(p + k \cdots)$

- 对所有内动量积分 $\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}$

- 除以对称因子