

Line integrals


On veut intégrer f(x,y)=z (en bleu) selon le cercle, que l'on paramétrise comme $\vec{r}(t)=g(t)\vec{i}+h(t)\vec{j}$.



On peut d'abord réécrire notre fonction comme f(t)=f(g(t),h(t)). Pour quoi ? Parce que les seuls points qui nous intéressent sont ceux selon g(h),h(t)!



Notre fonction aurait pu être comme ça, mais on veut juste être sur les points du cercle.



Ici on veut l'aire donc

$$\begin{split} A_k &= f(x_k, y_k) \Delta s_k \\ A_k &= f(x_k, y_k) \sqrt{\left(\Delta x_k\right)^2 + \left(\Delta y_k\right)^2} \\ \Rightarrow dA &= f(g(t), h(t)) \sqrt{g'(t)^2 + h'(t)^2} dt \end{split}$$

Theorem (Gauss/Green)

Let
$$\Sigma \in \mathbb{R}^2$$
 be as in the main anilimy theorem

Let $\vec{F} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ be a diff'able vector field. Then

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{div} \vec{F}(x_1, x_2) \, dx_1 dx_2 = \iint_{\delta \Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dl \qquad Gauss theorem$$

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{curl} \vec{F}(x_1, x_2) \, dx_1 dx_2 = \iint_{\delta \Sigma} \vec{F} \cdot \vec{\tau} \, dl \qquad Green theorem$$

Outlook

[2D]
$$\iint div \vec{F} = \oint \vec{F} \cdot \vec{n}$$
 $\iint coved \vec{F} = \oint \vec{F} \vec{f}$ area integral line integral

Similar in higher dimensions:


hypervolume us. hypersurface

so much more difficult

Trouver un potentiel • compute $\int_0^x F(t)dt$ • compute $\int_x^y F(t)dt$ • sum them

Calculer une intégrale avec le Green's theorem

• bien choisir un sens pour la bordure (par ex)



•
$$\int_{\delta\Omega} F \cdot d\vec{s} = \int \int_{\omega} \mathrm{div}(F) d\omega$$