



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Tarea 2

Análisis de algoritmos

Rivera Morales David
320176876

Gallegos Cortes José Antonio
320316566

February 27, 2025

Solución de los 8 pares de funciones

1. Par 1:

$$f(n) = \log(n), \quad g(n) = \log(n^2 + 1).$$

Análisis:

Vamos a resolver el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ y dependiendo del resultado podremos determinar que complejidad tiene, si tenemos que el límite es igual a 0 entonces $f(n) \in o(g(n))$, si es mayor a cero pero menor a infinito tendremos que $f(n) \in \theta(g(n))$ y por último si tenemos que es infinito entonces $f(n) \in \omega(g(n))$ por lo que tenemos lo siguiente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{\log(n^2+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{2n}{n^2+1}} \text{ por L'hôpital.}$$

Y seguimos desarrollando la expresión:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{2n}{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{2n^2} \text{ podemos sacar la constante } \frac{1}{2}, \text{ tenemos entonces: } \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n^2}$$

Ahora podemos separar la división:

$$\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2} + \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n^2}}{\cancel{n^2}} + \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{n^2}$$

Finalmente podemos separar en dos límites:

$$\frac{1}{2} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \right)$$

El límite de una constante es la constante, mientras que para el límite de $\frac{1}{n^2}$ si aplicamos la propiedad $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{c}{n^a}\right) = 0$ por lo que al final tenemos:

$$\frac{1}{2}(1 + 0) = \frac{1}{2}$$

Como es mayor que cero y menor que infinito sabemos que $f(n) \in \theta(g(n))$

2. Par 2:

$$f(n) = \frac{n^2}{\log(n)}, \quad g(n) = n(\log(n))^2.$$

Análisis:

$$\text{Por } \frac{\frac{b}{c}}{a} = \frac{b}{c \cdot a}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2}{\log(n)}}{n(\log(n))^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\log(n)(n \log(n))^2} \text{ por } (ab)^c = a^c b^c \text{ tenemos que } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 \log^2(n) \log(n)}$$

Ahora sumamos los exponentes y dividimos las x^2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n^2}}{\cancel{n^2} \log^3(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log^3(n)} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \log^3(n)} = \frac{1}{\infty^3} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Por ello:

$$f(n) \in o(g(n))$$

3. Par 3:

$$f(n) = (n^3)2^n, \quad g(n) = n3^n.$$

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{(n^3)2^n}{n3^n}.$$

Análisis:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^3)2^n}{n3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2)2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2) \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2) \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Reescribimos con la propiedad $a * b = \frac{a}{\frac{1}{b}}$ para usar L'hôpital, la raíz de n^2 es $2n$ mientras que la de $\left(\frac{2}{3}\right)^n$ la obtendremos ahora

$$\left(\frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^n}\right)' = \left(\left(\frac{3}{2}\right)^n\right)' = \left(\frac{3}{2}\right)^n \log\left(\frac{3}{2}\right)$$

Por lo que debemos obtener el límite de $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\left(\frac{3}{2}\right)^n \log\left(\frac{3}{2}\right)}$, aplicamos L'hôpital y sacamos las derivadas

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)}{\left(\frac{3}{2}\right)^n \log\left(\frac{3}{2}\right)} = \frac{2}{\log\left(\frac{3}{2}\right) \frac{d}{dx} \left(\frac{3}{2}\right)^n} = \frac{2}{\log\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{3}{2}\right)^n \log\left(\frac{3}{2}\right)} = \frac{2}{\log^2\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{3}{2}\right)^n}$$

Ahora simplificamos con la misma propiedad $a * b = \frac{a}{\frac{1}{b}}$ y usamos la propiedad $\frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{a * c}{b}$ para luego poder sacar casi toda la expresión como una constante.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\log^2\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{3}{2}\right)^n} = \frac{2}{\frac{\log^2\left(\frac{3}{2}\right) (3^n)}{2^n}} = \frac{2 * 2^n}{\log^2\left(\frac{3}{2}\right) 3^n} = \frac{2}{\log^2\left(\frac{3}{2}\right)} * \frac{2^n}{3^n}$$

Sacamos como una constante y aplicamos la regla $\frac{a^c}{b^c} = \frac{a}{b}$

$$\frac{2}{\log^2\left(\frac{3}{2}\right)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^n}{3^n}\right) = \frac{2}{\log^2\left(\frac{3}{2}\right)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{2}{\log^2\left(\frac{3}{2}\right)} * 0 = 0$$

Como es cero tenemos que $f(n) \in o(g(n))$

4. Par 4:

$$f(n) = n \log(n^2), \quad g(n) = n \log(n).$$

$$f(n) = n \cdot 2 \log(n) = 2n \log(n).$$

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{2n \log(n)}{n \log(n)} = 2.$$

Análisis:

$$f(n) \in \Theta(g(n)).$$

5. Par 5:

$$f(n) = \log(\log(n)), \quad g(n) = \sqrt{\log(n)}.$$

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{\log(\log(n))}{(\log(n))^{1/2}}.$$

Análisis:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(\log(n))}{(\log(n))^{1/2}} = 0.$$

$$f(n) \in o(g(n)).$$

6. Par 6:

$$f(n) = n^{\log(n)}, \quad g(n) = n \log(n) - n.$$

$$g(n) = n(\log(n) - 1).$$

$$n^{\log(n)} = \exp(\log(n) \cdot \log(n)) = \exp((\log(n))^2).$$

$$\frac{f(n)}{g(n)} \approx \frac{\exp((\log(n))^2)}{n \log(n)}.$$

$$\log\left(\frac{f(n)}{g(n)}\right) \approx (\log(n))^2 - \log(n \log(n)).$$

Análisis:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty.$$

Por lo tanto,

$$f(n) \in \omega(g(n)).$$

7. Par 7:

$$f(n) = \log(n^{n \log n}), \quad g(n) = \sqrt{n \log(n)}.$$

$$\log(n^{n \log n}) = n \log n \cdot \log n = n (\log n)^2.$$

$$g(n) = \sqrt{n \log(n)} = (n \log(n))^{1/2} = n^{1/2} (\log(n))^{1/2}.$$

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{n (\log(n))^2}{n^{1/2} (\log(n))^{1/2}} = n^{1/2} (\log(n))^{3/2}.$$

Análisis:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/2} (\log(n))^{3/2} = \infty.$$

Así,

$$f(n) \in \omega(g(n)).$$

8. Par 8:

$$f(n) = 2^{n^2+1}, \quad g(n) = 4^n.$$

Análisis:

$$4^n = (2^2)^n = 2^{2n}.$$

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{2^{n^2+1}}{2^{2n}} = 2^{n^2+1-2n}.$$

$$n^2 + 1 - 2n = n^2 - 2n + 1$$

Por lo que ahora simplemente calculamos el limite de lo anterior con la propiedad de los limites que nos dice que dado un polinomio $P(x) = (a_n x^n + \cdots + bx + c)$, el límite $\lim_{x \rightarrow \infty} (a_n x^n + \cdots + bx + c) = \infty, a > 0$ como en nuestro caso tenemos $a = 1$ y $n = 2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 - 2n + 1 = \infty$$

Como tenemos que es infinito entonces sabemos que:

$$f(n) \in \omega(g(n)).$$