

2.3

September 23, 2025

In Exercises 1–4, verify that $\det(kA) = k^n \det(A)$.

1

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}; k = 2$$

In Exercises 7–14, use determinants to decide whether the given matrix is invertible.

7

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 5 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

9

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

11

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 8 \\ -2 & 1 & -4 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

In Exercises 15–18, find the values of k for which the matrix A is invertible.

15

$$A = \begin{bmatrix} k-3 & -2 \\ -2 & k-2 \end{bmatrix}$$

In Exercises 24–29, solve by Cramer's rule, where it applies.

25

$$4x + 5y = 2$$

$$11x + y + 2z = 3$$

$$x + 5y + 2z = 3$$

$$x + 5y + 2z = 1$$

33

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

Assuming that $\det(A) = -7$, find

(a) $\det(3A)$

(b) $\det(A^{-1})$

(c) $\det(2A^{-1})$

(d) $\det((2A)^{-1})$

(e) $\det \begin{bmatrix} a & g & d \\ b & h & e \\ c & i & f \end{bmatrix}$

In each part, find the determinant given that A is a 4×4 matrix for which $\det(A) = -2$.

34 b)

$$\det(A - I)$$

c)

$$\det(2AT)$$

Prove that if A is a square matrix, then $\det(A^T A) = \det(AA^T)$.

