

		分值	参考范围
身体压力指数	-3 -2 -1 1 1.5 2 3	-0.88	<1
心理压力指数	-3 -2 -1 1 1.5 2 3	-0.30	<1
抗压能力	50 70 90 110 130 150	102.3	>90
自主神经平衡	-10 -5 -3 3 5 10	1.6	-3~3
自主活性	0 30 45 80 90 105 120	80	45~80
平均心率	20 60 100 140 180 220	75	60~100
心脏稳定性分析	50 70 90 110 130 150	110.1	>90
身体质量指数	15 18.75 22.5 25 30 35 40 45	20.81	18.5~24.9







时域参数	结果	单位	参考范围	频域参数	结果	单位	参考范围
SDNN	60.16	ms	>40	VLF	822.90	ms^2	
PNN50	28	%	>10	LF	973.58	ms^2	
RMSSD	47.97	ms		HF	837.30	ms^2	
AMo	57	numbers		总功率	2921.55	ms^2	>900

*本检查结果仅反映受检查者当时情况，此报告仅供临床医生参考。

通道: ECG+PPG1






APG类型： A

a-b=90ms	b/a=-0.80
a-c=166ms	c/a=0.02
a-d=224ms	d/a=-0.27
a-e=300ms	e/a=0.10

外周血管系统

射血弹性指数EEI：0.50



EEI是一个反映左心室射血能力和大动脉弹性或顺应性的指标。

重博扩张指数DDI：0.54



DDI是一个反映小动脉弹性的指标。

重博弹性指数DEI：0.30



DEI是一个反映小动脉弹性或顺应性和静脉血流的指标。

增强指数AI：-0.04




AI是一个反映动脉硬度的指标。

反射指数RI：0.88



RI是一个反映小动脉的血管张力的指标。

硬度指数SI：9.83



SI是一个反映大动脉硬度随年龄变化的指标。

平均心率	75 bpm	全身血管阻力(SVR)	1401.38 dyn*s/cm⁵(700~1800)
C1-动脉血管容积的依从性	9.92 ml/mmHg	血容量(BV)	3.16 l(3~5)
C2-振动或反射性动脉顺应性	9.09 ml/mmHg	心输出量(Q)	4.87 l/min(4.0~8.0)
舒张压时间指数/收缩压时间指数	0.91	脉压(PP)	31.95 mmHg(25~100)

报告总结

您的身体压力处于平均水平，需要保持适度的锻炼和足够的休息。您的心理压力处于平均水平，需要保持适度的锻炼和放松。目前您的抗压能力处于正常人的平均水平。

您的自主神经系统处于自主神经平衡的状态,自主神经功能平衡表示您的自主神经系统调节功能正常。

您的心脏稳定性优于正常人的平均水平。

*本检查结果仅反映受检查者当时情况，此报告仅供临床医生参考。

现病史：患者现大三，自2024年10月份大二与室友发生矛盾后不想会宿舍、心情不好、厌学、学业压力大，什么都不想做，不想与人接触，同年年底在校医院就诊，考虑抑郁，予以舍曲林50mg/日4个月，服药后改善不明显，恐惧考试，理科类课让自己压力大、考前不想复习、旷考，偶有稍显兴奋话多、持续1-2天，1个月前在哈尔滨第一专科医院就诊，诊断不详，予以安非他酮150mg/日、富马酸喹硫平片100mg/日，服药后疲倦，思睡，6天前办理休学，食欲下降，近2-3个月胃部不适，不想吃东西，入睡困难，上床1-2个小时才能睡，1-2个小时醒一次。近1个月体重下降约7.5kg.

既往史：既往体健。

过敏史：无过敏史。

疫情或传染病史：无传染病史，无疫源地旅居史。无传染病密切接触史。

体格检查：心肺未见明显异常。

精神状况检查：母亲、姐姐 陪诊 入室，意识 清晰 ，定向 可 ， 否认 幻觉，思维 正常 ， 否认 妄想，注意力 集中 ，智能 正常 ,记忆 可 ，情绪 抑郁 ，意志活动 减退 ,行为 正常 ，自知力 存在 。

辅助检查：详见报告单

初步诊断： 1：抑郁状态

处理意见：继续当前药物治疗，安非他酮300mg/日、富马酸喹硫平25mg/晚，药物服完之前来复查。

入院时间：2026年04月03日 10:31 出院时间：2026年04月23日 11:00 住院天数：20

是否送病理检查：否

出院诊断：1.抑郁障碍、2.睡眠障碍、3.甲状腺双侧叶结节：结节性甲状腺肿？、4.肝脏钙化灶、5.副鼻窦炎、6.右侧中耳乳突炎；

诊疗小结：患者[redacted]，女，19岁，因“情绪低落1+年”入院。入院后完善检验示：血细胞分析(五分类)：BC分布宽度CV 11.3%， 淋巴细胞绝对值 3.42×10⁹/L，血清泌乳素测定(PRL)：催乳素 37.60ng/ml，生化：天门冬氨酸氨基转移酶 9U/L，总蛋白 62.2g/L，球蛋白 19.5g/L，尿常规：隐血 250(3+)Cell/μL，红细胞 101/μL，细菌 976/μL，输全，甲功，血浆皮质醇测定(CORT)(8:00)，促肾上腺皮质激素(ACTH)，凝血功能等检验结果未见明显异常。2026-04-06 脑电图检查：未见异常；甲状腺彩超专科检查(甲状腺、甲状腺动脉、颈部淋巴结) 甲状腺双侧叶结节：结节性甲状腺肿？女性泌尿系彩超(肾脏、输尿管、膀胱) 肝脏钙化灶。 腹部普通彩超(肝脏、胆道系统、胰腺、脾脏) 肝脏钙化灶。 CT胸部普通扫描 心肺未见异常。 普通超声心动图 心脏结构及血流未见明显异常左室收缩功能测值正常； MRI头部轴位冠矢状位普通扫描 1.头颅MRI平扫未见异常。2.副鼻窦炎，鼻中隔偏曲。3.右侧中耳乳突炎。妇科彩超(经腹) 子宫、附件、膀胱、盆腔未见明显异常。乳腺彩超专科检查（乳腺、胸壁、腋窝、锁骨上下区） 双乳未见确切占位。（BI-RADS 1类）双侧胸壁未见确切占位。双侧腋窝、锁骨上下区未见明显异常。住院期间复查：2026-04-07 卡马西平用药相关基因分析(HLA-B*1502)：LA-B15:02基因检测 阳性，2026-04-10 血细胞分析(五分类)：BC分布宽度SD 35.7fL， BC分布宽度CV 10.9%， 嗜碱性粒细胞百分率 1.3%， 嗜碱性粒细胞绝对值 0.08×10⁹/L，生化：天门冬氨酸氨基转移酶 11U/L。治疗上予以艾司西酞普兰改善情绪，喹硫平助眠，辅以心理咨询治疗。

出院医嘱：

一般注意事项：建议出院后定期于心理卫生中心门诊随访；监护人监督患者规律服药，切忌自行减药或停药；避免驾车、高空操作等高危操作。监护人加强监护，防止患者出现意外。防跌倒损伤、走失，自伤自杀，防冲动攻击、出走。

饮食注意事项：规律、均衡饮食，避免摄入高盐、高糖、高脂肪，适量运动、注重睡眠卫生、避免不良精神刺激；忌烟、禁酒及禁止使用冰毒、K粉等精神活性物质。

出院带药：草酸艾司西酞普兰片(10mg×28片)，20mg，口服，每天晚上一次；

随访计划：1.半月后可带出院证明书至心理卫生中心门诊复诊，李进副教授门诊时间：每周二上午，周三下午。

2.出院后定期复查血常规、肝肾功、电解质、凝血常规、血糖、血脂、甲功、心电图、脑电图、腹部及泌尿系彩超、妇科彩超、甲状腺彩超、胸部CT、头部MRI等检查。

3.针对患者甲状腺双侧叶结节：结节性甲状腺肿？，建议患者定期复查甲功、甲状腺彩超，于内分泌科门诊随诊；

4.针对患者MRI头部轴位冠矢状位普通扫描 1.头颅MRI平扫未见异常。2.副鼻窦炎，鼻中隔偏曲。3.右侧中耳乳突炎。建议出院后耳鼻喉科门诊随访；

5.鉴于疾病治疗的复杂性，若出现躯体症状和体征，请及时到相关专科就诊；若精神

英文名	项目名称	结果		参考区间	单位	检测方法
WBC	*白细胞数	6.06		3.50 ～ 9.50	10^9/L	流式细胞技术
NEUT#	中性粒细胞数	3.15		1.80 ～ 6.30	10^9/L	计算取值
LYMF#	淋巴细胞数	2.46		1.10 ～ 3.20	10^9/L	计算取值
MONO#	单核细胞数	0.33		0.10 ～ 0.60	10^9/L	计算取值
EO#	嗜酸性粒细胞数	0.08		0.02 ～ 0.52	10^9/L	计算取值
BASO#	嗜碱性粒细胞数	0.04		0.00 ～ 0.06	10^9/L	流式细胞技术
NEUT%	中性粒细胞比率	51.9		40.0 ～ 75.0	%	流式细胞技术
LYMF%	淋巴细胞比率	40.6		20.0 ～ 50.0	%	流式细胞技术
MONO%	单核细胞比率	5.5		3.0 ～ 10.0	%	流式细胞技术
EO%	嗜酸性粒细胞比率	1.4		0.4 ～ 8.0	%	流式细胞技术
BASO%	嗜碱性粒细胞比率	0.6		0.0 ～ 1.0	%	计算取值
RBC	*红细胞数	4.41		3.80 ～ 5.10	10^12/L	鞘流阻抗法
HGB	*血红蛋白	144.0		115.0 ～ 150.0	g/L	比色法
HCT	*红细胞压积	40.3		35.0 ～ 45.0	%	计算取值
MCV	*红细胞平均体积	91.3		82.0 ～ 100.0	fL	鞘流阻抗法
MCH	*平均血红蛋白量	32.6		27.0 ～ 34.0	pg	计算取值
MCHC	*平均血红蛋白浓度	357	↑	316 ～ 354	g/L	计算取值
R-SD	红细胞分布宽度SD	38.8		35.0 ～ 56.0	fL	鞘流阻抗法
R-CV	红细胞分布宽度CV	12.2		10.6 ～ 15.0	%	鞘流阻抗法
PLT	*血小板	233		125 ～ 350	10^9/L	鞘流阻抗法
MPV	平均血小板体积	9.8		6.0 ～ 14.0	fL	鞘流阻抗法
PDW	血小板分布宽度	16.7		15.0 ～ 17.0	fL	鞘流阻抗法
PCT	血小板压积	0.228		0.108 ～ 0.282	%	计算取值
P-LCR	大型血小板比率	25.30		11.00 ～ 45.00	%	鞘流阻抗法
P-LCC	大血小板数目	59.00		30.00 ～ 90.00	10^9/L	电阻抗法