

## 2章 終結式

### 定義 2.1

$f(X) = a_0X^m + a_1X^{m-1} + \cdots + a_m$  ( $a_0 \neq 0$ )  $g(X) = b_0X^n + b_1X^{n-1} + \cdots + b_n$  ( $b_0 \neq 0$ )  $\in K[X]$  に対して

$$\begin{pmatrix} a_0 & \cdots & 0 & b_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_0 & 0 & 0 & b_0 \\ a_m & 0 & 0 & b_n & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_m & 0 & 0 & b_n \end{pmatrix}$$

を  $f \times g$  のシルベスター行列と呼び、その行列式を  $f$  と  $g$  の終結式 (resultant) とよび、 $R(f, g)$  で表す

**証明**  $f(X)$  と  $g(X)$  が共通因子を持つ  $\Leftrightarrow$

$$\exists h(X), t(X) \in K[X]$$

$$\deg h < \deg g$$

$$\deg t < \deg f$$

$$f(X)h(X) = g(X)t(X)$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\exists h(X) = C_0X^{n-1} + \cdots + C_{n-1} \neq 0$$

$$t(X) = d_0X^{m-1} + \cdots + d_{m-1} \neq 0$$

$$f(X)h(X) = g(X)t(X)$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\exists (C_0, \dots, C_{n-1}, d_0, \dots, d_{m-1}) \neq \vec{0} \text{ 共通因子を } s(X) \text{ とすると}$$

$a_0C_0 = b_0d_0$	$X^{m+n-1}$ の係数
$a_1C_0 + a_0C_1 = b_1d_0$	$X^{m+n-2}$ の係数
$a_2C_0 + a_1C_1 + a_0C_2 = b_2d_0 + b_1d_1 + b_0d_2$	$X^{m+n-3}$ の係数
$\vdots$	$\vdots$
$a_mC_{n-1} + a_{m-1}C_{n-1} = b_nd_{m-2} + b_{n-1}d_{m-1}$	$X$ の係数
$a_mC_{n-1} = b_nd_{m-1}$	$X^0$ の係数

### 定理 2.2

$$R(f, g) \in \langle f(X), g(X) \rangle$$

実は  $R(f, g) = h(X)f(X) + t(X)g(X)$   $h(X), t(X)$  の係数は  $a_0, \dots, a_m, b_0, \dots, b_n$  の整式 (整数係数多項式)

**証明**  $R(f, g) = 0$  なら  $h(X) = t(X) = 0$  とおけばよい

$R(f, g) \neq 0$  とする。

$$\begin{pmatrix} a_0 & \cdots & 0 & b_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_0 & 0 & 0 & b_0 \\ a_m & 0 & 0 & b_n & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_m & 0 & 0 & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_0 \\ \vdots \\ C_{n-1} \\ d_0 \\ \vdots \\ d_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

の解  $(C_0, \dots, C_{n-1}, d_0, \dots, d_{m-1})$  に対し、

$h'(X) = C_0 X^{n-1} + \dots + C_{n-1}, t'(X) = d_0 X^{m-1} + \dots + d_{m-1}$  とおくと

$h'(X)f(X) + t'(X)g(X) = 1$  がなりたつことにほかならない

$R(f, g) \neq 0$  なので、解はただひとつ存在して、それは Clamer の公式によって

$$C_i = \frac{1}{R(f, g)}$$

よって、各  $C_j, d_j$  に  $R(f, g)$  をかけたものは、 $a_0, \dots, a_m, b_0, \dots, b_n$  の整式になる

$$\text{よって } \begin{matrix} h(X) = h'(X)R(f, g) \\ t(X) = t'(X)R(f, g) \end{matrix} \text{ とおけばよい}$$

## 定理 2.3 (拡張定理)

- $K$  : 代数的閉体
- $I \subset K[X_1, \dots, X_n]$  : イデアル

$$\mathbf{V}_k(I \cap K[X_1, \dots, X_{n-1}]) \ni (C_1, \dots, C_{n-1}) t_0(C_1, \dots, C_{n-1}) \neq 0 \Rightarrow \exists C_n \in K (C_1, \dots, C_n) \in \mathbf{V}_k(I)$$

例

$$K = \mathbf{C} \quad X = X_1, Y = X_2, Z = X_3$$

$$I = \langle ZX - 1, X - Y \rangle \subset \mathbf{C}[X, Y, Z]$$

$$I \cap \mathbf{C}[Y, Z] = \langle X - Y \rangle$$

$$(C_1, C_2) \in \mathbf{V}_{\mathbf{C}}(I \cup \mathbf{C}[Y, Z]) = \mathbf{V}_{\mathbf{C}}(\langle X - Y \rangle) = \{(c, c) \mid c \in \mathbf{C}\}$$

証明  $I(C_1, \dots, C_{n-1}) = \{f(C_1, \dots, C_{n-1}, X_n) \in K[X_n] \mid f \in I\}$  とおく

明らかにこれは  $K[X_n]$  のイデアル ( $I$  がイデアル  $\Leftrightarrow$

1.  $I \neq \emptyset$
2.  $I \ni p, q \Rightarrow p + q \in I$
3.  $I \ni p \Rightarrow \forall h \in K[X_1, \dots, X_n] \quad hp \in I$

)

### ケース 1

$I(C_1, \dots, C_{n-1}) = \langle 0 \rangle$   $C_n$  は任意にとれる

### ケース 2

$I(C_1, \dots, C_{n-1}) = \langle f(C_1, \dots, C_{n-1}, X_n) \rangle$   $\deg f(C_1, \dots, C_{n-1}, X_n) \geq 1$   
 $K$  は代数的閉体なので  $\exists C_n \in K \quad f(C_1, \dots, C_{n-1}, C_n) = 0$

### ケース 3

$$I(C_1, \dots, C_{n-1}) = \langle f(C_1, \dots, C_{n-1}, X_n) \rangle = \langle 1 \rangle$$

$$f(C_1, \dots, C_{n-1}, X_n) = a \text{ は } 0 \text{ でない定数}$$

$$f = S_0(X_1, \dots, X_{n-1})X_n^M + S_1(X_1, \dots, X_{n-1})X_n^{M-1} + \dots + S_M(X_1, \dots, X_{n-1})$$

とすると

$$S_0(C_1, \dots, C_{n-1}) = 0, \dots, S_{M-1}(C_1, \dots, C_{n-1}) = 0, S_M(C_1, \dots, C_{n-1}) = a \neq 0$$

$$g = t_0(X_1, \dots, X_{n-1})X_n^N + t_1(X_1, \dots, X_{n-1})X_n^{N-1} + \dots + t_N(X_1, \dots, X_{n-1})$$

とする

$$R(g, f, X_n) \in I \cap K[X_1, \dots, X_{n-1}] \quad (\because \text{定理 2.2}) \quad f, g \in I$$

$$\det \begin{pmatrix} t_0 & & s_0 & & \\ & \ddots & & \ddots & \\ & & t_0 & & s_0 \\ t_N & & & S_M & \\ & & & & \vdots \\ & & t_N & & S_m \end{pmatrix} = h(X_1, \dots, X_n)$$

矛盾、よってケース 3 はおこらない

## 3章 Hilbert の零点定理

### 定理 3.1 (Hilbert の零点定理 弱系)

$K$ : 代数的閉体

$I \subset K[X_1, \dots, X_n]$ : イデアル

$V_K(I) = \emptyset \Rightarrow I \ni 1$  (どんな  $K$  に対しても常になりつつ)

#### Claim 1

$$f'(Y_1, \dots, Y_n, Y_{n+1}) =$$

$$f(Y_1 + a_1 Y_{n+1}, \dots, Y_n + a_n Y_{n+1}, Y_{n+1}) = h(a_1, \dots, a_n) Y_{n+1}^N + t$$

$h(Y_1, \dots, Y_n)$  は 0 でない  $n$  変数多項式  $t$  は  $Y_{n+1}$  に関して次数  $N$  未満の式と表される

#### Claim 2

$h(1, \dots, a_n) \neq 0$  なる  $a_1, \dots, a_n \in K$  が存在する

#### Claim 3

$I' = \{f(Y_1 + a_1 Y_{n+1}, \dots, Y_n + a_n Y_{n+1}, Y_{n+1}) \mid f \in I\} \subset K[Y_1, \dots, Y_{n+1}]$  とおくと  $I'$  はイデアルである

### 定理 3.2

$K$  を無限体とするとき、

$$f(X_1, \dots, X_n) \in K[X_1, \dots, X_n] \text{ が } \forall c_1, \dots, c_n \in K \ f(c_1, \dots, c_n) = 0 \Rightarrow f(X) = 0$$

#### 注意 1

$K$  が有限体なら成り立たない

#### 注意 2

$K$  が代数的閉体なら  $K$  は無限体

### 定理 3.3 Hilbert の零点定理 (強形)

$K$ : 代数的閉体 とするとき

$$f_1(X_1, \dots, X_n), \dots, f_s(X_1, \dots, X_n), g(X_1, \dots, X_n) \in K[X_1, \dots, X_n] \text{ に対して} \\ g \in \mathbf{I}(\mathbf{V}_K(\{f_1, \dots, f_l\})) \Rightarrow \exists m \in \mathbf{N} \ g^m \in \langle f_1, \dots, f_l \rangle$$

この意味

$$\mathbf{V}_K \text{ は連立方程式 } \begin{cases} f_1 = 0 \\ \vdots \\ f_l = 0 \end{cases} \text{ の } K \text{ における解全体の集合}$$

$g$  が連立方程式のすべての解に対して 0 になるような  $g$  を  $m$  乗した  $g^m$  がイデアル  $\langle f_1, \dots, f_l \rangle$  に属する

注意 実は弱形は強形の特殊な場合である。

強形を論理式のみで書くと

$$\forall \bar{c} \in K^n (f_1(\bar{c}) = 0 \wedge \dots \wedge f_s(\bar{c}) = 0 \rightarrow f(\bar{c}) = 0) \rightarrow \exists m \in \mathbf{N} \ f^m \in \langle f_1, \dots, f_s \rangle$$

$\Leftrightarrow$

$$\neg \forall \bar{c} \in K^n (\neg (f_1(\bar{c}) = 0 \wedge \dots \wedge f_s(\bar{c}) = 0)) \vee \exists m \in \mathbf{N} \ f^m \in \langle f_1, \dots, f_s \rangle$$

$f(\bar{X}) = 1$  に対してももちろんなりたつ、

$$\forall f_1, \dots, f_s \in K[\bar{X}]$$

$$\neg \forall \bar{c} \in K^n (\neg (f_1(\bar{c}) = 0 \wedge \dots \wedge f_s(\bar{c}) = 0)) \vee \exists m \in \mathbf{N} \ 1^m \in \langle f_1, \dots, f_s \rangle$$

## 4章 連立代数方程式の解の個数

### 定理 4.1

$K$ : 代数的閉体

$I \subset K[X] = K[X_1, \dots, X_n]$  に対して

$$\mathbf{V}_K(I) \text{ が有限集合 } \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, n \ \exists h_i(X_i) \in K[X_i] \ h_i(X_i) \in I$$

### 定義 4.1

$I \subset K[\bar{X}]$ : イデアル

$f, g \in K[\bar{X}]$  に対して

$f \sim g \stackrel{\text{def}}{\iff} f - g \in I$  で  $\sim$  を定義すると  $\sim$  は同値関係になる。  
 $\sim$  の同値類上に

- $[f]_{\sim} + [g]_{\sim} = [f + g]_{\sim}$
- $[f]_{\sim} \cdot [g]_{\sim} = [fg]_{\sim}$

で  $+$  と  $\cdot$  を自然に定義すると同値類は可換環になる。これを  $K[\bar{X}]$  の  $I$  による剰余環とよび、 $K[\bar{X}]$  で表す。

( $+$  と  $\cdot$  が well-defined になることは示さないといけない。

すなわち、 $f \sim f', g \sim g'$  ならば、 $f + g \sim f' + g', f \cdot g \sim f' \cdot g'$  を示す必要がある。)

## 定義 4.2

$K[\bar{X}]/I$  は  $K$  上の線形空間で  $I$  もその部分空間とみなせる。

$K[\bar{X}]/I$  は線形空間としてのその商空間ともみなせる。

その次元を  $\dim K[\bar{X}]/I$  で表す