

# EE2802: Assignment4

Nikam Pratik Balasaheb (EE21BTECH11037)

## 1 PROBLEM

A line passes through  $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$  and  $\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$ . If the slope of the line is  $m$ , show that

$$k - y_1 = m(h - x_1) \quad (1.0.1)$$

## 2 SOLUTION

let the line joining  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$  and  $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$  be  $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \lambda \mathbf{m}_1$

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = (\mathbf{x}_0 + \lambda_1 \mathbf{m}_1) - (\mathbf{x}_0 + \lambda_2 \mathbf{m}_1) = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} \quad (2.0.1)$$

$$\Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2) \mathbf{m}_1 = \begin{pmatrix} x_1 - h \\ y_1 - k \end{pmatrix} \quad (2.0.2)$$

$$\mathbf{m}_1 = k \begin{pmatrix} x_1 - h \\ y_1 - k \end{pmatrix} \quad (2.0.3)$$

slope  $m$  is given by  $m = \tan(\theta)$ ,  $\theta$  being angle between line and  $x$  axis i.e.  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x} = 0$

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{m}_1^T \mathbf{m}_2}{\|\mathbf{m}_1\| \|\mathbf{m}_2\|} \quad (2.0.4)$$

$$= \frac{x_1 - h}{\sqrt{(x_1 - h)^2 + (y_1 - k)^2}} \quad (2.0.5)$$

$$m = \tan \theta = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} \quad (2.0.6)$$

$$m = \frac{y_1 - k}{x_1 - h} \quad (2.0.7)$$

$$\Rightarrow k - y_1 = m(h - x_1) \quad (2.0.8)$$

Hence Proved.

