

# 线性代数总复习 I 答案

考试班级 ~~XXXXXXXXXX~~ 学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_

一、填空题 (本题共 12 小题, 每题 3 分, 共 36 分)

1. 已知  $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ x & 1 & 0 \\ x^2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$ , 则  $x =$  3 or -1.

2. 如果齐次方程组  $\begin{cases} \lambda x_1 + 2x_2 = 0 \\ 3x_1 + 2\lambda x_2 = 0 \end{cases}$  有非零解, 那么  $\lambda =$   $\pm\sqrt{3}$ .  
 $\Leftrightarrow R(A) < n \Leftrightarrow |A| = 0$

3. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ , 则  $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ .  
 考点: 分块矩阵求逆  
 $\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix}$

4. 设  $A$  为三阶方阵, 且  $|A| = 2$  则  $|3A^{-1} - A^*| =$   $-\frac{1}{2}$ .  
 $A^* = A^{-1}|A|$ ,  $|A^T| = |A|$

5. 已知矩阵  $A$  的秩为  $n-1$ , 且  $\eta_1, \eta_2$  为非齐次线性方程组  $Ax = b$  的两个互不相同的解, 则  $Ax = b$  的通解为  $\eta_1 + k(\eta_1 - \eta_2), k$  为任意常数.  
 非齐通 = 齐通 + 非齐特  
 $\downarrow$   
 $= n - R(A) = n - (n-1)$   
 自由个数 = 1

6. 设  $\alpha = (2, -1, 5)^T$ ,  $\beta = (-1, 1, 1)^T$ , 则  $\alpha + \beta =$   $(1, 0, 6)^T$ .

7. 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 则向量组  $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$  是 线性相关

(填“线性相关”或“线性无关”).

解: 设  $k_1(\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(\alpha_2 - \alpha_3) + k_3(\alpha_3 - \alpha_1) = 0$ , 则 先设后证

直接  $(k_1 - k_3)\alpha_1 + (k_2 - k_1)\alpha_2 + (k_3 - k_2)\alpha_3 = 0$ , 因为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 故

$k_1 - k_3 = 0$

$\therefore$  线性相关  $\begin{cases} k_1 - k_3 = 0 \\ k_2 - k_1 = 0 \\ k_3 - k_2 = 0 \end{cases}$ , 则  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 则方程组  $\begin{cases} k_1 - k_3 = 0 \\ k_2 - k_1 = 0 \\ k_3 - k_2 = 0 \end{cases}$  有非零解, 所以向

量组  $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$  是线性相关的。

8. 矩阵  $\begin{pmatrix} 3 & 10 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$  的全部特征值为 -2, 7.  $|A - \lambda E| = 0, \lambda = ?$

9. 设三阶矩阵  $A$  的 3 个特征值为 2, 3, 4, 则行列式  $|A| =$  24.  $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$

10. 与  $\alpha_1 = (1, -2, 3), \alpha_2 = (0, 2, -5)$  都正交的单位向量为  $(\frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{2}{3\sqrt{5}})$ .  $\begin{cases} \text{施密特?} \\ 2\text{个方程} \\ 3\text{个未知} \end{cases}$

解: 设与  $\alpha_1 = (1, -2, 3), \alpha_2 = (0, 2, -5)$  都正交的向量为  $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)$ , 则

$$\begin{cases} (\alpha_1, \alpha_3) = x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ (\alpha_2, \alpha_3) = 2x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}, \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \div 2]{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}, \text{解得} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

单位化得  $(\frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{2}{3\sqrt{5}})$ .

化为行最简形  
你在想什么啊!!

11. 若 3 元实二次型  $f(x_1, x_2, x_3)$  的标准形为  $4y_1^2 - 3y_2^2$ , 则其规范形为  $z_1^2 - z_2^2$ .

12. 已知二次型  $f = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2$  为正定二次型, 则  $\lambda$  的取值范围为  $-1 < \lambda < 1$ .

解: 二次型矩阵为  $\begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ , 二次型矩阵为正定矩阵, 则所有顺序主子式都大于零, 故

$$1 > 0, \begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 1 \end{vmatrix} = 1 - \lambda^2 > 0, \begin{vmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 5(1 - \lambda^2) > 0, \text{解得} \underline{-1 < \lambda < 1}.$$

二、计算题 (本题共 6 小题, 每题 8 分, 共 48 分)

1. 计算行列式  $\begin{vmatrix} a-1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & a-2 & 1 & \cdots & 1 \\ 3 & 1 & a-3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & 1 & 1 & \cdots & a-n \end{vmatrix}.$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \begin{vmatrix} a-1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 3-a & a-3 & 0 & \cdots & 0 \\ 4-a & 0 & a-4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n+1-a & 0 & 0 & \cdots & a-n-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+n-2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-n-1 \end{vmatrix} \\ &= (a+n-2)(a-3)\cdots(a-n-1). \end{aligned}$$

2. 设  $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 矩阵  $X$  满足关系式  $A - XA = X$ , 求  $X$ .

解:  $A - XA = X \Rightarrow XA + X = A \Rightarrow X(A + E) = A \Rightarrow X = A(A + E)^{-1}$

$$X = A(A + E)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

3. 线性方程组  $\begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - 4x_2 + ax_3 = b \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 5 \end{cases}$ , 问:  $a, b$  取何值时, 方程组无解、有唯一解、有无穷多解?

在有无穷多解时求出其全部解.

解: 对其增广矩阵进行高斯消元

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 1 & -4 & a & b \\ 2 & -1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & -4 & a & b \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 5 \\ 0 & -1 & a+1 & b \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \times \frac{1}{5} \\ r_3 + r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+2 & b+1 \end{pmatrix} \text{ 当}$$

$a = -2, b \neq -1$  时, 方程组无解; 当  $a \neq -2$  时, 方程组有唯一解;

当  $a = -2, b = -1$  时, 方程组有无穷多解, 其解为:

$$x_1 = 3 - 2k, x_2 = 1 - k, x_3 = k, k \text{ 为任意常数.}$$

4. 设向量组  $\alpha_1 = (1, 2, -3, 1), \alpha_2 = (2, 3, -1, 2), \alpha_3 = (3, 1, -2, -2), \alpha_4 = (0, 4, -2, 5)$ , 求其极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组线性表出.

$$\text{解: } A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ -3 & -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为其一个极大线性无关组, 且  $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$ .

5. 设  $n$  维向量  $\alpha = (\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2})$ , 矩阵  $A = E - \alpha^T \alpha$ ,  $B = E + 2\alpha^T \alpha$ , 求  $AB$ .

解: (法一)  $\alpha \alpha^T = (\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2})(\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2})^T = \frac{1}{2}$  △ 这个计算 [a] = a

$$AB = (E - \alpha^T \alpha)(E + 2\alpha^T \alpha) = E + \alpha^T \alpha - 2\alpha^T (\alpha \alpha^T) \alpha = E$$

对! 这样好!  
不要法2!!!

(法二)  $\alpha^T \alpha = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} (\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

$$A = E - \alpha^T \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 & \dots & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \dots & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

$$B = E + 2\alpha^T \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \cdots & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} = E$$

6. 已知二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$  通过正交变换化为标准形

$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$ , 求参数  $a$  的值及所用的正交变换矩阵.

解: 二次型的矩阵为  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$ , 由二次型的标准形知  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$ .

由于  $|A| = 2(9 - a^2) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 10 \Rightarrow a = \pm 2$ .   
 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$   
 其中  $|A|$  是系数行列式.

当  $a = 2$  时, 对应于  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$  的特征向量分别为  $(0, 1, -1), (1, 0, 0), (0, 1, 1)$ ,

所用正交变换矩阵为  $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ ;  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$   
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \leftarrow \lambda=1$   
 对: 对称矩阵  
 不同  $\lambda$  对应  $a$  不一样  
 $\lambda=2$ :  $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$   
 $\lambda=5$ :  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$   
 入就是  $|A|$  中  
 本来要求的阿  
 只不过现在告诉你了  
 正交阵

当  $a = -2$  时, 对应于  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$  的特征向量分别为  $(0, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, -1)$ ,

所用正交变换矩阵为  $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ ;  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$

四、证明题(本大题共 3 小题, 共 16 分)

1. 设  $n$  阶矩阵  $A$  满足  $A^2 + 2A + 3E = O$ , 证明  $A + 3E$  可逆, 并求其逆矩阵. (6 分)

证明: 因为  $(A + 3E)(A - E) = -6E$ ,

平方项这么配: 不是  $A(A+3E)$  是  $A^2 - 9E \Rightarrow (A+3E)(A-E)$   
平方项配平方差 (✓)

所以  $|(A + 3E)(A - E)| = |A + 3E| |A - E| = |-6E| \neq 0$ , 即  $|A + 3E| \neq 0$ , 故可逆;

且  $(A + 3E)^{-1} = -\frac{1}{6}(A - E)$ .

2. 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  满足: (1)  $\alpha_1 \neq 0$ ; (2) 每个  $\alpha_i (i = 2, 3, \dots, s)$  都不能由它前面的向量

线性相关, 即不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$  线性表出. 证明:  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关. (5 分)

证明: 若  $s = 1$ , 由 (1) 知结论成立.

下面设  $s \geq 2$ , 反设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性相关,

即存在一组不全为零的数  $k_1, k_2, \dots, k_s$ , 使得  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$  成立.

设从后往前看第一个不为零的数为  $k_t (1 \leq t \leq s)$ , 即有  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t = 0, k_t \neq 0$ ,

故  $\alpha_t = -\frac{k_1}{k_t}\alpha_1 - \frac{k_2}{k_t}\alpha_2 - \dots - \frac{k_{t-1}}{k_t}\alpha_{t-1}$ , 与 (2) 矛盾, 故  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关.

3. 若  $A$  是正定矩阵,  $A^*$  是其伴随矩阵, 证明  $A^*$  是正定的. (5 分)

证明: 因为  $A$  是正定矩阵, 故  $A$  的特征值  $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ , 且  $|A| > 0$ .

又  $A^* = |A|A^{-1}$ ;  $(A^*)^T = (|A|A^{-1})^T = |A|(A^T)^{-1} = |A|A^{-1} = A^*$ , 故  $A^*$  是对称矩阵,

且  $A^*$  的特征值为  $|A|\lambda_i^{-1} > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ , 所以  $A^*$  是正定的.