



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Ayudante: Nicholas Mc-Donnell

Email: namcdonnell@uc.cl

Ayudantía 05

MAT1106 — Introducción al Cálculo

Fecha: 2020-09-01

Problema 1:

Sean $a, b > 0$ demuestre que

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \geq \frac{a + b}{2}.$$

¿Cuándo se alcanza la igualdad?

Solución problema 1: Se ve el siguiente desarrollo

$$\begin{aligned} 0 < \frac{a + b}{2} &\leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} && \Longleftrightarrow \\ 0 < \left(\frac{a + b}{2}\right)^2 &\leq \frac{a^2 + b^2}{2} && \Longleftrightarrow \\ \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} &\leq \frac{a^2 + b^2}{2} && \Longleftrightarrow \\ 0 &\leq \frac{a^2 - 2ab + b^2}{4} && \Longleftrightarrow \\ 0 &\leq \frac{(a - b)^2}{4} && \Longleftrightarrow \end{aligned}$$

Y lo último es cierto.



Problema 2:

Sean $a, b, c, d > 0$ demuestre que

$$\sqrt{(a + c)(d + b)} \geq \sqrt{ab} + \sqrt{cd}$$

Solución problema 2: Se tiene lo siguiente

$$\begin{aligned}
 \sqrt{(a+c)(d+b)} &\geq \sqrt{ab} + \sqrt{cd} > 0 && \Longleftrightarrow \\
 (a+c)(d+b) &\geq \left(\sqrt{ab} + \sqrt{cd}\right)^2 > 0 && \Longleftrightarrow \\
 ad + bc + ab + cd &\geq ab + 2\sqrt{abcd} + cd && \Longleftrightarrow \\
 ad + bc &\geq 2\sqrt{abcd} && \Longleftrightarrow \\
 \frac{ad + bc}{2} &\geq \sqrt{abcd} && \Longleftrightarrow
 \end{aligned}$$

y lo último es cierto por MA-MG. ■

Problema 3:

Sean $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ demuestre que

$$(a_1 + \dots + a_n) \cdot \left(\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2$$

Solución problema 3: Se nota que en la izquierda hay n^2 cuadrados términos, por lo que se toma la media aritmética y se usa MA-MG

$$\frac{(a_1 + \dots + a_n) \cdot \left(\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} \right)}{n^2} \geq \sqrt[n^2]{1}$$

En la derecha hay un 1 ya que para todo término de la forma $\frac{a_i}{a_j}$ en la multiplicación está el término $\frac{a_j}{a_i}$. Se ve que lo anterior es equivalente a lo pedido. ■

Problema 4:

Sean a_1, \dots, a_n y b_1, \dots, b_n reales tales que para todo $1 \leq j \leq n-1$ se tiene que $a_i > a_{i+1}$ y $b_i > b_{i+1}$. Demuestre que

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n > S_n > a_1b_n + a_2b_{n-1} + \dots + a_nb_1.$$

Donde S_n es la suma de $a_{k_i}b_{j_i}$ con $k_i, j_i \in \{1, \dots, n\}$ tales que $k_a \neq k_b$ y $j_a \neq j_b$ si $a \neq b$, y que no se tiene que para todo $i \in \{1, \dots, n\}$ $k_i = j_i$.

Solución problema 4: Se nota que si se tiene la primera parte de la desigualdad, se tiene la segunda, ya que si se toma $b_i^* = -b_i$, se tiene

$$\begin{aligned} a_1b_n^* + \dots + a_nb_1^* &> S_n^* && \Longleftrightarrow \\ a_1b_n + \dots + a_nb_1 &< S_n. \end{aligned}$$

Dado eso, se nota que se pide demostrar que el máximo de todas las permutaciones es $k_i = j_i = i$ para todo $1 \leq i \leq n$. Para eso, se usará inducción sobre n . Ahora, para $n = 2$ sean $a_1 > a_2$ y $b_1 > b_2$, entonces

$$\begin{aligned} a_1b_1 + a_2b_2 &> a_1b_2 + a_2b_1 && \Longleftrightarrow \\ a_1b_1 + a_2b_2 - a_1b_2 - a_2b_1 &> 0 && \Longleftrightarrow \\ a_1(b_1 - b_2) + a_2(b_2 - b_1) &> 0 && \Longleftrightarrow \\ (a_1 - a_2)(b_1 - b_2) &> 0. \end{aligned}$$

Lo que es cierto ya que $a_1 > a_2$ y $b_1 > b_2$. Para el caso $n = k$ se asume $n = k - 1$, ahora sea S_n alguna permutación tal que a_1b_1 no sea un término, entonces se tiene que $S_n = a_1b_j + a_ib_j + T$, donde $i, j > 0$ y T corresponde al resto de los términos. Entonces, sea $S'_n = a_1b_1 + a_ib_i + T$, queremos demostrar que $S'_n > S_n$, en otras palabras

$$\begin{aligned} a_1b_1 + a_ib_j + T &> a_1b_j + a_ib_1 + T && \Longleftrightarrow \\ a_1b_1 + a_ib_j &> a_1b_j + a_ib_1 && \Longleftrightarrow \\ a_1b_1 + a_ib_j - a_1b_j - a_ib_1 &> 0 && \Longleftrightarrow \\ a_1(b_1 - b_j) - a_i(b_1 - b_j) &> 0 && \Longleftrightarrow \\ (a_1 - a_i)(b_1 - b_j) &> 0, \end{aligned}$$

y esto último es verdad ya que $a_1 > a_i$ y $b_1 > b_j$. Ahora, se nota que a_2, \dots, a_n y b_2, \dots, b_n son $n - 1$ términos por lo que por inducción se tiene que

$$a_2b_2 + \dots + a_nb_n > a_ib_j + T,$$

por lo que

$$a_1b_1 + \dots + a_nb_n > a_1b_1 + a_ib_j + T.$$

Lo que es equivalente a decir que $a_1b_1 + \cdots + a_nb_n > S'_n$, con lo que usando transitividad se tiene lo pedido.¹

■

¹El caso donde a_1 y b_1 están juntos es equivalente a la desigualdad con S'_n .