



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Segundo Semestre de 2018

Tarea 3

Teoría de Números - MAT 2225

Fecha de Entrega: 2018/09/04

Integrantes del grupo:

Nicholas Mc-Donnell, Camilo Sánchez

Problema 1 (3 pts.). Demuestre que para todo entero positivo n se tiene

$$\theta(2n) - \theta(n) \leq 2(\log 2)n$$

Solución problema 1: Recordamos la definición de θ

$$\theta(x) = \sum_{p \leq x} \log p$$

Dado esto escribimos lo siguiente

$$\exp(\theta(2n) - \theta(n)) = \prod_{n \leq p \leq 2n} p = L \in \mathbb{Z}$$

Lema 1. Sea un primo $p \in \{n+1, n+2, \dots, 2n-1, 2n\}$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces $p \mid \binom{2n}{n}$.

Para demostrar esto, notemos que todo $1 < n < p$ no divide a p , luego expandiendo $\binom{2n}{n}$

$$\binom{2n}{n} = \frac{(n+1)(n+2) \cdot \dots \cdot (2n-1)(2n)}{n!}$$

Como $\forall k \in \{2, 3, \dots, n-1, n\}$ $k \nmid p$, por lo que $p/n!$ es irreducible, lo que implica que $\binom{2n}{n} = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p^{\alpha} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$, donde $\alpha > 0$, por lo que $p \mid \binom{2n}{n}$

Notemos que por L es libre de cuadrados por construcción, luego $L \mid \binom{2n}{n}$. Vemos que $2^{2n} = \sum_{i=0}^n \binom{2n}{i} \geq \binom{2n}{n}$, por lo que $L \leq 2^{2n}$.

$$\therefore \theta(2n) - \theta(n) \leq 2n \log 2$$

Que es lo que queríamos demostrar. ■

Problema 2 (2 pts. c/u).

(I) Demuestre que $\exp(\psi(n)) = \text{mcm}(1, 2, \dots, n)$ para todo entero positivo n .

(II) Dado cualquier polinomio $F(t) \in \mathbb{Z}[t]$ de grado $d \geq 1$, demuestre que

$$\exp(\psi(d+1)) \cdot \int_0^1 F(t) dt$$

es un entero.

(III) Sea $G(t) = t^3(1-2t)^2(1-t)^3$. Muestre que para todo entero positivo k se cumple

$$0 < \int_0^1 G(t)^k dt \leq \left(\frac{27}{16384} \right)^k$$

(IV) Muestre que para todo entero de la forma $n = 8k + 1$ se tiene que

$$\psi(n) \geq \frac{4}{5}(n-1)$$

Solución problema 2:

(I)

(II) Por (I) tenemos que $\exp(\psi(n)) = \text{mcm}(1, 2, \dots, n)$, luego

$$F(t) = \sum_{n=0}^d a_n t^n \in \mathbb{Z}[t]$$

Notamos entonces que

$$\begin{aligned} \exp(\psi(d+1)) \int_0^1 F(t) dt &= \exp(\psi(d+1)) \sum_{n=0}^d \frac{a_n}{n+1} \\ &= \text{mcm}(1, 2, \dots, d+1) \sum_{n=0}^d \frac{a_n}{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^d a_n \frac{\text{mcm}(1, 2, \dots, d+1)}{n+1} \end{aligned}$$

Claramente vemos que $n + 1 \mid \text{mcm}(1, 2, \dots, d + 1)$ para todo $n \in \{0, 1, \dots, d\}$, por lo que $\frac{\text{mcm}(1, 2, \dots, d + 1)}{n + 1} \in \mathbb{Z}$

$$\therefore \sum_{n=0}^d a_n \frac{\text{mcm}(1, 2, \dots, d + 1)}{n + 1} \in \mathbb{Z}$$

Y como eso es igual a $\exp(\psi(d + 1)) \int_0^1 F(t) dt$, tenemos lo que queríamos.

(III) Dada la expresión $G(t)^k$, queremos encontrar un máximo en el intervalo $[0, 1]$, para esto derivamos la función e igualamos a 0.

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} G(t)^k \\ &= \end{aligned}$$

(IV)

■

Problema 3 (5 pts.). Demuestre que para todo $x > 1$ existe un primo p que cumple $x < p < 2x$.

Solución problema 3: De la pregunta 1, tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} \theta(n) - \theta(n/2) &\leq \log(2)n \\ \theta(n/2) - \theta(n/4) &\leq \log(2)n/2 \\ &\vdots \\ \theta(n/2^k) - \theta(n/2^{k+1}) &\leq \log(2)n/2^k \end{aligned}$$

Notamos que si $k > \frac{\log(n)}{\log(2)} - 2$, entonces $n/2^{k+1} < 2$, por lo que $\theta(n/2^{k+1}) = 0$. Por lo que tomamos $k = \left\lfloor \frac{\log(n)}{\log(2)} - 2 \right\rfloor + 1$, y sumamos, tal que

$$\theta(n) = \theta(n) - \theta(n/2^{k+1}) \leq \log(2)n \sum_{i=0}^k \frac{1}{2^i} \leq \log(2)n \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \log(2)2n$$

Con lo que obtenemos

$$\theta(n) \leq \log(2)2n \tag{1}$$

Sea $n \in \mathbb{N}$, luego por propiedades modulares existe $n_0 \in \{n, n-1, n-2, \dots, n-7\}$ tal que $n_0 = 8k+1$ con $k \in \mathbb{N}$. Y así con la pregunta 2, obtenemos

$$\psi(n) \geq \psi(n_0) \geq \frac{4}{5}(n_0 - 1) \geq \frac{4}{5}(n - 8)$$

Por lo que conseguimos

$$\psi(n) \geq \frac{4}{5}(n - 8) \quad (2)$$

En clase vimos $\psi(n) = \sum_{k \geq 1} \theta(n^{1/k})$. Con esto se obtiene

$$\psi(2n) = \theta(2n) + \sum_{k \geq 2} \theta((2n)^{1/k})$$

Pero notamos que $\theta((2n)^{1/k}) = 0$ con $k = \left\lceil \frac{\log 2n}{\log 2} \right\rceil$, ya que $2 > (2n)^{1/k}$.

Así $\psi(2n) = \theta(2n) + \sum_{k \geq 2}^{\left\lceil \frac{\log 2n}{\log 2} \right\rceil} \theta((2n)^{1/k}) \leq \theta(2n) + \theta(\sqrt{2n}) \cdot \left\lceil \frac{\log 2n}{\log 2} \right\rceil$, ya que si $k_1 > k_2$ se cumple que $\theta(n^{1/k_1}) \leq \theta(n^{1/k_2})$.

Con esto y juntando con (2) obtenemos

$$\frac{4}{5}(2n - 8) \leq \psi(2n) \leq \theta(2n) + \theta(\sqrt{2n}) \cdot \left\lceil \frac{\log 2n}{\log 2} \right\rceil \leq \theta(2n) + \theta(\sqrt{2n}) \cdot \frac{\log 2n}{2}$$

De lo cual se obtiene

$$\frac{4}{5}(2n - 8) - \theta(\sqrt{2n}) \cdot \frac{\log 2n}{2} \leq \theta(2n) \quad (3)$$

Usando (1) se puede obtener lo siguiente

$$-2n \log 2 \leq -\theta(n) \quad (4)$$

$$\theta(\sqrt{2n}) \cdot \frac{\log 2n}{2} \leq \sqrt{2n} \log 2 \log 2n \quad (5)$$

Usando (3), (4) y (5)

$$\frac{4}{5}(2n - 8) - 2n \log 2 - \sqrt{2n} \log 2 \log 2n \leq \theta(2n) - \theta(n)$$

Ahora analizando la función

$$\begin{aligned} f(n) &= \frac{4}{5}(2n - 8) - 2n \log 2 - \sqrt{2n} \log 2 \log 2n \\ &= n \left(\frac{8}{5} - 2 \log 2 - \frac{\sqrt{2} \log 2 \log 2n}{\sqrt{n}} \right) - \frac{32}{5} \end{aligned}$$

Más aún analizando la función

$$g(n) = \frac{8}{5} - 2 \log 2 - \frac{\sqrt{2} \log 2 \log 2n}{\sqrt{n}}$$

Derivándola se ve

$$\begin{aligned} g'(n) &= \frac{\sqrt{2}(\log 2)^2}{2n\sqrt{n}} - \frac{\sqrt{2} \log 2}{n\sqrt{n}} + \frac{\sqrt{2} \log 2 \log n}{2n\sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{2} \log 2}{2n\sqrt{n}} (\log 2 - 2 - \log n) \\ &= \frac{\sqrt{2} \log 2}{2n\sqrt{n}} \log \left(\frac{2n}{e^2} \right) \end{aligned}$$

Aquí se puede notar que si $n > \frac{e^2}{2} \implies g'(n) > 0$

Luego $\forall n > \frac{e^2}{2}$ se tiene que $g(n)$ es creciente

Recordamos que $f(n) = n \cdot g(n) - \frac{28}{5}$, por lo que cuando $g(n) > 0$, $f(n)$ será creciente.

Por inspección claramente se ve que $g(1302) > 0$, más aún es el primer natural donde la función es positiva, y como $g(n)$ es creciente¹, desde 1302 $g(n)$ siempre es positiva.

Así $\forall n \geq 1302$, se cumple que $f(n)$ es creciente, ahora de nuevo por inspección se tiene que $f(1381) > 0$, y específicamente es el primer natural que cumple que la función sea positiva, y como es creciente², $\forall n \geq 1381 \quad f(n) > 0$

$$\forall n \geq 1381 \quad 0 < f(n) \leq \theta(2n) - \theta(n)$$

Es decir $\sum_{n \leq p \leq 2n} \log p > 0 \implies \exists p \text{ primo} : n < p < 2n \quad \forall n \geq 1381$, dado esto se pueden analizar los casos restantes.

¹1302 > $\frac{e^2}{2}$
²1381 > 1302

Observación 3.1. Notemos que si $\exists p \in [2, 2n] \cap \mathbb{Z}$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces $\forall \alpha \in (n, n+1)$ se tiene que $\alpha < p < 2\alpha$

Demostración. Esto se puede ver ya que

$$\begin{aligned} n < p &\implies n+1 \leq p \\ &\implies \alpha < n+1 \leq p \\ &\implies \alpha < p \end{aligned}$$

Por otro lado $p < 2n < 2\alpha$, luego $\alpha < p < 2\alpha$ □

La observación anterior ayuda a reducir el análisis a solo los naturales

■

Problema 4 (4 pts.). Demuestre que existe una constante real estrictamente positiva $C > 0$ que cumple

$$\prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \frac{C}{\log x} + O\left(\frac{1}{(\log x)^2}\right)$$

Solución problema 4:

■