量性研究方法 · 完整研究專案

單元 5

推論統計

Inferential Statistics — From Sample to Population


虛無假設與 p 值的邏輯、效應量／變異／樣本數三股力量、六種推論檢定（相關、t 檢定、ANOVA、RM ANOVA、邏輯斯、卡方）與 APA 報告，並避免 p 值誤用

Learning Objectives

本單元結束後，你能……

- 能說明為何要推論，並計算、解讀標準誤（SE）與 95% 信賴區間。
- 能寫出 H_0 ／ H_1，正確陳述 p 值、α 與兩種錯誤的意義，並指出常見誤解。
- 能用效應量判斷實務重要性，並依研究設計判斷能否說『造成』。
- 能依 IV ／ DV 型態選出檢定、說出要先檢查的假設，並走完一次八步實作。
- 課堂講第 1–47 張；各檢定實算、讀輸出、APA 報告與避免誤用為自學（第 48 張起），作業會考。

本單元怎麼走 為何推論 → 估一個數（SE、CI）→ 判斷有沒有差（H_0、p）→ 什麼決定 p → 顯著之後 → 選檢定＋實作 → 自學



S

推論統計速覽

Executive Summary — 9 張抓住推論的核心；時間有限先講這 9 張，細節見 A–D 各節

細節 → 第 14 張

速覽 1 ｜推論在做兩件事：估一個數、判斷有沒有差

手上只有樣本，想知道的是母體；推論就是在『不確定』下，用樣本說母體的事

① 估一個數

問　母體平均大概在哪?
例　抽 100 位護理師，平均壓力 21 分 → 全國護理師平均大約在哪?
工具　標準誤 SE → 95% 信賴區間
→ 速覽 2-3

② 判斷有沒有差

問　母體裡各組真的不同嗎?
例　App 組比等候組低 3.8 分 → 真的有效，還是抽樣巧合?
工具　H_0、p 值、α → 效應量 → 研究設計
→ 速覽 4-7

速覽怎麼走

速覽 2 **SE** ▸ 速覽 3 **CI** ▸ 速覽 4 **H_0 與 p** ▸ 速覽 5 **五步驟＋錯誤** ▸ 速覽 6 **訊號 ÷ 雜訊** ▸ 速覽 7 **顯著之後** ▸ 速覽 8 **選檢定** ▸ 速覽 9 **八步＋報告**


重點　①的答案是一個範圍（CI），②的答案是顯著與否（p）再加效應量；兩者的地基都是標準誤 SE。

細節 → 第 16-20 張

速覽 2 ｜標準誤 SE：樣本平均會晃多少

SD 描述『人與人差多少』，SE 描述『重抽一次，平均會跳多少』；推論用的是 SE

例：母體 SD = 10，樣本數越大，SE 越小



N 25 → 100（×4），SE 2.0 → 1.0；再 ×4 到 400，SE 才到 0.5——加人的效益越來越小。

SD 和 SE 不一樣

SD 標準差 描述『個人』彼此差多少
人數變多不會變小；報樣本寫 M ± SD

SE 標準誤 描述『樣本平均』每次抽樣會晃多少
= SD÷√N，人數越多越小；用來算 CI 與 p

為什麼能用常態？ 中央極限定理：N 夠大，樣本平均的分佈近常態，母體再偏也一樣（2.3）。

重點 SE = SD ÷ √N：人數 ×4，SE 才減半；95% 的樣本平均落在母體平均 ±1.96×SE 之內——這是 CI 與 p 值的地基。

細節 → 第 21-24 張

速覽 3 ｜信賴區間 CI：不只一個點，還給一個範圍

95% CI ＝估計值 ± 臨界值 × SE；寬度代表不確定性，越窄越精確

例：M ＝ 52、SD ＝ 10、N ＝ 25


① **SE**　10 ÷ √25 ＝ 2.0

② **臨界值**　σ 未知用 t(24) ＝ 2.064

③ **95% CI**　52 ± 2.064×2.0 ＝ [47.87, 56.13]



怎麼讀 95%：撒網捕魚（示意）



重抽很多次、每次撒一張網（區間）：約 95% 的網會網到 μ。不是『μ 有 95% 機率在這一張網裡』。


重點　CI 同時告訴你『估計多少』與『多不確定』；檢查某個值在不在區間內，就等於做了一次檢定。

細節 → 第 25-31 張

速覽 4 ｜ H_0 與 p 值：資料有多不像『沒差』

p ＝如果 H_0 為真，出現這麼極端（或更極端）結果的機率； p 小 → 資料不像只是巧合

例：新教學法 vs 傳統，t(58) = 2.73



若兩種教學法其實一樣，只有 0.8% 的機會碰巧差這麼多 → $p < .05$，拒絕 H_0（雙尾：兩邊尾巴都算）。

直覺：把檢定想成一場審判

H_0 ＝無罪推定
先假設『沒有效果』，舉證責任在研究者

資料＝證據
證據越不像『無罪也會出現』， p 越小

$p < .05$ ＝罪證確鑿
拒絕 H_0，接受『有差』

$p \geq .05$ ＝證據不足
判無罪 ≠ 證明清白：只能說『未達顯著』

重點 $p < \alpha$（常用 .05）就拒絕 H_0； p 不是『H_0 為真的機率』，也不是效果大小； $p \geq .05$ 只能說證據不足，不能說『沒差』。

細節 → 第 31-33 張

速覽 5 ｜檢定五步驟與兩種錯誤

每次檢定都走同五步；下結論時永遠可能犯兩種錯——α 是你設的上限， β 靠樣本數壓低

1. **寫 H_0 ／ H_1**　H_0： μ新＝μ舊； H_1： μ新 ≠ μ舊
2. **定 α 與單雙尾**　α = .05； 沒有事先理由就用雙尾
3. **算檢定統計量**　t ＝差 ÷ SE = 6 ÷ 2.20 = 2.73
4. **求 p**　t(58) = 2.73 → p = .008
5. **下結論**　p < α → 拒絕 H_0； 再報效應量與 CI

兩種錯誤

	判：有差（拒絕 H_0）	判：沒差（保留 H_0）
其實沒差	✗ Type I （α）偽陽性	✓ 正確
其實有差	✓ Power （1−β）	✗ Type II （β）偽陰性

哪個代價高，就盯哪一格

新藥審查盯 α （無效藥上市傷害大）； 篩檢盯 β （漏掉病人代價高）； 學術研究最常栽在 β： 樣本太小。

重點　α ＝沒效卻判有效（偽陽性，常設 .05 ）； β ＝有效卻沒抓到（偽陰性）； Power ＝ 1−β ，常要 .80 ，靠事前算樣本數（ 2.6 ）。

細節 → 第 34-35 張

速覽 6 ｜什麼決定 p：訊號 ÷ 雜訊

檢定統計量＝訊號（效應量、差多大） ÷ 雜訊（SE：變異 ÷ 樣本數）；訊號蓋過雜訊，p 才會小

同樣是『平均差 4 分』，雜訊不同，結論相反（t＝差 ÷ SE，SE＝SD × √(2÷n)）

雜訊大：SD＝20、每組 10 人



t＝4 ÷ 8.94 ≈ 0.45 → **p ≈ .66 不顯著**

雜訊小：SD＝5、每組 100 人



t＝4 ÷ 0.71 ≈ 5.7 → **p < .001 顯著**

效應量 ↑
差越大，訊號越強；多半由現象決定

變異 ↓
量表信度高、受試者同質、控制干擾

樣本數 ↑
SE 隨 √n 縮小；研究者最能控制的一鈕

重點 效應量↑、變異↓、樣本數↑，任一個都讓 p 變小；所以『不顯著』可能只是雜訊太大、人太少，把真效果蓋住了。

細節 → 第 36-40 張

速覽 7 ｜顯著之後：差多大？能說『造成』嗎？

p 只回答『有沒有』；『差多大』看效應量，『能不能說造成』看研究設計

各檢定的效應量與粗略基準

檢定	效應量	小	中	大
t 檢定	**Cohen's d**	0.2	0.5	0.8
ANOVA	**η^2**	.01	.06	.14
相關／迴歸	**r**	.10	.30	.50
卡方	**Cramér's V**	.10	.30	.50
邏輯斯	**勝算比 OR**	1.68	3.47	6.71

例：$t(58) = 2.73$、$p = .008 \rightarrow d = 0.70$，中到大。OR 基準依 Chen et al.（2010），基準率 1%。

顯著 ≠ 重要

人數夠多時，微小的差也會顯著（例：上萬人比較，血壓差 0.5 mmHg 也 $p < .001$，臨床上沒有意義，示意）。看效應量與 CI，再問實務上值不值得。

隨機分派的實驗

兩組只差在介入 → 可以說『造成』

觀察性研究

可能有干擾因素 → 只能說『有關』

重點 一定要報效應量（d、η^2、r、OR、V），它不隨樣本數變；只有隨機分派的實驗才能說『造成』，觀察性研究只能說『有關』。

細節 → 第 42-45 、 49-72 張

速覽 8 ｜選對檢定：先看 DV，再看 IV 與組數

DV 是數值還是類別？ IV 是類別（幾組、同一批人嗎）還是數值？三個問題就選得出來

IV ＼ DV	DV 數值	DV 類別	不符假設時
IV 類別：2 組	獨立 t（不同人） 配對 t（同一批人前後）	卡方 χ^2	Mann–Whitney U Wilcoxon 符號等級
IV 類別：⩾3 組	ANOVA（不同人） RM ANOVA（重複測量）	卡方 χ^2	Kruskal–Wallis Friedman
IV 數值	相關 r ／迴歸	邏輯斯迴歸	Spearman ρ

本份範例：新教學法 vs 傳統 → 獨立 t， $t(58) = 2.73$ ；冥想頻率 × 幸福感 → 相關， $r(28) = .88$ ；性別 × 是否購買 → 卡方， $\chi^2(1) = 5.36$

重點 選檢定只看資料型態與設計，不看結果；選好之後先檢查假設（常態、變異同質、獨立），不符就改用右欄的無母數或修正版。

細節 → 第 46、77-84 張

速覽 9 ｜走一遍八步，寫出完整結果，避開三個誤用

一個例子貫穿：新教學法能提高成績嗎？（每組 30 人）

1. **問題 → H_0 ／ H_1**
   μ新＝μ舊 vs μ新 ≠ μ舊
2. **判型態**
   IV 教學法（2 組、不同人）、 DV 成績
3. **選檢定**
   獨立樣本 t
4. **查假設**
   箱型圖、 Levene 、 Shapiro
5. **跑 JASP**
   勾效應量、 CI 、假設檢查
6. **讀四個數**
   t(58) = 2.73 、 p = .008 、 d = 0.70 、 CI [1.6, 10.4]
7. **下判斷**
   p < .05 拒絕 H_0； d 中到大
8. **寫結論**
   隨機分派 → 可說『造成』

一句完整的結果

t(58) = 2.73	p = .008	d = 0.70	95% CI [1.6, 10.4]
統計量＋ df	精確 p	效應量	精確度

三個常見誤用

1 **不顯著 ≠ 沒差** 只能說證據不足；要主張沒差用等效性檢定（2.6）

2 **多重檢定** 跑 20 次總有一次碰巧顯著 → 校正，如 Bonferroni α÷k

3 **p-hacking** 看結果才改分析、刪人、換變數 → 事先寫好分析計畫

重點 完整結果＝統計量＋ df 、精確 p 、效應量、 95% CI ； 結論的用詞由研究設計決定，不由 p 值決定。

A

推論的核心邏輯

From Sample to Population — The Logic

推論要做兩件事

承上 單元開場 → **本頁** 推論要做兩件事：估一個數、判斷有沒有差

① 推論單變量統計

- 問：母體的平均值大概在哪裡?
- 由「樣本平均」估計「母體平均」
- 受兩股力量影響：變異、樣本數
- 例：抽 100 位護理師，平均壓力 21 分 → 全國護理師平均大約在哪?
- **答案是一個範圍：標準誤、 95% 信賴區間（第 16-24 張）**

② 推論變量間的關係

- 問：母體中各組平均是否真的不同?
- 由「樣本中的關係」推論「母體的關係」
- 受三股力量影響：效應量、變異、樣本數
- 例： App 組比等候組低 3.8 分 → 母體裡 App 真的有效，還是抽樣巧合?
- **答案是顯著與否： t 、 F 、 χ^2 、 r 與 p 值（第 25 張起）**

重點 ①是『估一個數』（答案是區間），②是『判斷有沒有差』（答案是顯著與否）。先打好①的地基，再進入②——②才是論文結果章的主角。

三個關鍵量：中英對照與白話

第 14 張『推論要做兩件事』提到的變異、樣本數、效應量，到底指什麼?

變異 Variation

定義 每個資料點離平均有多遠的整體程度，常用標準差 SD。
用意 代表『雜訊』：雜訊越大，越難看出真正的差異。
例 兩班平均都 75 分；A 班 SD = 3、B 班 SD = 15，B 班亂得多。

樣本數 Sample Size

定義 實際測量的觀察單位數（人、病人、事件），記為 N 或 n。
用意 決定估計多精確：SE = SD ÷ √N，人越多越穩。
例 同樣 SD = 10：N = 25 時 SE = 2；N = 100 時 SE = 1。

效應量 Effect Size

定義 差異或關聯的實際大小，不受樣本數影響；如 Cohen's d = 平均差 ÷ SD。
用意 回答『差多少、值不值得在意』；p 值只回答『像不像巧合』。
例 平均差 6 分、SD 8.5 → d = 0.70（中到大）。

重點 估平均只看變異＋樣本數；比較／關聯再加上效應量。三者合成一條式：$t \approx d \times \sqrt{(n \div 2)}$（d = 平均差 ÷SD，各組 n 人）。例 d = 0.70、各 30 人 → t ≈ 2.71（第 52 張實算 2.73）。

抽樣分佈與標準誤：推論的地基

承上 三個關鍵量 → **本頁** 推論的地基：抽樣分佈與標準誤

中央極限定理（Central Limit Theorem）」與「樣本平均數的抽樣分布（Sampling Distribution of the Mean）」


抽樣分佈 反覆抽樣、每次算一個樣本平均，這些『平均』排成的分佈（右圖）。

中央極限定理 N 夠大時抽樣分佈近似常態；母體不太偏時約 30 即可，極度偏斜需更多（第 17 張）。

標準誤 SE 抽樣分佈的寬度（標準差）＝ SD ÷ √N，量『樣本平均通常離母體平均多遠』。

SD vs SE SD 描述『個人』之間的差異；SE 描述『平均』之間的差異—— N 越大 SE 越小，SD 不變。

例 SD ＝ 10、每次抽 25 人：個人分數常在平均 ±20 內（約 2 SD），樣本平均只在 ±4 內（約 2 SE，SE ＝ 2）。



標準差（SD） 衡量的是個別資料值相對於母體平均的分散程度（此處為 10）。
標準誤（SE） 衡量的是樣本平均值估計母體平均時的精確度與波動幅度（此處縮小為 2）。


教學重點 所有推論（t、CI、p）都建立在抽樣分佈上：SE 越小，樣本平均越可信，越能偵測真實差異。

中央極限定理：為什麼可以用常態

承上 抽樣分佈與 SE → **本頁** 為什麼抽樣分佈會是常態：中央極限定理


不管母體長什麼樣，樣本平均的分佈都會趨近常態，而且 n 越大越窄

母體（明顯右偏，平均 3）




→

樣本平均的分佈（每次抽 n = 5）



→

樣本平均的分佈（每次抽 n = 50）



每根柱＝『個人』的值落在該區間的比例：多數人很低、少數人很高 → 明顯右偏。

每次隨機抽 5 人、算 1 個平均，重複上萬次，把這些『平均』畫成圖：已往中間集中，但仍有點歪。


改成每次抽 50 人：平均的分佈幾乎是對稱的鐘形，而且更窄（都擠在 3 附近）。

教學重點 這就是「用樣本推論母體」的理論基礎： n 越大，樣本平均的分佈越窄也越常態。

標準誤直覺：為什麼『平均』比『單一資料』可信

承上 中央極限定理 → **本頁** 直覺：為什麼『平均』比『單一資料』可信

單一測量會抖 量一次身高，可能因姿勢、儀器而差 1–2 公分。
取平均會穩 量很多次再平均，高估與低估互相抵消，越接近真值。
SE 就是在量這個 SE = SD ÷ √N： N 越大，『樣本平均』的抖動越小。
實感例子 SD = 10 的母體：只抽 1 人，估計常差約 10；抽 100 人取平均，常差只剩約 1（右圖）。
注意 人數變 4 倍，誤差才減半——所以 25 → 100 人很有感，100 → 400 人效益就小了（第 20 張）。



教學重點 『大樣本較可信』的直覺不是資料變乖了，而是『平均』這個估計本身變穩了——這正是所有推論的地基。

兩條規則，看圖就懂


左圖只改母體 SD、右圖只改每次抽幾人 N；每個點＝抽一次樣本算出的平均（各抽 12 次）

規則 1：變異越大，估計越飄

固定每次抽 N = 25 人，只改母體 SD

SD = 2（小變異）
SE = 2÷√25 = 0.4
平均多在 4.2–5.8

SD = 10（大變異）
SE = 10÷√25 = 2
平均多在 1–9




灰色山＝個人分數的分佈： SD 大，山就攤得很開

規則 2：樣本越大，估計越穩

固定母體 SD = 5，只改每次抽幾人 N

N = 100（大樣本）
SE = 5÷√100 = 0.5
平均多在 4–6

N = 4（小樣本）
SE = 5÷√4 = 2.5
平均多在 0–10



兩列的灰色山一樣（SD 沒變），差別只在每次抽幾人

重點 兩張圖點的散布都由 SE = SD÷√N 決定：左圖因 SD 變大而散開，右圖因 N 變小而散開。 SD 常受母體與測量限制； N 是研究者最能主動控制的旋鈕。

標準誤完整範例： N 如何讓估計變穩

母體標準差 SD = 10

樣本數 N	標準誤 SE = SD ÷ √N	95% 誤差範圍 ≈ ±1.96×SE
N = 25	10 ÷ √25 = 10 ÷ 5 = 2.0	±3.9
N = 100	10 ÷ √100 = 10 ÷ 10 = 1.0	±2.0
N = 400	10 ÷ √400 = 10 ÷ 20 = 0.5	±1.0

怎麼讀 SE ＝樣本平均每次抽樣會晃多少；誤差範圍 ±1.96×SE ＝ 95% 的樣本平均會落在母體平均的這個距離內（1.96 從哪來見第 22 張）。
看趨勢 N 從 25 → 100 （×4），SE 從 2.0 → 1.0 （減半）； N 再 ×4 到 400， SE 才再減半為 0.5—— 加人的效益越來越小。

教學重點 SE 隨 √ N 縮小——要把精度加倍（SE 減半），樣本數要變 4 倍。這就是『大樣本較穩』的數學根據。

信賴區間：不只給一個點，還給一個範圍

承上 SE 怎麼算 → **本頁** 把 SE 變成一個範圍：信賴區間


公式 95% CI ＝樣本平均 ± 臨界值 × SE。大樣本臨界值≈ 1.96 （為什麼是 1.96 見下一張）；小樣本、母體 σ 未知時改用 t 值（第 23 張）。

正確解讀 若用同樣方法重複抽樣很多次，約 95% 的區間會罩住真正的母體平均。

常見誤解 不是『母體平均有 95% 機率落在此區間』——母體平均是固定的，會變的是區間。

與檢定的關係 虛無值（如 H_0： $\mu = 50$ ）落在 95% CI 之內 ↔ 雙尾 $p \geq .05$ 不顯著；落在之外 ↔ $p < .05$ 顯著。

例（第 23 張） M ＝ 52 、 SE ＝ 2.0 、 N ＝ 25 → 95% CI [47.87, 56.13]： 母體平均很可能在 48 到 56 之間（下圖）。




落在 95% CI 內 ☒ 屬於合理的隨機波動範圍 ☒ 不顯著（接受 / 不拒絕 H0 ）

落在 95% CI 外 ☒ 極不可能純由抽樣誤差造成 ☒ 顯著（拒絕 H0 ）

教學重點 CI 比單一 p 值資訊更多：同時給你『效應方向、大小與精確度』——期刊越來越要求報 CI 。

1.96 是怎麼來的?

承上 CI 公式裡的 1.96 → **本頁** 1.96 是怎麼來的



怎麼讀這張圖

① 曲線下總面積＝ 100%，橫軸是離中心幾個 SE。
② 從中間往兩邊擴，圍到 95% 面積時停下——停的位置就是 ±1.96。
③ 所以樣本平均有 95% 機會落在 μ ± 1.96 SE 內；反過來，『樣本平均 ± 1.96 SE』就有 95% 機會罩住 μ＝95% CI。

信心水準	兩尾各切	臨界值 z
90%	5%	±1.645
95%	**2.5%**	**±1.96**
99%	0.5%	±2.58

重點 要涵蓋『中間 95%』，就要切掉兩尾各 2.5%—— 這兩個切點的 z 分數正好 ≈ ±1.96。要 99% 則用 ±2.58。


信賴區間完整範例＋判讀

樣本：M = 52 、 SD = 10 、 N = 25

1 **算 SE**　10 ÷ √25 ＝ 2.0

2 **算 95% CI**　σ 未知 → 用 t(24) = 2.064 （非 1.96）： 52 ± 2.064 × 2.0 ＝ 52 ± 4.13

3 **解讀**　長期重複抽樣，約 95% 的區間會涵蓋母體平均（不是『μ 有 95% 機率在裡面』）




μ = 47 在區間外
→ 拒絕 H₀

CI 看兩件事：中心（估計多少）＋寬度（多不確定）； N 越大、 SD 越小 → 越窄

教學重點　CI 寬度＝不確定性： N 越大、變異越小，區間越窄、估計越精確。窄而明確的 CI 比『只報 p<.05 』更有說服力。

信賴區間直覺：撒網捕魚

承上 會算 CI → **本頁** 直覺：95% 指的是『網』，不是『魚』



20 次抽樣 → 20 張網；紅色那張沒罩住魚（示意）

魚是固定的
母體平均 μ 就在某個位置，不會動

網會動
每次抽樣＝撒一次網（一個 CI），位置隨樣本而變

95% 的意思
這樣撒 100 次網，約 95 次罩住魚；20 年約 19 次


常見誤解
不是『魚有 95% 機率在這張網裡』——魚固定、網才隨機

教學重點 所以看到一個 95% CI，別說『μ 有 95% 機率落在此區間』；而是『這個程序長期有 95% 的涵蓋率』。

變異大小如何影響「能否推論」


承上 『估一個數』講完 → **本頁** 第二件事『判斷有沒有差』：先看變異的影響

變異小 → 差異清楚、可推論



兩座山幾乎不重疊 → 差異看得清楚，容易顯著

變異大 → 差異被雜訊蓋住



兩座山大量重疊 → 差異被雜訊蓋住，難以顯著

重點 兩邊「平均差」一樣，但左邊變異小、兩座山不重疊 → 容易顯著；右邊變異大、兩座山重疊 → 難以顯著。

為何「反駁 H_0」而非「證明 H_1」？

承上 差異可能被雜訊蓋住 → **本頁** 先假設『沒效果』（H_0），再看資料有多不像——為何反駁 H_0 而非證明 H_1

- **H_0 明確（$\mu_1 = \mu_2$）→ 可建立機率分佈；H_1 模糊（$\mu_1 \neq \mu_2$）→ 無法建唯一模型**
- **p 值 = 「當 H_0 為真時，觀察到這樣（或更極端）資料的機率」**
- p 值不是「H_1 為真的機率」，而是反駁 H_0 的證據強度
- 可證偽性（Popper）：科學假說不能被證明為真，只能被證明為假
- **若 $p < \alpha$（常用 0.05）→ 拒絕 H_0，結果具統計顯著性**

白話：假設檢定是『機率版的反證法』

數學反證法 假設命題為假 → 推出『不可能』的矛盾 → 命題必為真；結論 100% 確定。

假設檢定 假設 H_0（沒效果）為真 → 算出看到這種資料的機率 p → p 很小只代表『很不像』，不是『不可能』
→ 推翻 H_0，但這套程序在 H_0 為真時仍有 α（例如 5%）的機會誤判，所以不說『證明』。

為何不直接證 H_1 『有效』可以是差 1 分、2 分、10 分……沒有單一數字可算機率；『沒效』只有一種（差＝0），才算得出 p。

H₀ 與 H₁ 怎麼寫：六個生活例子

H₀ ＝沒差、沒關係（有一個確切數字，才算得出 p ）； H₁ ＝你真正想主張的有差、有關係


研究問題	H₀ 虛無假設（先假設沒效）	H₁ 對立假設（想證明的）	會用的檢定
新教學法能提高成績嗎?	新、舊教學法平均成績相同（μ 新＝ μ 舊）	平均成績不同（μ 新 ≠ μ 舊）	獨立樣本 t
減重課程前後體重有變嗎?	同一批人前後平均體重相同（平均差＝ 0 ）	前後平均體重不同（平均差 ≠ 0 ）	配對 t
三種運動處方降血壓一樣嗎?	三組平均下降都相同（ μA ＝ μB ＝ μC ）	至少有一組不同	單因子 ANOVA
性別和是否打流感疫苗有關嗎?	性別與接種無關（男女接種率相同）	有關（男女接種率不同）	卡方檢定
睡越久，隔天越專心嗎?	睡眠時數與專注力無關（母體相關 ρ ＝ 0 ）	有關（ ρ ≠ 0 ）	相關 r
年紀越大越少網購嗎?	年齡與是否網購無關（ OR ＝ 1 ）	有關（ OR ≠ 1 ）	邏輯斯迴歸

口訣　H₀ 一律寫『相等、＝ 0 、無關』； H₁ 寫『不同、≠ 0 、有關』。結論只說『拒絕 H₀ 』或『未能拒絕 H₀ 』——不說『接受 H₀ 』，也不說『證明 H₁ 』。

p 值在分佈上長什麼樣

承上 知道 H_0、H_1 怎麼寫 → **本頁** p 值在分佈上長什麼樣：H_0 為真時，結果有多極端

p 值＝在 H0（虛無假設）為真的前提下，看到『這麼極端或更極端』結果的機率



教學重點 p 值不是「H0 為真的機率」，而是「若 H0 為真，看到這麼極端結果的機率」——方向不能反。

p 值直覺：把假設檢定想成一場審判

承上 p 值的定義 → **本頁** 用審判比喻：無罪推定＝ H_0

法庭	假設檢定
無罪推定 先假設被告無罪	**H_0** 先假設『沒有效果』
證據 證據越不像無罪，越傾向定罪	**你的資料** 資料越不像『沒效果』該有的樣子，越傾向拒絕 H_0
證據有多罕見 若真無罪，會出現這麼不利的證據嗎?	**p 值** 若 H_0 為真，看到這麼極端資料的機率
判無罪 ≠ 清白 只是證據不足	**不顯著 ≠ 沒效果** 只是證據不足以拒絕 H_0

例 新教學法：若真的沒效，兩班差到 6 分的機率只有 0.8%（p = .008）→ 太不像巧合 → 推翻『沒效』(0.8% 遠低於 5%（$p < .05$），在現實上極不可能只是巧合）

教學重點 α = .05 就像『定罪門檻』：若被告其實無罪，仍有 5% 機率被定罪（Type I）。門檻訂多嚴是價值取捨，非真理。

為什麼門檻是 0.05？

承上 p 值與審判比喻 → 本頁 判斷顯著的門檻 α 為什麼是 .05

門檻（α）＝「把其實無效的結果，誤判為顯著」的可接受機率。

- α = 0.05 → 你接受「5% 誤判為顯著」的風險
- α = 0.01 → 更嚴格，誤判機率降到 1%（需要更強證據）
- **多數科學家認為 5% 的誤判風險「夠好」，因此以 0.05 為慣例門檻**
- 門檻不是真理，而是一個「群體共識的決策線」——不同領域可能不同
- 例：20 種其實無效的藥各做一次試驗（α = .05），平均約有 1 種會『顯著』——那 1 種就是偽陽性。
- 一次做很多檢定時（如上萬個基因），門檻要再調嚴，見第 80 張多重檢定。

單尾 vs 雙尾：方向要不要事先決定

承上 門檻 .05 → **本頁** 這 5% 放一邊還是兩邊：單尾 vs 雙尾


標準化分數（Z-score，又稱 Z 統計量）」，它是常態分布下衡量「樣本結果距離虛無假說中心點有幾個標準誤（SE）」的指標

臨界值門檻不同（以 $\alpha = .05$ 為例）

單尾檢定：把全部 5% 的拒絕域集中在右側單邊，臨界值為 $z = 1.645$。

雙尾檢定：把 5% 拆成左右各 2.5%，臨界值提高為 $z = \pm 1.96$。

同一個結果 z = 1.80：單尾顯著、雙尾不顯著



雙尾（預設）：有沒有『不同』？

例：新藥 vs 安慰劑，H_1：藥效 ≠ 安慰劑

藥反而更差也抓得到

z = 1.80 → p = .072，不顯著

單尾：是不是『特別好』？

例：H_1：藥效 > 安慰劑，只看一個方向

藥若更差，你不會發現它有害

z = 1.80 → p = .036，顯著

重點 口訣：沒有事前的強方向假設 → 一律用雙尾；看到資料才改單尾＝作弊（會膨脹偽陽性）。

兩種錯誤與檢定力：推論一定會冒的風險

這張表在 2.3 第 29 張出現過；這裡用它來讀懂：顯著、不顯著，各自可能錯在哪

真實 ＼ 你的判定	拒絕 H_0（宣稱有差異）	未拒絕 H_0（證據不足，非證明無差異）
H_0 為真（其實無差異）	✗ Type I （α，偽陽性）	✓ 正確（1−α）
H_0 為假（其實有差異）	✓ 檢定力 Power （1−β）	✗ Type II （β，偽陰性）

Type I 例 藥其實無效，你卻說有效 → 病人吃沒用的藥

Type II 例 藥其實有效，你卻說沒差 → 好藥被放棄

怎麼用： ① 檢定前先定 α （第一列錯誤上限）② 規劃樣本數讓 Power ≥ .80 （2.6）③ 讀結果：顯著仍可能是 Type I，不顯著可能是 Type II → 看效應量與 CI

教學重點 α 管『偽陽性』、β 管『偽陰性』、Power = 1−β。要 α 更嚴（.01）就得付出更高 β，或加大樣本補回檢定力。

假設檢定的五個步驟

承上 p、α、單雙尾、兩種錯誤都學過 → **本頁** 串成固定的五個步驟

① 立假設	② 定 α	③ 算統計量	④ 求 p 值	⑤ 下決策
寫 H_0 ／ H_1 決定單／雙尾	願承擔的 偽陽性風險	依資料型態 選 t ／ F ／ χ^2 ／ r	H_0 為真時看到 這麼極端的機率	$p < \alpha \rightarrow$ 拒絕 H_0 ＋報效應量與 CI

實例：新 vs 舊教學法（第 52 張，自學）

H_0：兩班平均相同 雙尾	**$\alpha = .05$**	**$t(58) = 2.73$**	**$p = .008$**	**$.008 < .05 \rightarrow$ 拒絕 $d = 0.70$、CI [1.6, 10.4]**

教學重點 第 ⑤ 步不是終點——『拒絕 H_0』只說『有差異』，還要用效應量與 CI 說明『差多少、多確定』。

推論關係的三股力量：訊號 ÷ 雜訊

承上 五步驟 → **本頁** 什麼決定 p：效應量、變異、樣本數三股力量

比喻 p 值像『訊號 vs 雜訊』：訊號＝效應量（差多大）；雜訊＝變異 ÷ 樣本（估得多不準）。訊號蓋過雜訊 → p 小。

同樣是『平均差 4 分』 若 SD=20、每組 n=10（雜訊大）→ t≈0.45，差被淹沒 → p≈.66 不顯著。

若 SD=5、每組 n=100（雜訊小）→ t≈5.7，同樣 4 分清楚浮現 → p<.001 顯著。

三個旋鈕 效應量↑、變異↓、樣本數↑，任一個都讓 p 變小；研究設計能主動控制的是後兩個。

算給你看 t＝平均差 ÷ SE，兩組各 n 人時 SE = SD × √(2÷n)；平均差都是 4 分


雜訊大：SD = 20、各 10 人
SE = 20 × √0.2 ≈ 8.94
t = 4 ÷ 8.94 ≈ 0.45 → p ≈ .66 不顯著

雜訊小：SD = 5、各 100 人
SE = 5 × √0.02 ≈ 0.71
t = 4 ÷ 0.71 ≈ 5.7 → p < .001 顯著

重點 所以『不顯著』不一定沒效果——可能是變異太大或樣本太小，把真效果蓋住了。

從三因素到 p 值的判斷流程

承上 三股力量 → **本頁** 從三因素一路到判斷顯著的流程



例（第 52 張，自學） 新 vs 舊教學法：平均差 6 分、d = 0.70（效應量）；合併 SD 8.51（變異）；每組 30 人（樣本數）→ t(58) = 2.73，p = .008，顯著。
對照 同樣 6 分差距、同樣 SD，若每組只收 8 人：t 約 1.41、p 約 .18 → 不顯著。差的不是效果，是樣本數。

重點 效應量、變異性、樣本數共同決定 p 值：p < .05 → 資料與 H₀ 不相容，拒絕 H₀；p ≥ .05 → 證據不足以拒絕 H₀，不等於沒有效果。

統計顯著 ≠ 實務重要

承上 會判斷顯著了 → **本頁** 但顯著 ≠ 重要

p 只回答
『和 H_0 相不相容』，N 大時小差異也顯著

效應量回答
差多少、關聯多強（d、η^2、r、OR）

CI 回答
多確定；貼著 0 就算顯著也要謹慎

最後問
這個效果在你的領域值不值得在意?

效果	$p < .05$	$p \geq .05$
大	**顯著＋效果大** 研究 B： N = 40、d = 0.90 **值得在意**	**不顯著＋效果大** 復健 40 公尺、只收 8 人 **可能只是樣本太小**
小	**顯著＋效果小** 研究 A： N = 10,000、d = 0.05 **大樣本陷阱**	**不顯著＋效果小** 可能真的沒什麼

教學重點 結果一律『三件一起報』：檢定統計量＋精確 p 值＋效應量（與 CI）——只報 p 是不完整的。

顯著 ≠ 重要：兩個生活化例子

承上 顯著 ≠ 重要 → **本頁** 兩個生活化例子

① 顯著但不重要

App 讓每日步數平均多 12 步，n = 50,000




CI 很窄、離 0 不遠，但『12 步』對健康幾乎沒差

區間為示意

② 重要但未達顯著

新復健讓行走距離多 40 公尺，只收 8 人




CI 很寬、跨過 0：效果可能真實，只是樣本太小沒測出

區間為示意

重點 『有沒有差』(p) 與『差多少、值不值得』（效應量）是兩個不同問題，兩個都要回答。

效應量 vs p 值：兩個研究看懂差別

承上 兩個生活例 → **本頁** 兩個研究並排：效應量 vs p 值



關鍵 **p 會被 N 放大；d 不會。** d 才是跨研究可比較的『效果大小』（0.2 小、0.5 中、0.8 大）。

Cohen's d 是從做完實驗、蒐集到的兩組真實數據中直接計算出來的。它完全不是憑空想像的數值，而是用實驗測量到的「兩組平均數差距」除以「標準差」算出來

重點 只報 p、不報 d 與 CI，審稿人通常會要求補——因為讀者無法判斷 A 與 B 的差別。

Effect Sizes at a Glance

各檢定的效應量一覽與基準

承上 一定要報效應量 → **本頁** 各檢定的效應量一覽與基準

檢定	效應量	小 / 中 / 大（粗略基準）
t 檢定	Cohen's d	0.2 / 0.5 / 0.8
ANOVA	η^2（或 partial η^2）	.01 / .06 / .14
相關 / 迴歸	r（r^2 為解釋變異）	.10 / .30 / .50
邏輯斯迴歸	勝算比 OR	≈1.68 / 3.47 / 6.71（Chen et al., 2010；基準率 1%）
卡方	Cramér's V	.10 / .30 / .50（df=1）

Cohen's d 尺規：效應量的實務意義



教學重點 效應量與『樣本數無關』，所以能跨研究比較、放進統合分析（meta-analysis）；p 值則會隨 N 變。

顯著代表什麼？取決於研究設計

承上 效應量回答『差多少』 → **本頁** 能不能說『造成』：取決於研究設計

實驗 Experiment

研究者『主動操弄』 IV，並『隨機分派』
受試者到各組。

例：把 60 位病人隨機分到
App 組／等候組。

→ 兩組事前條件平均相同，若有差，
可歸因於介入 → 可談因果。

非實驗 Non-experiment （觀察型）

研究者『只觀察、不操弄』，
分組是既存的。

例：比較『本來就有用 App』
vs 『沒用』的人的壓力。

→ 兩群人可能本來就不同（年齡 / 動機），
差異或來自第三變項 → 只能談關聯。

重點 同樣 $p<.05$，實驗能說『造成』（前提：隨機分派成功、流失不偏），非實驗只能說『有關聯』——差別在研究設計，不在統計。


B

選對統計檢定

How to Apply Inferential Statistics

統計檢定決策樹

承上 B 段開始 → 本頁 依 DV、IV 型態選對檢定：決策樹



重點 口訣：先定 DV 型態，再看 IV 型態與組數，一路往下即可決定：相關、t 檢定（2 組，即 ANOVA 的特例）、ANOVA、RM ANOVA、卡方或邏輯斯迴歸。

t / F / χ² / r 到底在算什麼?

第③步『算檢定統計量』——各在算什麼? IV ／ DV 要是文字還是數字? 組間、組內、混合各用哪一版?

統計量	在算什麼	IV 型態	DV 型態	組間（不同人分組比）	組內（同一批人重複測）	混合（分組 × 重複測）
t	平均差 ÷ 標準誤	類別・剛好 2 組 （文字：新法／舊法）	數值 （數字：成績）	獨立樣本 t 例：新 vs 舊教學法	配對 t 例：同一批人減重前、後	兩組各算『後−前』 再做獨立 t （F = t²）
F	組間變異 ÷ 組內變異	類別・2 組以上 （文字：A ／ B ／ C 法）	數值 （數字：血壓）	單因子 ANOVA 例：A、B、C 三種教學法	RM ANOVA 例：同一批人前、中、後測	混合 ANOVA 例：治療／控制 × 前／後
χ²	Σ(觀察−期望)²÷ 期望	類別 （文字：男／女）	類別 （文字：買／不買）	卡方獨立性檢定 例：性別 × 是否購買	McNemar （配對版 χ²） 例：同一批人介入前後有無運動	—（超出本單元，見 8.2）
r	兩個數值一起變動的程度（−1 ～ +1）	數值 （數字：睡眠時數）	數值 （數字：專注力）	不分組：同一群人身上各量兩個變數，看是否一起高、一起低		

文字還是數字? 類別＝用文字分組（男／女、A／B／C 組），就算登錄成 1、2 也還是類別；數值＝能加減、算平均的量（分數、血壓、時數）。
三種設計 組間＝不同的人分在不同組；組內＝同一批人測好幾次；混合＝既分組又重複測。數值 IV × 類別 DV 則用邏輯斯迴歸（第 67 張，自學）。

重點 四者都是『訊號 ÷ 雜訊』家族：算出統計量後，再對照它的分佈查 p 值，判斷是否顯著。

檢定的基本假設：先檢查再解讀

承上 選好檢定 → **本頁** 跑之前先檢查它的假設

檢定	主要假設	違反時怎麼辦
t / ANOVA	常態性、變異數同質、獨立	Welch 校正；或改無母數
相關 / 迴歸	線性、常態、等分散 (homoscedasticity)	轉換變數；或用 Spearman
卡方	期望次數 <5 的格 ≤ 20% 且無 <1 、觀察獨立	合併類別；或 Fisher 精確檢定

教學重點 假設不是形式：變異數嚴重不同質或小樣本非常態時，硬跑 t/ANOVA 的 p 值不可信——先畫圖（直方圖、箱型圖），再跑 Levene（同質）、Shapiro（常態）。

無母數替代：資料不符假設時的備案

承上 違反假設 → **本頁** 無母數替代方案一覽

母數檢定	無母數替代	用於
獨立樣本 t	Mann–Whitney U	兩組、非常態或序位資料
配對 t	Wilcoxon signed-rank	前後、非常態
單因子 ANOVA	Kruskal–Wallis	≥3 組、非常態
Pearson r	Spearman ρ	序位或非線性單調關係

教學重點 無母數檢定用『排序』而非原始值，對離群值與偏態較穩健；代價是檢定力略低、且比較的是中位數 / 分佈位置。

八步實作：從研究問題到一句結論

承上 選檢定、檢查假設 → **本頁** 用一個例子把整個單元走一遍

1. **研究問題 → H_0 ／ H_1** 新教學法能提高成績嗎？ H_0：μ新＝μ舊； H_1：μ新 ≠ μ舊（雙尾，α = .05）
2. **判 IV、DV 型態** IV＝教學法（類別、2 組、不同的人）；DV＝成績（數值）
3. **選檢定** 查決策樹（第 42 張）→獨立樣本 t 檢定
4. **檢查假設** 先畫箱型圖；Levene 看同質、Shapiro 看常態；不符改 Welch t 或 Mann–Whitney（第 45 張）
5. **用 JASP 跑** T-Tests → Independent Samples T-Test；勾 Effect size、Confidence interval、Assumption checks（輸出怎麼讀見第 73 張，自學）
6. **讀四個數** t(58) = 2.73； p = .008； d = 0.70；平均差 6 分， 95% CI [1.6, 10.4]
7. **下判斷** p < .05 → 拒絕 H_0； d = 0.70 屬中到大； CI 不含 0，但下界只有 1.6 分，精確度有限
8. **寫一句結論** 隨機分派 → 可說『造成』，非隨機只能說『有關』（第 40 張）； APA 句型見第 77 張（自學）

範例數字同第 33 張五步驟與第 52 張完整範例（每組 30 人、合併 SD 8.51）。

教學重點 每次做推論都走這八步；第 ⑥ 步四個數一個都不能少——統計量（含 df）、精確 p、效應量、 CI。第 ⑧ 步的用詞由研究設計決定，不由 p 值決定。

自學導覽：第 48 張以後怎麼讀

承上 八步實作走完 → **本頁** 課堂到此；第 48 張以後的自學地圖

① 先讀這四張

- 獨立 t 完整範例（第 52 張）
- 讀統計軟體輸出（第 73 張）
- APA 報告格式總表（第 77 張）
- 完整案例：正念 App （第 74–76 張）

② 依決策樹查你的檢定

- 相關 r：第 49–50 張
- 獨立 t、配對 t：第 52–55 張
- ANOVA ＋事後比較：第 56–60 張
- RM ／混合 ANOVA：第 61–66 張
- 邏輯斯迴歸：第 67–69 張
- 卡方：第 70–72 張

③ 避免 p 值誤用（必讀）

- 不顯著 ≠ 證明沒差異：第 79 張
- 多重檢定：第 80 張
- p-hacking：第 81–82 張
- 超越 p 值：第 83–84 張
- 結果章檢查清單：第 85 張
- 重點回顧：第 86 張

教學重點 每讀完一種檢定，就用第 46 張的八步自問一次。作業（第 88 張起）會用到全部內容，含 APA 報告與避免誤用。


C

六種推論檢定

Six Inferential Tests

① 相關的推論（數值 IV × 數值 DV）

承上 B 段：選檢定 → 本頁 C 段：六種檢定逐一走過，先從相關開始



- **r = 0.88：強正相關（r 介於 −1 ~ 1）**
- 勾選 report significance 取得 p 值
- $p < 0.001$ → 顯著，可拒絕 H_0
- r(28)：括號內為自由度（= N−2）
- 資料：30 人每週冥想次數（IV）與幸福感分數（DV），圖上每一點＝一個人

APA 報告：r(28) = .88, p < .001

① 相關推論完整範例： r 顯著嗎?


資料：同前頁，冥想頻率 vs 幸福感，r = .88 、 N = 30

1 **自由度** df = N − 2 = 28

2 **檢定統計量** t = r√df ÷ √(1−r²) = 4.66 ÷ .475 ≈ 9.8

3 **p 值** t(28) = 9.8 → p < .001 → 拒絕 H_0（母體相關 ≠ 0）

A **APA** r(28) = .88, p < .001, 95% CI [.76, .94]



CI 不含 0 → 顯著；離 0 很遠 → 強相關

r^2 = .77：幸福感的變異約 77% 與冥想頻率共變



仍是關聯、不是因果

教學重點 相關『顯著』只表示母體相關不為 0；仍是關聯非因果，且要看 r 的大小（效應量）而非只看 p。

② ③ 平均差異的推論： ANOVA / RM ANOVA

承上 相關講完 → **本頁** 類別 IV × 數值 DV： 比較平均（t 、 ANOVA ）

ANOVA （組間）

- 比較兩組（或多組）平均是否有差異
- 效應量： η^2 ／ partial η^2 （亦可報平均差）
- F(1, 58)： 括號內為自由度
- 例：治療組 vs 控制組（各 30 人）比後測疾病分數 → 不同的人分組比

RM ANOVA （組內）


- 純組內設計無分組因子，比「治療前 vs 後」
- 同一群人重複測量 → 控制個體差異
- 所需樣本數比組間設計少
- 例：同一批病人比治療前 vs 後 → 每人跟自己比
- **兩者合在一起（分組 × 前後）＝混合設計，見第 62 張**

APA 報告： $F(1, 58) = 37.91, p < .001, \eta^2 = .40$ （後測 M ： 治療 4.63 vs 控制 7.65 ）

獨立樣本 t 檢定完整範例（兩組）

新教學法 M=78, SD=8, n=30　　vs　　傳統 M=72, SD=9, n=30

1. **假設**　H_0：兩組母體平均相等；H_1：不相等（雙尾）
2. **平均差**　78 − 72 ＝ 6 分
3. **合併 SD 與 SE**　pooled SD ≈ 8.51；SE ＝ 8.51 × √(1/30 + 1/30) ≈ 2.20
4. **t 與 df**　t ＝ 6 ÷ 2.20 ≈ 2.73；df ＝ 58 → p ≈ .008
5. **效應量**　d ＝ 6 ÷ 8.51 ≈ 0.70（中大）




APA　**t(58) = 2.73, p = .008, d = 0.70, 95% CI [1.6, 10.4]**

教學重點　兩組比較用獨立 t；2 組時 $F = t^2$（ANOVA 與 t 一致）。務必同時報 d 與 CI，別只報 p。

獨立 t：兩組分佈與『差 ÷ 雜訊』

承上 獨立 t 的算法 → **本頁** 看圖：兩組分佈與『差 ÷ 雜訊』



重點 t = 平均差 ÷ 標準誤 (SE)。兩條鐘形曲線分越開、越瘦（變異小），重疊越少 → t 越大、越可能顯著。

配對樣本 t 檢定完整範例（同一批人前後）

減重前後（同 25 人）：平均差 $\bar{d}$ = 3 kg 、差的 SD = 4 、 n = 25

1 **假設** H_0：μ差 = 0；H_1：μ差 ≠ 0

2 **差的 SE** 4 ÷ √25 = 0.80

3 **t 與 df** t = 3 ÷ 0.80 = 3.75；df = 24 → p ≈ .001

4 **效應量** dz = 3 ÷ 4 = 0.75（中大）

A **APA** t(24) = 3.75, p = .001, dz = 0.75



t = 訊號 ÷ 雜訊 = **3.75**


為什麼配對更有力?
每個人當自己的對照，消掉『本來就有胖有瘦』的個體差異 → 雜訊變小 → 同樣人數 t 更大（回想單元 1 的受試者內設計）

教學重點 配對 t 用『每個人的前後差』——去除個體差異，所以比獨立設計省樣本、檢定力高（回想單元 1 的受試者內）。

配對 t：為什麼用『每人前後差』？

承上 配對 t 的算法 → **本頁** 白話：為什麼用每人的前後差

同一個人量前、後兩次（示意）



關鍵動作
先把每人『後 − 前』算成差值，再檢定差的平均是否為 0

為何這樣做
消掉個體本來的高低差 → 雜訊變小 → 檢定力高、更省人

效應量
dz ＝平均差 ÷ 差的 SD （本例 3 ÷ 4 ＝ 0.75 ）

重點 判斷要不要用配對：問『這兩筆數字是不是同一受試者（或配對）產生的？』是 → 配對 t。

單因子 ANOVA 完整範例（≥ 3 組）

三種教學法（各 n=10 ）成績平均：A=70 、 B=75 、 C=82


1 **假設** H_0：三組母體平均都相等； H_1：至少一組不同

2 **F 的邏輯** 組間變異 ÷ 組內變異

3 **結果** $F(2, 27) = 8.00, p = .002$ → 拒絕 H_0

4 **效應量** η^2 = SS 組間 ÷ SS 總 ≈ .37 （大）

A **APA** $F(2, 27) = 8.00, p = .002, \eta^2 = .37$




η^2：分數的變異有 37% 可用『哪一組』解釋；但還不知道是哪兩組不同 → 事後比較

教學重點 ANOVA 只說『至少有一組不同』，沒說『哪兩組不同』——要靠事後比較（下一頁）。

ANOVA：組間 vs 組內，看圖秒懂

承上 ANOVA 的算法 → **本頁** 看圖：組間 vs 組內




重點 粗橫線是各組平均、散點是組內個別值。 F ＝ 平均線分多開（組間） ÷ 點的散佈（組內）。

ANOVA 的 F 在比什麼?

承上 看過圖 → **本頁** 白話：F 在比什麼

組內每人上下飄很大



平均差被雜訊蓋住 → F 小

組內很集中



平均差一眼就看出 → F 大


F ＝組間變異 ÷ 組內變異； F 大 → p 小 → 至少一組不一樣（點為示意，兩圖的組平均相同）

重點 ANOVA 只回答『有沒有人不一樣』；要知道『誰跟誰不一樣』，看下一頁的事後比較。

ANOVA 事後比較：到底哪幾組不同?

承上 F 顯著只說『有人不同』 → **本頁** 事後比較：到底哪幾組不同

Tukey 兩兩比較（本例）



為何需要?
ANOVA 顯著只說『有人不同』；要知道誰跟誰不同，得兩兩比較

為何不直接多跑幾次 t ?
3 組要比 3 次，偽陽性會累積（下一頁）；事後檢定會校正


常用方法
Tukey HSD： 各組人數相近時最常用
Bonferroni： 最保守
Games-Howell： 變異數不同質

教學重點 先看 ANOVA 是否顯著（總體），再做事後比較（局部）；報告要同時給整體 F 與兩兩差異＋效應量。

事後比較：為何不能直接多跑幾次 t?

承上 事後比較的方法 → **本頁** 白話：為何不能直接多跑幾次 t

每次 α = .05，比越多次，『至少一次誤判』越可能



累積機率＝ 1 − 0.95^ 次數（假設各次獨立）

解法 事後檢定校正門檻，把整體偽陽性壓回 5%


怎麼選?

各組人數相近	**Tukey HSD**
要最保守	**Bonferroni**
變異數不同質	**Games-Howell**

重點 流程固定：先看整體 ANOVA 是否顯著，再做事後兩兩比較，並各自報效應量。

RM ANOVA （組內）：先看敘述結果，再寫假設

承上 組間比較講完 → **本頁** 組內：同一批人前後，先看敘述結果



H_0 虛無假設

前後（母體）平均相等，
沒有差異。


H_1 對立假設

前後（母體）平均不相等，
有差異。

重點 H_0：前後（或兩組）母體平均相等； H_1：不相等。箱型圖：箱＝中間 50% 的人、中線＝中位數； After 整體往下移＝治療後分數降低，是否顯著要靠 RM ANOVA 判斷。

④ 混合設計的推論（RM ANOVA）

承上 組內前後 → **本頁** 再加控制組：混合設計看交互作用



- 問題：這個型態是巧合，還是能推論到母體?
- 控制組前後幾乎相同；治療組後測明顯下降
- **檢定「時間 × 組別」交互作用**
- **交互作用顯著 → 治療確有作用**

APA 報告：時間 × 組別 交互作用 $F(1, 58) = 10.20, p = .002$

④ 混合設計交互作用完整範例（RM ANOVA）

疾病分數：治療組 前 8.10→ 後 4.63 （降 3.47 ）；控制組 前 8.59→ 後 7.65 （降 0.94 ）

1. **問的是** 『時間 × 組別』交互作用：治療組變化量是否大於控制組
2. **為何看交互作用** 單看治療組下降可能是時間／安慰劑；要比兩組變化的差
3. **結果** $F(1, 58) = 10.20$, $p = .002$ → 治療確有作用
4. **效應量** partial $\eta^2 = 48.197 \div (48.197 + 274.103) = .15$ （大）

比的是『降了多少』的差




APA 時間 × 組別交互作用

$F(1, 58) = 10.20$, $p = .002$, partial $\eta^2 = .15$

教學重點 混合設計的關鍵永遠是『交互作用』，不是單一主效果；控制組若也下降，就要靠交互作用把治療效果分離出來。

交互作用：兩條線看治療效果


承上 交互作用的算法 → **本頁** 看圖：兩條線斜率不同



重點 治療組掉得多、控制組幾乎沒動 → 兩線不平行 ＝ 交互作用顯著 → 治療真的有效（已扣掉時間效應）。

交互作用白話：『看情況』就是交互作用

承上 看過圖 → **本頁** 白話：『看情況』就是交互作用



兩條線不平行＝交互作用（示意）

情境
新藥對年輕人很有效、對年長者幾乎無效

主效果會被平均掉
全體平均起來，藥效看起來只是普通

交互作用＝效果因人而異
年齡 × 用藥 顯著：藥效『看情況』

忽略它的代價
誤說『這藥普通』，錯過對特定族群很有用的藥

教學重點 混合設計的『時間 × 組別』就是同一回事：治療效果是否『因時間而不同』——看交互作用，不是看單一主效果。

用 JASP 執行重複量數 ANOVA

JASP 操作四步（選單以英文介面為準）；右表為輸出節錄，數字同第 63 張

① 資料寬格式
每人一列；前測、後測各一欄

▼

② 開分析
ANOVA → Repeated Measures ANOVA

▼

③ 放變數
前測、後測 → Repeated Measures Cells；組別 → Between Subject Factors

▼

④ 勾選輸出
Descriptive plots、 Estimates of effect size （$\eta^2 p$）

Within Subjects Effects （節錄）

效應	SS	df	MS	F	p	$\eta^2 p$
時間 × 組別	**48.197**	**1**	**48.197**	**10.20**	**.002**	**.15**
Residuals	274.103	58	4.726			

只看紅色那一列 『時間 × 組別』交互作用
$F(1, 58) = 10.20$， $p = .002 < .05$ → 顯著
＝治療組前後的變化，和控制組不一樣
Residuals 是誤差列，用來算 MS 與 F，不用解讀

重點 混合設計在 JASP 以 RM ANOVA 分析；重點看「時間 × 組別」交互作用是否顯著（$p < 0.05$）。

⑤ 邏輯斯迴歸（數值 IV × 類別 DV）

承上 DV 是數值的檢定講完 → **本頁** DV 變成類別：邏輯斯迴歸（數值 IV）

- **IV 數值（如年齡）、 DV 類別（如是否購買）**
- **檢驗：購買「機率」是否隨年齡而變化**
- $p < 0.05$ → 可推論：母體中購買機率確實隨年齡而變
- **勝算比（Odds Ratio, OR）量化關聯強度： OR 接近 1 → 效應小；離 1 越遠 → 越強**

APA 報告：$\exp(b) = 0.88, z = -3.67, p < .001$（購買機率隨年齡「顯著下降」）

⑤ 邏輯斯迴歸完整範例（數值 IV × 類別 DV）


年齡（數值）預測是否購買（0/1）

1 **為何不用線性**　DV 是 0/1，用邏輯斯把『勝算的對數』對 IV 建模

2 **勝算比 OR**　exp(b) = 0.88：年齡每 +1 歲，購買勝算 ×0.88（約 −12%）

3 **方向與顯著**　OR < 1 → 負向；95% CI 不含 1 → 顯著


A **APA**　OR = 0.88, 95% CI [0.82, 0.94], z = −3.67, p < .001



教學重點　OR = 1 代表無關聯；離 1 越遠關聯越強。報 OR 一定要附 95% CI——CI 是否跨過 1，就是顯著與否。

邏輯斯：機率的 S 形曲線

承上 OR 的算法 → **本頁** 看圖：機率的 S 形曲線



重點 線性會跑出 0~1 之外；邏輯斯用 S 形把 IV 映到機率。年齡每增 1 歲勝算 ×0.88（OR<1，負向）。

⑥ 卡方檢定（類別 IV × 類別 DV）

承上 數值 IV × 類別 DV → **本頁** 兩個都是類別：卡方檢定

- **檢驗兩個類別變量的關聯（如：性別 對 是否購買）**
- 以列聯表的次數與欄百分比為基礎
- **$p < 0.05$ → 兩變量有關聯**
- **$p > 0.05$ → 無法下結論有差異（可能真的無差異，或樣本太小）**

APA 報告（不顯著例，另一組小樣本資料）：$\chi^2(1) = 1.71, p = .19$（男 66% vs 女 50% 購買，差異不顯著）

非顯著 ≠ 證明沒差異；務必檢查樣本數是否足夠。

⑥ 卡方檢定完整範例（觀察 vs 期望）

性別 × 是否購買，N = 150：男 40/60、女 30/20

1. **期望次數** 若獨立：男·購買 = 100×70/150 = 46.7；女·購買 = 23.3
2. **卡方值** $\chi^2 = \Sigma(O-E)^2/E \approx 5.36$（四格加總，見右）
3. **df 與 p** df = (2−1)(2−1) = 1；$\chi^2(1) = 5.36 \rightarrow p = .021$
4. **效應量** Cramér's V = $\sqrt{(5.36 \div 150)} \approx .19$（小～中）


男·購買 O 40　E 46.7 **$(O-E)^2/E \approx 0.96$**	**女·購買** O 30　E 23.3 **$(O-E)^2/E \approx 1.93$**
男·未購 O 60　E 53.3 **$(O-E)^2/E \approx 0.84$**	**女·未購** O 20　E 26.7 **$(O-E)^2/E \approx 1.68$**

加總：**$0.95 + 1.90 + 0.83 + 1.67 \approx 5.36$**
女購買率 60% > 男 40%

教學重點 卡方比較『觀察 vs 獨立時的期望』；小樣本（期望 <5）用 Fisher 精確檢定。顯著只說有關聯，強度看 Cramér's V。

卡方：觀察 vs 期望，看圖秒懂

承上 卡方的算法 → 本頁 看圖：觀察 vs 期望



重點 $\chi^2 = \Sigma$ （觀察−期望）^{2} / 期望。藍柱（實際）與灰柱（若無關聯的期望）差越大 → χ^2 越大 → 越可能有關聯。

讀統計軟體輸出：擬真範例（獨立 t 檢定）

承上 六種檢定都會算了 → **本頁** 讀懂軟體輸出，翻成一句 APA

輸出欄位	數值	怎麼讀
t	2.73	檢定統計量
df	58	自由度（$n_1 + n_2 - 2$）
p (two-tailed)	.008	< .05 → 顯著
Mean Difference	6.00	兩組平均差（分）
Cohen's d	0.70	效應量（中大）
95% CI	[1.6, 10.4]	不含 0 → 顯著

翻成 APA t(58) = 2.73, p = .008, d = 0.70, 95% CI [1.6, 10.4]。讀表順序：先看 p（顯不顯著）→ 再看效應量與 CI（多大、多確定）→ 配上各組 M、SD 寫成句子。

完整案例：正念 App 能降低護理師壓力嗎？（1/2）

承上 會讀輸出 → **本頁** 完整案例：從研究問題走到選對檢定

① 研究問題與設計	② 假設	③ 選檢定	④ 檢查假設
隨機分派 60 位護理師：App 組 vs 等候組；4 週後測知覺壓力 PSS	H_0：兩組壓力平均相等；H_1：不相等（雖預期 App 較低，仍用雙尾）	IV＝組別（類別 2 組）、DV＝壓力分數（數值）→ 獨立樣本 t	各組近似常態、變異數同質（Levene p＝.42）、觀察獨立 → 可用 t


先把『問題 → 設計 → 假設 → 選檢定 → 假設檢查』定好，再碰數字（結果見下一頁）


教學重點 先把『問題 → 設計 → 假設 → 選檢定 → 假設檢查』定好，再碰數字——這條線就是方法 / 結果章的骨架。

完整案例：正念 App （ 2/2 ）——結果、報告與討論

承上 問題、設計、檢定都定了 → **本頁** 結果、報告與討論

⑤ 結果： PSS 平均（誤差線＝ ±1 SD），各 30 人





t(58) = 2.80, p = .007
d = 0.72 （中大）

⑦ APA

App 組壓力（ M = 18.2, SD = 5.1 ）顯著低於等候組（ M = 22.0, SD = 5.4 ）， t(58) = 2.80, p = .007, d = 0.72, 95% CI [1.1, 6.5]。

⑧ 討論：能談因果嗎?

✓ **有隨機分派 → 可談因果**

△ 單一樣本、需複製； PSS 為自陳，宜加客觀指標（如皮質醇）

教學重點 一個完整結果 = 顯著性（ p ）+ 效果大小（ d ／平均差）+ 精確度（ CI ）+ 設計能談到什麼（因果 vs 關聯）。

完整案例：把整條線讀成白話

承上 完整案例 → **本頁** 每個數字讀成白話

一句話 隨機分派 60 位護理師，用 App 4 週後壓力（PSS）顯著低於等候組

隨機分派
兩組事前相當 → 差異來自 App，能談因果

t(58) = 2.80
兩組差距是雜訊（SE）的 2.8 倍

p = .007
若 App 其實無效，只有 0.7% 機率看到這麼大的差

d = 0.72
中大效果

95% CI [1.1, 6.5]
與資料相容的平均差約 1.1 ～ 6.5 分；不含 0

重點 一個好結果 = 顯著 (p) ＋效果多大（d/ 平均差）＋多確定 (CI) ＋能談到什麼（因果 vs 關聯），四者缺一不可。

各檢定的 APA 報告格式總表

承上 案例的 APA → 本頁 各檢定的 APA 報告格式總表

檢定	統計量	APA 報告範例
相關 Correlation	r （df）	r(28) = .88, p < .001
ANOVA （組間）	F （df1, df2）	F(1, 58) = 37.91, p < .001
RM ANOVA （組內 / 混合）	F （df1, df2）	F(1, 58) = 10.20, p = .002 （交互作用）
邏輯斯迴歸 Logistic	exp(b)、z	exp(b) = 0.88, z = −3.67, p < .001
卡方 Chi-square	χ^2 （df）	$\chi^2(1) = 1.71$, p = .19

報告三要素：統計量＋自由度、精確 p 值、效應量／描述統計；t 檢定的格式見第 52 、 54 張。

D

避免 p 值誤用

Avoid Mistakes! How to Use p-values Correctly

錯誤一：把「不顯著」當成「證明沒差異」

承上 C 段：會算、會報 → 本頁 D 段避免誤用。錯誤一：把不顯著當成沒差異

$p > 0.05$ 時，你「不能」下結論說 H_0 為真——只能說「證據不足以拒絕 H_0」。

- **$p > 0.05$ 有兩種可能：**
- **① 母體中真的沒有差異（H_0 為真）**
- **② 其實有差異，但你的樣本數太小、沒偵測到**
- **所以「不顯著」無法區分這兩者——不要從 $p > 0.05$ 推出「沒有效果」**
- **要主張「沒有差異」，須改用等效性檢定（TOST，見 2.6）。**

錯誤二：多重檢定與 Bonferroni 校正

承上 錯誤一 → 本頁 錯誤二：做太多檢定

- **α = 0.05 代表「每一次檢定」約有 5% 誤判為顯著的機會**
- **若在同一批資料做 100 次檢定 → 約有 5 次「純靠運氣」達顯著（chance capitalization）**
- 不要「一直換題目做檢定，直到有一個顯著」


解法：Bonferroni 校正

把門檻除以檢定次數。例：做 2 個檢定 → 用 0.05 ÷ 2 = 0.025 當門檻；做 5 個 → 用 0.01。這樣控制「族系錯誤率（FWER）」，但偏保守；Holm 法同樣控制 FWER 且檢定力較高，大量探索性檢定可改控 FDR（Benjamini–Hochberg）。

原則：先想清楚要做幾個檢定；每份資料集只跑一組事先規劃好的檢定。

p-hacking 與研究者自由度

承上 多重檢定 → **本頁** 更隱蔽的版本：p-hacking



試的路越多，總有一條湊到 < .05 （p 值為示意）

研究者自由度
可選的分析很多：刪不刪離群值、加不加共變量、何時停止收案——都會影響 p

p-hacking
不斷嘗試不同分析／子群，直到 p < .05；等於偷偷做了很多檢定

HARKing
看到結果才回頭『假裝』當初就這樣假設


對策
預先註冊分析計畫；誠實區分驗證性與探索性分析

教學重點 先寫好分析計畫再看資料——探索性發現當『假設來源』沒問題，但要用新資料驗證，別在同一批資料裡當成定論。

p-hacking：一個具體的例子

承上 p-hacking 的定義 → **本頁** 一個具體的例子

研究者想證明新教材有效，一路『喬』分析



問題

試了很多種分析，總會有一種湊到 < .05；只報最後這個，『顯著』很可能是假的

對策

事前註冊分析計畫
把探索到的發現誠實標為『探索性』
再用新資料驗證

重點 同一批資料反覆嘗試到顯著 = p-hacking；它是可重現性危機的主因之一。

超越 p 值：用 CI 與效應量把話說完整

承上 避開兩種誤用 → **本頁** 正面做法：用 CI 與效應量把話說完整

一則完整結果＝五塊積木

t(58) = 2.73	p = .008	d = 0.70	95% CI [1.6, 10.4]
統計量＋ df	精確 p 值	效應量：差多少	精確度：多確定

p 不是
效果大小，也不是『假設為真的機率』；不能單獨當決策依據

一定要報效應量
d ／ η² ／ r ／ OR ／ V：差多少、關聯多強，可跨研究比較

一定要報 CI
同時給方向、大小與精確度，比顯著／不顯著二分更有資訊

別說『證明』
說『支持／不支持』；單一研究不定論，靠複製與統合分析

教學重點 現代結果報告 = 檢定統計量 + df + 精確 p + 效應量 + 95% CI；只給『p<.05』會被審稿人退。

超越 p 值：同一結果的兩種寫法（承前頁報告要件）

承上 報告要件 → **本頁** 同一結果的兩種寫法

只寫 p（不完整）

「兩組有顯著差異
（p < .05）。」

→ 讀者不知道
差多少、多確定，
也無法跨研究比較。

完整寫法（建議）

「App 組壓力顯著低於
等候組，平均差 3.8 分，
95% CI[1.1, 6.5],
Cohen's d=0.72,
t(58)=2.80, p=.007 。」

→ 方向、大小、精確度、
顯著性一次到位。

重點 現代期刊要求：檢定統計量＋ df ＋精確 p ＋效應量＋ 95% CI；別只丟一個『p<.05』。

結果章寫作檢查清單

承上 兩種寫法 → 本頁 結果章寫作檢查清單

☐ 統計量完整

統計量＋ df、精確 p （不只寫 p<.05 ）、效應量與 95% CI

☐ 先敘述、再推論

先報各組 M 、 SD 、 n ，再報檢定

☐ 假設有檢查

常態、變異數同質；違反時說明改用的方法

☐ 多重比較有校正

Bonferroni ／ Tukey ，或說明為事先規劃的少數檢定

☐ 顯著 ≠ 重要

用效應量與 CI 討論實質意義

☐ 驗證 vs 探索

誠實區分；不把『不顯著』寫成『證明沒差異』

教學重點 把這張清單當『送印前的最後檢查』——審稿人最常抓的就是漏效應量 /CI 、以及把不顯著當成沒差異。

本單元重點回顧

- **【目標②】推論統計判斷：在 H_0 為真的假定下，觀察到的資料有多不尋常。**
- 【目標②】我們反駁 H_0、而非證明 H_1；p 值是反駁 H_0 的證據強度，門檻 0.05 是共識決策線。
- 顯著性取決於三股力量：效應量（大）、變異（小）、樣本量（大）。
- 【目標①】【目標④】依 IV/DV 選檢定：相關、t 檢定、ANOVA、RM ANOVA、邏輯斯、卡方，並用 APA 格式報告。
- 顯著的意義看設計：實驗能談因果、非實驗只能談關聯。
- 【目標②】兩大誤用：不能把「不顯著」當沒差異；多重檢定要用 Bonferroni 校正。
- 【目標③】【目標④】95% CI 與效應量要與統計量、精確 p 值一起報——只報 p 是不完整的。

下一站　2.6 樣本數規劃：反過來問——要偵測到這樣的效果，事前需要多少人？

參考文獻與延伸閱讀

- Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. The American Statistician, 70(2), 129–133. → p 值六原則（第 83 張）
- Greenland, S., et al. (2016). Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: A guide to misinterpretations. European Journal of Epidemiology, 31(4), 337–350. → p 值與 CI 的常見誤解
- Cumming, G. (2014). The new statistics: Why and how. Psychological Science, 25(1), 7–29. → 效應量與信賴區間
- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum. → 效應量基準（第 39 張）
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6(2), 65–70. → 多重檢定（第 80 張）
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. JRSS B, 57(1), 289–300. → FDR
- Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology. Psychological Science, 22(11), 1359–1366. → p-hacking （第 81–82 張）
- Lakens, D. (2017). Equivalence tests: A practical primer for t tests, correlations, and meta-analyses. Social Psychological and Personality Science, 8(4), 355–362. → 主張「沒差異」
- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). → APA 報告格式（第 77 張）

A

作業

Take-home Assignment

From p-value to a defensible conclusion.

涵蓋單元 5： H_0/H_1 與 p 值邏輯、三股力量、標準誤與信賴區間、六種檢定與效應量、 APA 報告、p 值誤用。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」； Part B 實作題要你「選對檢定、算得出、報得對」。參考解答在本節後段。

Assignment Brief

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

能依資料選對推論檢定、算出並解讀結果，並用 APA 格式完整報告（含效應量與 CI）。

繳交方式

一份 PDF： Part A 文字作答 ＋ Part B 計算與 APA 報告，建議 3–5 頁。

建議時間

約 2–3 小時；可用 JASP 驗算，但需寫出檢定選擇與判讀。

工具與誠信

可用 AI／軟體協助，但須附『AI 使用聲明』；判讀與結論要自己寫。

Part A ｜觀念題：推論統計（1/2）

A1 H_0/H_1 是什麼？為何『反駁 H_0』而非『證明 H_1』？寫出 p 值的正確定義與兩個常見誤解。

A2 決定顯著的三股力量（效應量、變異、樣本數）如何影響 p？為何大樣本下微弱效應也會顯著？

A3 標準誤 SE 與標準差 SD 差在哪？95% 信賴區間怎麼算、怎麼解讀？CI 與假設檢定的關係為何？

A4 Type I / II 錯誤與 Power 各是什麼？把 α 設更嚴會付出什麼代價？

作答提示 觀念題重『說得清楚＋舉得出例』；每題 2–4 句即可。

Part A ｜觀念題：推論統計（2/2）

A5 依 IV/DV 選檢定：六種檢定各對應什麼資料型態？各寫一個 APA 報告範例。

A6 各檢定的效應量（d / η^2 / r / OR / Cramér's V）與基準是什麼？為何一定要報效應量與 CI？

A7 t / ANOVA 的基本假設有哪些？違反時的無母數替代分別是什麼？

A8 p 值兩大誤用（把不顯著當沒差異、多重檢定）與對策（Bonferroni、預先註冊）。

Part B ｜實作題：選檢定、算結果、報 APA （1/2）

情境： 比較『新教學法 vs 傳統教學』對考試成績的影響（兩組各 n = 30）。
新法 M = 78, SD = 8　　傳統 M = 72, SD = 9

B1 寫出 H_0 與 H_1；選擇適當的統計檢定並說明理由（依 IV/DV 型態）。

B2 算獨立樣本 t（可用公式）、df，判斷是否 $p < .05$，並算 Cohen's d、判讀效應大小。

B3 寫出這個結果的 APA 報告句（含統計量、df、精確 p、效應量與 95% CI）。

Part B ｜實作題：選檢定、算結果、報 APA （2/2）

B4 若改為『同一批學生前後測』，該用什麼檢定？效應量用什麼？與 B2 的設計差在哪（樣本效率、假設）？

B5 若研究者做了 8 個檢定才找到一個顯著，有什麼問題？你會怎麼處理（校正／預註冊）？並解釋『顯著 ≠ 重要』。

B6 寫一段結果章（含效應量與 95% CI 的完整報告）＋ AI 使用聲明。

繳交格式 Part B 要看得到『檢定選擇的理由』與『計算步驟』；報告句要符合 APA。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能說出關係（如 CI↔ 檢定、 Power=1−β ）
B1 選檢定	10%	H_0/H_1 正確、依 IV/DV 選對檢定並說理由
B2 計算	15%	t 、 df 、 d 計算正確、判讀效應大小
B3 APA 報告	10%	統計量＋ df ＋精確 p ＋效應量＋ CI 齊全
B4–B6 設計＋誠信	25%	配對設計與效應量正確、多重檢定處理、報告＋ AI 聲明

常見扣分 把不顯著當『沒差異』、只報 p 不報效應量 /CI 、相關講成因果、多重檢定不校正。

Reference URLs

資源連結 · 外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源 / 服務	官方網址 URL
JASP	jasp-stats.org/

案例應用：三個檢定，三種問題

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

推論的邏輯，以及 t 檢定與卡方各自回答什麼樣的問題。

② 案例怎麼用

- 主要問題用配對 t：同一批人前後測，$t(33) = -6.30$、$p < .001$、$dz = -1.08$。
- 機構差異用獨立 t：A 對 B 後測 $t(60) = -3.85$、$p < .001$、$d = -0.98$。
- 類別關聯用卡方：職類 × 完整性達標 $\chi^2(1) = 0.47$、$p = .492$，未達顯著。
- 每個檢定先查前提：常態性、變異數同質、期望次數是否足夠。
- 報告一律附效應量與 95% 信賴區間，不只寫 p 值。

③ 產出什麼證據

APA 格式結果段三則（次頁），可直接移入論文第四章。

④ 承接關係

上游：承自 2.4 之 Table 1 樣本特徵表 ｜ 下游：交棒 2.6，回頭檢視檢定力是否足夠。

教學重點 三個檢定對應三種問題：同一群人前後比、兩群人互相比、兩個類別有沒有關聯。選錯的通常不是公式，而是沒想清楚要比的是什麼。

示範產物： APA 格式結果段三則

數值一律取自唯一數字表；此三段可原樣移入論文，毋須改寫

段落	示範文字
主要結果（配對 t）	導入後交班準備時間（M = 13.03, SD = 4.74）顯著短於導入前（M = 18.40, SD = 5.20）， t(33) = −6.30, p < .001, dz = −1.08, 95% CI [−7.10, −3.63]。
機構比較（獨立 t）	後測期間， A 機構之準備時間（M = 13.03, SD = 4.74）顯著短於同期未導入之 B 機構（M = 17.80, SD = 4.99）， t(60) = −3.85, p < .001, d = −0.98, 95% CI [−7.25, −2.29]。
類別關聯（卡方）	職類與紀錄完整性是否達標之間未達顯著關聯， $\chi^2(1) = 0.47$, p = .492, φ = .09。本結果不足以支持兩者無關聯之推論，詳見研究限制。

教學重點　第三段的寫法值得注意：不顯著不能寫成「兩者沒有差異」，只能寫「未達顯著關聯」。前者是對母體下結論，後者才是這份資料撐得住的說法。