

# Advanced Competitive Programming

---

國立成功大學ACM-ICPC程式競賽培訓隊  
nckuacm@imslab.org

Department of Computer Science and Information Engineering  
National Cheng Kung University  
Tainan, Taiwan

# Number Theory

---

# Outline

---

- Modular arithmetic
- Greatest Common Divisor

# Outline

---

- Modular arithmetic
- Greatest Common Divisor

# 餘數

---

對於整數  $a$   
除以整數  $b$

除不盡的部分就是餘數

# 餘數

---

對於整數  $a$

除以整數  $b$

除不盡的部分就是餘數

例如  $6 / 4 = 1 \dots 2$

$$6 = 1 * 4 + 2$$

# 同餘

---

某些整數除以  $n$   
他們的餘數相同 就稱為**同餘**

# 同餘

---

某些整數除以  $n$   
他們的餘數相同 就稱為**同餘  $n$**

例如 6 與 10 除以 4 都餘 2



# 同餘

---

某些整數除以  $n$   
他們的餘數相同 就稱為**同餘  $n$**

$a$  與  $b$  同餘  $n$   
記為  $a \equiv b \pmod{n}$

# 同餘

---

某些整數除以  $n$   
他們的餘數相同 就稱為**同餘  $n$**

6 與 10 同餘 4  
記為  $6 \equiv 10 \pmod{4}$

# 同餘運算

---

對於

- $a \equiv b \pmod n$
- $c \equiv d \pmod n$

# 同餘運算

---

對於

- $a \equiv b \pmod n$
- $c \equiv d \pmod n$

有

$$a + c \equiv b + d \pmod n$$

# 同餘運算

---

對於

- $a \equiv b \pmod n$
- $c \equiv d \pmod n$

有

$$a + c \equiv b + d \pmod n$$

$$a \times c \equiv b \times d \pmod n$$

# 同餘運算

---

例如

- $6 \equiv 10 \pmod{4}$

- $5 \equiv 11 \pmod{4}$

有

$$6+5 \equiv 10+11 \pmod{4}$$

# 同餘運算

---

例如

- $6 \equiv 10 \pmod{4}$

- $5 \equiv 11 \pmod{4}$

有

$$6+5 \equiv 10+11 \pmod{4}$$

$$6 \times 5 \equiv 10 \times 11 \pmod{4}$$

# 歐拉定理

---

$a, n$  互質 則

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

$\phi(n)$  表示與  $n$  互質且小於  $n$  的正整數的個數  
例如 1, 5 和 6 互質， $\phi(6)=2$



# 費馬小定理

---

$a, p$  互質，且  $p$  為質數 則

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

# Outline

---

- Modular arithmetic
- Greatest Common Divisor

# 最大公因數

---

整數  $a, b$ ，它倆各自有自己的因數

取相同的因數中最大的數，即  $\gcd(a, b)$

# 性質

---

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$$

# 性質

---

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$$

$$\gcd(a, 0) = |a|$$

# 性質

---

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$$

$$\gcd(a, 0) = |a|$$

$$\gcd(a, b) = \gcd(a, b \% a)$$

# 性質

---

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$$

$$\gcd(a, 0) = |a|$$

$$\gcd(a, b) = \gcd(a, b \% a)$$

其中  $b \% a$  表示  $b$  除以  $a$  的餘數

# 輾轉相除法

---

找出  $\gcd(a, b)$  的值 (normal form)



# 輾轉相除法

---



找出  $\gcd(a, b)$  的值 (normal form)

根據 GCD 的性質，有

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a) = \gcd(b \% a, a)$$

# 輾轉相除法

---



# 輾轉相除法

---

找出  $\gcd(a, b)$  的值 (normal form)

根據 GCD 的性質，有

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a) = \gcd(b \% a, a)$$

# 輾轉相除法

---

找出  $\gcd(a, b)$  的值 (normal form)

根據 GCD 的性質，有

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a) = \gcd(b \% a, a)$$

其中  $b \% a$  只有當  $b \geq a$  時才有變化

# 輾轉相除法

---

$\gcd(a_0, b_0) = \gcd(b_0 \% a_0, a_0)$ , 設  $b_1 = b_0 \% a_0$

$\gcd(b_1, a_0) = \gcd(a_0 \% b_1, b_1)$ , 設  $a_1 = a_0 \% b_1$

$\gcd(a_1, b_1) = \gcd(b_1 \% a_1, a_1)$ , 設  $b_2 = b_1 \% a_1$

:

$\gcd(0, b_n) = |b_n|$

## 輾轉相除法 (例)

---

$$\gcd(15, 42) = \gcd(42 \% 15, 15), 12 = 42 \% 15$$

$$\gcd(12, 15) = \gcd(15 \% 12, 12), 03 = 15 \% 12$$

$$\gcd(03, 12) = \gcd(12 \% 03, 03), 00 = 12 \% 03$$

$$\gcd(0, 3) = 3$$

# 輾轉相除法 (實作)

---

```
int gcd(int a, int b) {  
    return a ? gcd(b%a, a) : b;  
}
```

# 貝祖定理

---

對於所有整數  $a, b$  ,

存在整數  $x, y$  使得  $ax+by = \gcd(a, b)$



# 擴展歐幾里得演算法

---

找到  $\gcd(a, b)$  同時，找出  $x, y$

# 擴展歐幾里得演算法

---

找到  $\gcd(a, b)$  同時，找出  $x, y$

為了簡潔，令  $g = \gcd(a, b)$

# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法

找到  $g$  的時候

# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法

找到  $g$  的時候，根據貝祖定理

$$0 \cdot x_n + g \cdot y_n = g$$

# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法

找到  $g$  的時候，根據貝祖定理


$$0 \cdot x + g \cdot y = g$$

明顯有  $x$  為任意整數， $y$  為 1  
(別搞混符號，這裡  $x, y$  不是原問題要求的!!!)

# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法，對**過程中**任意  $a, b$  有  
(這裡  $a, b$  不是原問題的!! 而是過程中的)


$$g = \gcd(a, b) = \gcd(b \% a, a)$$

(根據 GCD 性質)

# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法，對**過程中**任意  $a, b$  有

$$g = \gcd(a, b) = \gcd(b \% a, a)$$



$$g = (b \% a) x + a y$$


(貝祖定理)

# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法，對**過程中**任意  $a, b$  有

$$g = (b \% a) x + a y$$



$$g = (b - \lfloor b/a \rfloor \cdot a) x + a y$$

( $b \% a$  的定義)




# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法，對過程中任意  $a, b$  有

$$g = (b - \lfloor b/a \rfloor \cdot a) x + a y$$



$$g = b x + a (y - \lfloor b/a \rfloor \cdot x)$$

(移個項)

# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法，對**過程中**任意  $a, b$  有

$$g = b x + a (y - [b/a] \cdot x)$$

對於  $a$  與  $b$  的貝祖等式

# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法，對**過程中**任意  $a, b$  有

$$g = b x + a (y - \lfloor b/a \rfloor \cdot x)$$

對於  $a$  與  $b$  的貝祖等式

$$x_t = (y - \lfloor b/a \rfloor \cdot x)$$

$$y_t = x$$

# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法，對**過程中**任意  $a, b$  有

$$g = b x + a (y - \lfloor b/a \rfloor \cdot x)$$

對於  $a$  與  $b$  的貝祖等式  $a x_t + b y_t = g$

$$x_t = (y - \lfloor b/a \rfloor \cdot x)$$

$$y_t = x$$

# 擴展歐幾里得演算法(實作)

---

```
int gcd(int a, int b, int &x, int &y) {  
    if(!a) {  
        x = 0, y = 1; // x 為任意整數  
        return b;  
    }  
  
    int g = gcd(b%a, a, x, y);  
  
    int xp = y - b/a * x, yp = x;  
    x = xp, y = yp;  
  
    return g;  
}
```

# 擴展歐幾里得演算法(實作)

---

```
int gcd(int a, int b, int &x, int &y) {
```

```
    if(!a) {  
        x = 0, y = 1; // x 為任意整數  
        return b;  
    }
```

```
    int g = gcd(b%a, a, x, y);
```

```
    int xp = y - b/a * x, yp = x;  
    x = xp, y = yp;
```

```
    return g;
```

```
}
```

# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法

找到  $g$  的時候，根據貝祖定理

$$0 \cdot x + g \cdot y = g$$

明顯有  $x$  為任意整數， $y$  為 1  
(別搞混符號，這裡  $x, y$  不是原問題要求的!!!)

# 擴展歐幾里得演算法(實作)

---

```
int gcd(int a, int b, int &x, int &y) {  
    if(!a) {  
        x = 0, y = 1; // x 為任意整數  
        return b;  
    }  
  
    int g = gcd(b%a, a, x, y);  
    int xp = y - b/a * x, yp = x;  
    x = xp, y = yp;  
  
    return g;  
}
```



# 擴展歐幾里得演算法

---

考慮輾轉相除法，對**過程中**任意  $a, b$  有

$$g = b x + a (y - \lfloor b/a \rfloor \cdot x)$$

對於  $a$  與  $b$  的貝祖等式  $a x_t + b y_t = g$

$$x_t = (y - \lfloor b/a \rfloor \cdot x)$$

$$y_t = x$$

# Questions?