

# ИДЗ №1

Вершинин Данил Алексеевич

18 марта 2024 г.

## 1 Найти все значения корня: $\sqrt[3]{8i}$

**Решение:**

$$w = 8i$$

Найду модуль и аргумент:

$$\rho = |8i| = \sqrt{64} = 8$$

$$\phi = \operatorname{arctg}\left(\frac{8}{0}\right) = \operatorname{arctg}(+\infty) = \frac{\pi}{2}$$

$$2 = 8\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

$$z_k = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{2 \cdot 3} + \frac{2\pi k}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2 \cdot 3} + \frac{2\pi k}{3}\right)\right) = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3}\right)\right)$$

$$z_0 = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right) = \sqrt{3} + i$$

$$z_1 = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}\right)\right) = 2\left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right) = -\sqrt{3} + i$$

$$z_2 = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3}\right)\right) = 2\left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right) = 2i$$

**Ответ:**

$$z_0 = \sqrt{3} + i$$

$$z_1 = -\sqrt{3} + i$$

$$z_2 = 2i$$

## 2 Представить в алгебраической форме: $\operatorname{sh}(2 - \pi i)$

**Решение:**

$$\operatorname{sh}(2 - \pi) = \operatorname{sh}(2) \operatorname{ch}(\pi i) - \operatorname{ch}(2) \operatorname{sh}(\pi i) = -\operatorname{sh}(2)$$

$$\operatorname{ch}(\pi i) = \cos(\pi) = -1$$

$$\operatorname{sh}(i\pi) = i\sin(\pi) = 0$$

**Ответ:**

$$-\operatorname{sh}(2)$$

### 3 Представить в алгебраической форме: $\operatorname{arth}(1 + \sqrt{3}i)$

Решение:

$$\begin{aligned}\operatorname{arth}(1 + \sqrt{3}i) \\ \operatorname{arth}(z) = w \Rightarrow \operatorname{cth}(w) = z \\ \frac{e^w + e^{-w}}{e^w - e^{-w}} = z \\ \frac{e^w + 1/e^w}{e^w - 1/e^w} = \frac{e^{2w} + 1}{e^{2w} - 1} = z \Rightarrow e^{2w} + 1 = z(e^{2w} - 1) \\ e^{2w}(1 - z) + z + 1 = 0 \\ e^{2w}(1 - z) + (z + 1) = 0 \Rightarrow e^{2w} = \frac{z + 1}{z - 1} \\ 2w = \operatorname{Ln} \left( \frac{z + 1}{z - 1} \right) = \ln \left| \frac{z + 1}{z - 1} \right| + i \operatorname{Arg} \left( \frac{z + 1}{z - 1} \right) \\ w = \frac{1}{2} \left( \ln \left| \frac{z + 1}{z - 1} \right| + i \left( \arg \left( \frac{z + 1}{z - 1} \right) + 2\pi n \right) \right), \quad n \in \mathbb{Z} \\ \frac{z + 1}{z - 1} = \frac{2 + \sqrt{3}i}{-1} \cdot \frac{-\sqrt{3}i}{-\sqrt{3}i} = \frac{3 - 2\sqrt{3}i}{3} = 1 - \frac{2\sqrt{3}i}{3} \\ \left| \frac{z + 1}{z - 1} \right| = \left| 1 - \frac{2\sqrt{3}i}{3} \right| = \sqrt{1 + \frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{7}{3}} \\ \arg \left( 1 - \frac{2\sqrt{3}i}{3} \right) = \operatorname{arctg} \left( -\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = -\operatorname{arctg} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) \\ w = \frac{1}{2} \left( \ln \sqrt{\frac{7}{3}} + i \left( -\operatorname{arctg} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) + 2\pi n \right) \right), \quad n \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Ответ:

$$\frac{1}{2} \left( \ln \sqrt{\frac{7}{3}} + i \left( -\operatorname{arctg} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) + 2\pi n \right) \right), \quad n \in \mathbb{Z}$$

### 4 Представить в алгебраической форме: $(-3i)^i$

Решение:

$$\begin{aligned}(-3i)^i &= e^{i \operatorname{Ln}(-3i)} \\ \operatorname{Ln}(-3i) &= \ln |-3i| + i \operatorname{Arg}(-3i) = \ln(3) + i \left( \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right), \quad k \in \mathbb{Z} \\ e^{i \operatorname{Ln}(-3i)} &= e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) + i \ln(3)} = e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)} (\cos(\ln(3)) + i \sin(\ln(3))), \quad k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Ответ:

$$e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)} (\cos(\ln(3)) + i \sin(\ln(3))), \quad k \in \mathbb{Z}$$

### 5 Представить в алгебраической форме: $\operatorname{Ln}(2 + 2\sqrt{3}i)$

Решение:

$$\operatorname{Ln}(2 + 2\sqrt{3}i) = \ln |2 + 2\sqrt{3}i| + i \operatorname{Arg}(2 + 2\sqrt{3}i) = \ln 4 + i \left( \frac{\pi}{3} + 2\pi k \right), \quad k \in \mathbb{Z}$$


Ответ:

$$\ln 4 + i \left( \frac{\pi}{3} + 2\pi k \right), k \in \mathbb{Z}$$

6 Вычертить область, заданную неравенствами:

$$D = \{z : |z - 1 + i| \geq 1, \operatorname{Re}(z) < 1, \operatorname{Im}(z) \leq 1\}$$

Ответ:



7 Определить вид пути и в случае, когда он проходит через точку  $\infty$ , исследовать его поведение в этой точке:  $z = \frac{4}{\operatorname{ch}(4t)} + i2 \operatorname{th}(4t)$

Решение:

Ответ:

8 Восстановить голоморфную в окрестности точки  $z_0$  функцию  $f(z)$  по известной действительной части  $u(x, y)$  или мнимой  $v(x, y)$  и начальному значению  $f(z_0)$ :  $u = x^2 - y^2 + x$ ,  $f(0) = 0$

Решение:

Ответ:

9 Вычислить интеграл от функции комплексной переменной по данному пути:  $\int_{AB} z \operatorname{Im} z^2 dz$ ;  $AB$  — отрезок прямой  $z_A = 0$ ,  $z_B = 1 + i$

Решение:

Ответ:

10 Найти радиус сходимости степенного ряда:  $\sum_{n=1}^{\infty} (\cos^2(n)) \cdot z^n$

Решение:

Ответ:

11 Найти все лорановское разложение данной функции в 0 и в  $\infty$ :

$$f(z) = \frac{5z+100}{50z-5z^2-2z^3}$$

Решение:

Ответ:

12 Найти все лорановское разложение данной функции по степеням  $z - z_0$ :  $f(z) = \frac{z+3}{z^2-1}$ ,  $z_0 = -2 - 2i$

Решение:

Ответ:

13 Данную функцию разложить в ряд Лорана в окрестности точки  $z_0$ :  $f(z) = ze^{\frac{z}{z-5}}$ ,  $z_0 = 5$

Решение:

Ответ:

14 Определить тип особой точки  $z = 0$  для данной функции:  $f(z) = \frac{\operatorname{ch}(5z)-1}{e^z-1-z}$

Решение:

Ответ:

15 Для данной функции найти все изолированные особые точки и определить их тип:  $f(z) = \operatorname{ctg}(\pi z)$

Решение:

Ответ: