



---

Sucessões

---

1. (a) Sucessão constante (portanto, monótona).

Sucessão limitada.

Sucessão convergente para 1.

- (b) Sucessão alternada (portanto, não monótona). Uma sucessão diz-se *alternada* quando os seus termos são alternadamente positivos e negativos.

Sucessão limitada. Com efeito,  $-1 \leq u_n \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}$ .

A sucessão é divergente porque  $\lim_n u_{2n} = 1$  e  $\lim_n u_{2n-1} = -1$ .

(c) 
$$u_n = \frac{1 + (-1)^n}{n} = \begin{cases} 0, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \frac{2}{n}, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

Tem-se que  $u_1 = 0 < 1 = u_2$  mas  $u_2 = 1 > 0 = u_3$ . Logo a sucessão não é monótona.

Sucessão limitada. Com efeito,  $0 \leq u_n \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}$ .

Sucessão convergente para 0 porque  $\lim_n u_{2n} = \lim_n u_{2n-1} = 0$ .

- (d) Tem-se que  $u_1 = -1 < \frac{1}{4} = u_2$  mas  $u_2 = \frac{1}{4} > -\frac{1}{9} = u_3$ . Logo a sucessão não é monótona.

Sucessão limitada. Com efeito,  $-1 \leq u_n \leq \frac{1}{4}, \forall n \in \mathbb{N}$ .

Sucessão convergente para 0. Tem-se que:

$$-\frac{1}{n^2} \leq \frac{(-1)^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Como

$$\lim_n \left( -\frac{1}{n^2} \right) = \lim_n \frac{1}{n^2} = 0,$$

concluimos, pelo Teorema das Sucessões Enquadradas, que  $\lim_n \frac{(-1)^n}{n^2} = 0$ .

Em alternativa, podemos justificar a convergência da sucessão  $(u_n)_n$  para 0 notando que a sucessão  $u_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , pode ser vista como a sucessão produto de duas sucessões em que uma é limitada e a outra é convergente para 0. Com efeito, tem-se que:

- a sucessão  $((-1)^n)_n$  é limitada;
- $\lim_n \frac{1}{n^2} = 0$ .

Então, por um teorema da aula, podemos concluir que  $\lim_n \frac{(-1)^n}{n^2} = 0$ .

(e) Uma vez que

$$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1 > 0, \forall n \in \mathbb{N},$$

ou seja  $u_{n+1} - u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ , a sucessão é monótona (estritamente) crescente.

Sucessão não limitada porque o conjunto dos termos da sucessão é um conjunto não majorado.

Sucessão divergente porque  $\lim_n u_n = +\infty$ .

$$(f) \quad u_n = [1 + (-1)^n]n = \begin{cases} 0, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ 2n, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

Tem-se que  $u_1 = 0 < 4 = u_2$  mas  $u_2 = 4 > 0 = u_3$ . Logo a sucessão não é monótona.

Sucessão não limitada porque o conjunto dos termos da sucessão é um conjunto não majorado.

Sucessão divergente porque a subsucessão dos termos de ordem par é divergente.

(g) Tem-se que

$$u_1 = 1, u_2 = 0, u_3 = -1, u_4 = 0, u_5 = 1, u_6 = 0, u_7 = -1, u_8 = 0, \dots$$

Em particular,  $u_2 = 0 > -1 = u_3$  mas  $u_3 = -1 < 0 = u_4$ . Logo a sucessão não é monótona.

A sucessão é limitada porque

$$|u_n| = \left| \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right| \leq 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

A sucessão é divergente. Com efeito, a sucessão  $(u_n)_n$  admite subsucessões convergentes para limites diferentes:

$$\lim_n u_{2n} = 0, \quad \lim_n u_{4n-3} = 1, \quad \lim_n u_{4n-1} = -1.$$

(h) Uma vez que

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{n+1}{(n+1)+2} - \frac{n}{n+2} = \frac{(n+1)(n+2) - n(n+3)}{(n+2)(n+3)} \\ &= \frac{2}{(n+2)(n+3)} > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

ou seja,  $u_{n+1} > u_n, \forall n \in \mathbb{N}$ , a sucessão é monótona (estritamente) crescente.

Como

$$|u_n| = \left| \frac{n}{n+2} \right| = \frac{n}{n+2} \leq \frac{n}{n} = 1, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

a sucessão é limitada.

A sucessão é convergente para 1. Com efeito,

$$\lim_n \frac{n}{n+2} = \lim_n \frac{1}{1 + \frac{2}{n}} = 1.$$

(i) A sucessão é monótona (estritamente) decrescente, uma vez que

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)+5} - \frac{3}{n+5} = \frac{-3}{(n+6)(n+3)} < 0, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

ou seja,  $u_{n+1} < u_n, \forall n \in \mathbb{N}$ .

A sucessão é limitada porque

$$|u_n| = \left| \frac{3}{n+5} \right| = \frac{3}{n+5} \leq \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Em alternativa podemos justificar que a sucessão  $(u_n)_n$  é limitada do seguinte modo. Tem-se que

- $0 < u_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$ ;
- $u_n \leq u_1 = \frac{1}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$  (porque a sucessão é decrescente).

Consequentemente,  $0 < u_n \leq \frac{1}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$  e, portanto, a sucessão é limitada.

A sucessão é convergente para zero. Com efeito,

$$\lim_n \frac{3}{n+5} = \lim_n \frac{\frac{3}{n}}{1 + \frac{5}{n}} = \frac{0}{1+0} = 0.$$

(j) Tem-se que:

$$u_1 = 1, u_2 = 2^4, u_3 = 3^4, u_4 = 4^4, \dots, u_{10} = 10^4, u_{11} = 2, u_{12} = 2, u_{13} = 2, \dots$$

A sucessão não é monótona. Justifique.

A sucessão é limitada porque

$$|u_n| \leq 10^4, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

A sucessão é convergente para 2.

(k) A sucessão é monótona (estritamente) decrescente. Com efeito,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-1}{n(n+1)} < 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

A sucessão é limitada porque

$$|u_n| = \left| \frac{n+1}{n} \right| = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \leq 2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

A sucessão é convergente para 1. Com efeito,

$$\lim_n \frac{n+1}{n} = \lim_n \left( 1 + \frac{1}{n} \right) = 1.$$

(l) A sucessão é monótona (estritamente) crescente. Com efeito,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n+1}{(n^2+n)^2} > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

A sucessão é limitada porque

$$|u_n| = \left| \frac{n^2-1}{n^2} \right| = 1 - \frac{1}{n^2} < 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

A sucessão é convergente para 1. Com efeito,

$$\lim_n \frac{n^2-1}{n^2} = \lim_n \left( 1 - \frac{1}{n^2} \right) = 1.$$

(m) Tem-se que  $u_n = \frac{(-1)^n}{3^n} = (-1)^n \frac{1}{3^n}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

A sucessão é limitada, pois

$$|u_n| = \left| (-1)^n \frac{1}{3^n} \right| = |(-1)^n| \cdot \left| \frac{1}{3^n} \right| = \frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{3}, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e alternada (logo, não monótona).

A sucessão é convergente para zero. Com efeito, tem-se que

- a sucessão  $((-1)^n)_n$  é limitada (Justifique);
- $\lim_n \frac{1}{3^n} = 0$ .

Então, por um teorema da aula, podemos concluir que  $\lim_n \frac{(-1)^n}{3^n} = 0$ .

(n)  $u_n = (-1)^n \cos(n\pi) = (-1)^n (-1)^n = (-1)^{2n} = 1$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

Sucessão monótona constante, limitada e convergente para 1.

2. Fixe-se  $\epsilon > 0$ . Queremos encontrar um  $p \in \mathbb{N}$  tal que

$$n \geq p \Rightarrow \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon. \quad (1)$$

Observemos que

- $\forall n \in \mathbb{N} \quad \left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n}$ ;
- $n \geq p \Rightarrow \frac{1}{n} \leq \frac{1}{p}$ .

Das observações anteriores decorre que, se escolhermos  $p \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{p} < \epsilon$ , provamos o que pretendemos. Tomemos então  $p = \left[ \frac{1}{\epsilon} \right] + 1$ , em que  $[x]$  significa o maior inteiro menor ou igual a  $x$ , normalmente designando por parte inteira ou característica de  $x$ .

Note-se que a escolha de  $p$  não é única. Se a implicação (1) é verificada para uma certa escolha de  $p$ , ela é também verificada para uma qualquer escolha superior a  $p$ .

A escolha efectuada neste exemplo é, para cada  $\epsilon$ , a menor possível.

3. (b)

i.  $u_n = \begin{cases} 3 & \text{se } n = 1 \\ 7 & \text{se } n = 2 \\ 5 & \text{se } n \geq 3. \end{cases}$

ii.  $u_n = \frac{1}{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}.$

iii.  $u_n = \begin{cases} 3 & \text{se } n \text{ é par} \\ 4 & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$

iv. Não existe. Toda a sucessão convergente é limitada.

v.  $u_n = \begin{cases} 2n & \text{se } n \text{ é par} \\ 3 & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$

4. (b) Conjunto dos majorantes:  $\emptyset$ ; não existe supremo nem máximo.

Conjunto dos minorantes:  $] -\infty, 0]$ ;  $\inf S = 0$ ;  $\min S = 0$ .

(c)  $u_n = -\frac{1}{n} + 1, \quad n \in \mathbb{N}$

5. (b)

i.  $u_n = -2 + \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}$

ii.  $u_n = \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}$

iii.  $u_n = -n, \quad n \in \mathbb{N}$

iv.  $u_n = \begin{cases} 1/3 & \text{se } n = 1 \\ 1/2 & \text{se } n = 2 \\ 1/n & \text{se } n \geq 3. \end{cases}$

6. (a) Vamos usar o teorema das sucessões encaixadas para mostrar que

$$\lim_n \frac{n!}{n^n} = 0.$$

Começemos por mostrar que

$$0 \leq \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (*)$$

A primeira condição em  $(*)$  é óbvia, porque  $n \in \mathbb{N}$ . Quanto à segunda condição observemos que

$$\begin{aligned} \frac{n!}{n^n} &= \frac{\overbrace{1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (n-2) \times (n-1) \times n}^{n \text{ fatores}}}{\underbrace{n \times n \times n \times \cdots \times n}_{n \text{ fatores}}} \\ &= \frac{1}{n} \times \frac{2}{n} \times \frac{3}{n} \times \cdots \times \frac{n-2}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \frac{n}{n} \\ &= \frac{1}{n} \times \underbrace{\frac{2}{n} \times \frac{3}{n} \times \cdots \times \frac{n-2}{n} \times \frac{n-1}{n}}_{\leq 1} \times \frac{n}{n} \leq \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Como  $\lim_n 0 = \lim_n \frac{1}{n} = 0$ , pelo teorema das sucessões encaixadas concluímos que

$$\lim_n \frac{n!}{n^n} = 0.$$

(b) Vamos usar o teorema das sucessões encastradas para mostrar que

$$\lim_n \frac{10^n}{n!} = 0.$$

Comecemos por mostrar que

$$0 \leq \frac{10^n}{n!} \leq \frac{10^{10}}{10!} \times \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (**)$$

A primeira condição em (\*\*) é óbvia, porque  $n \in \mathbb{N}$ . Quanto à segunda condição observemos que

$$\frac{10^n}{n!} = \left( \frac{10}{1} \times \frac{10}{2} \times \cdots \times \frac{10}{10} \right) \times \underbrace{\left( \frac{10}{11} \times \frac{10}{12} \times \cdots \times \frac{10}{n-1} \times \frac{10}{n} \right)}_{\leq 1} \leq \frac{10^{10}}{10!} \times \frac{1}{n}.$$

Como  $\lim_n 0 = \lim_n \frac{10^{10}}{10!} \times \frac{1}{n} = 0$ , pelo teorema das sucessões encastradas concluímos que  $\lim_n \frac{10^n}{n!} = 0$ .

(c) Vamos usar o teorema das sucessões encastradas para mostrar que

$$\lim_n \left( \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right) = 0.$$

Se chamarmos  $u_n$  à soma de parcelas dentro de parentesis, podemos afirmar que  $u_n$  é uma soma de  $n+1$  parcelas, em que a maior é a primeira e a menor é a última. Está assim justificado o encastramento

$$\frac{n+1}{(2n)^2} \leq \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \leq \frac{n+1}{n^2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Como  $\lim_n \frac{n+1}{(2n)^2} = \lim_n \frac{n+1}{n^2} = 0$  (justifique), pelo teorema das sucessões encastradas concluímos que  $\lim_n \left( \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right) = 0$ .

(d) Vamos usar o teorema das sucessões encastradas para mostrar que

$$\lim_n \left( \frac{n}{\sqrt{n^4+1}} + \cdots + \frac{n}{\sqrt{n^4+n}} \right) = 1.$$

Se chamarmos  $u_n$  à soma de parcelas dentro de parentesis, podemos afirmar que  $u_n$  é uma soma de  $n$  parcelas, em que a maior é a primeira e a menor é a última. Está assim justificado o encastramento

$$n \cdot \frac{n}{\sqrt{n^4+n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^4+1}} + \cdots + \frac{n}{\sqrt{n^4+n}} \leq n \cdot \frac{n}{\sqrt{n^4+1}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Como  $\lim_n n \cdot \frac{n}{\sqrt{n^4+n}} = \lim_n n \cdot \frac{n}{\sqrt{n^4+1}} = 1$  (justifique), pelo teorema das sucessões encastradas concluímos que  $\lim_n \left( \frac{n}{\sqrt{n^4+1}} + \cdots + \frac{n}{\sqrt{n^4+n}} \right) = 1$ .

7. (a)  $+\infty$  (b)  $\frac{1}{e}$  (c)  $\frac{1}{3}$   
 (d) 0 (e) 0 (f) 0  
 (g)  $\frac{1}{e^3}$  (h) 0 (i) 1  
 (j) 1 (k) 1 (l)  $\frac{1}{e^2}$   
 (m)  $e^2$  (n) 1 (o) 0

$$(a) \lim_n \frac{1+n^3}{n^2+2n-1} = \lim_n \frac{\frac{1+n^3}{n^3}}{\frac{n^2+2n-1}{n^3}} = \lim_n \frac{\frac{1}{n^3}+1}{\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}-\frac{1}{n^3}} = +\infty.$$

$$(c) \lim_n \frac{2^n+3^n}{3^{n+1}+4} = \lim_n \frac{\frac{2^n+3^n}{3^n}}{\frac{3^{n+1}+4}{3^n}} = \lim_n \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n+1}{3+\frac{4}{3^n}} = \frac{1}{3}.$$

$$(d) \lim_n (\sqrt{n+5} - \sqrt{n}) = \lim_n \frac{(\sqrt{n+5} - \sqrt{n})(\sqrt{n+5} + \sqrt{n})}{(\sqrt{n+5} + \sqrt{n})} = \lim_n \frac{5}{\sqrt{n+5} + \sqrt{n}} = 0.$$

$$(f) \text{ sugestão: calcule separadamente os limites: } \lim_n \frac{\sqrt{n}}{n+2} \text{ e } \lim_n \frac{\sin n}{n+2}.$$

$$(g) \lim_n \left(1 - \frac{3}{n+2}\right)^n = \lim_n \left(\left(1 - \frac{1}{\frac{n+2}{3}}\right)^{\frac{n+2}{3}}\right)^3 \cdot \left(1 - \frac{3}{n+2}\right)^{-2} = e^{-3} \cdot 1 = \frac{1}{e^3}.$$

$$(h) \text{ Seja } u_n = \frac{\cos(n\pi) + \cos(2n\pi)}{n}, n \in \mathbb{N}. \text{ Observemos que } u_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \frac{2}{n} & \text{se } n \text{ é par.} \end{cases}$$

Como  $\lim_n u_{2n-1} = 0$  e  $\lim_n u_{2n} = 0$ , concluímos que  $\lim_n u_n = 0$ .

$$(i) \lim_n \frac{(n+1)! - n!}{n!(n+2)} = \lim_n \frac{(n+1)n! - n!}{n!(n+2)} = \lim_n \frac{n+1-1}{n+2} = \lim_n \frac{n}{n+2} = 1.$$

$$(j) \lim_n \sqrt{n^2+2n} - n = \lim_n \frac{(\sqrt{n^2+2n} - n)(\sqrt{n^2+2n} + n)}{\sqrt{n^2+2n} + n} = \lim_n \frac{n^2+2n-n^2}{\sqrt{n^2+2n} + n} =$$

$$\lim_n \frac{2n}{\sqrt{n^2+2n} + n} = \lim_n \frac{\frac{2n}{n}}{\frac{\sqrt{n^2+2n} + n}{n}} = \lim_n \frac{2}{\sqrt{\frac{n^2+2n}{n^2}} + \frac{n}{n}} = \lim_n \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{n}} + 1} = 1.$$

$$(k) \lim_n \frac{3^n+4^n+5^n}{5^n} = \lim_n \left(\frac{3}{5}\right)^n + \left(\frac{4}{5}\right)^n + 1 = 1.$$

$$(l) \lim_n \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n = \lim_n \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)^n = \lim_n \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)^{n+1} \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)^{-1} = e^{-2}.$$

$$(m) \lim_n \left(\frac{n+1}{n}\right)^{2n+1} = \lim_n \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \left(\frac{n+1}{n}\right) = \lim_n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(\frac{n+1}{n}\right) = e^2.$$

$$(n) \lim_n \frac{2^{n+1} + (-3)^n + 6^n}{6^n + 1} = \lim_n \frac{\frac{2^{n+1} + (-3)^n + 6^n}{6^n}}{\frac{6^n + 1}{6^n}} = \lim_n \frac{2 \cdot \left(\frac{2}{6}\right)^n + \left(\frac{-1}{2}\right)^n + 1}{1 + \left(\frac{1}{6}\right)^n} = 1.$$

$$(o) \lim_n \frac{e^n - 1}{5^n} = \lim_n \left(\left(\frac{e}{5}\right)^n - \frac{1}{5^n}\right) = 0.$$

8. A sucessão  $(u_n)_n$  está definida por recorrência. Tem-se que

$$u_1 = -\frac{1}{2}, u_2 = 1, u_3 = -2, u_4 = 4, u_5 = -8, u_6 = 16, \dots$$

O termo de ordem  $n$  da sucessão é:  $u_n = (-2)^{n-2}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

- (a) Afirmação falsa. Tem-se que  $u_1 = -\frac{1}{2} < 1 = u_2$  mas  $u_2 = 1 > -2 = u_3$ . Logo a sucessão não é monótona.
- (b) Afirmação falsa porque o conjunto dos termos da sucessão não é majorado (nem minorado).
- (c) Afirmação falsa porque não existe  $\lim_n u_n$ . Com efeito,  $\lim_n u_n = \lim_n (-2)^{n-2} = \lim_n \frac{(-2)^n}{4}$  e este limite não existe.

9. A sucessão  $(u_n)_n$  está definida por recorrência.

O termo de ordem  $n$  da sucessão é:  $u_n = 5(-2)^{-n+1}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

- (a) Afirmação falsa. Tem-se que  $u_1 = 5 > -\frac{5}{2} = u_2$  mas  $u_2 = -\frac{5}{2} < \frac{5}{4} = u_3$ . Logo a sucessão não é monótona.
- (b) Afirmação verdadeira. Tem-se que  $-\frac{5}{2} \leq u_n \leq 5$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .
- (c) Afirmação verdadeira porque  $\lim_n u_n = 0$ .

10. (a) Afirmação verdadeira. Ver aulas.

(b) Afirmação falsa.

A sucessão  $u_n = (-1)^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$  é divergente e, no entanto, a sua subsucessão dos termos de ordem par converge para 1 ( $\lim_n u_{2n} = 1$ ).

(c) Afirmação falsa.

Consideremos a sucessão  $u_n = (-1)^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Tem-se que  $\{u_n : n \in \mathbb{N}\} = \{-1, 1\}$  e, no entanto, a sucessão é divergente.

(d) Afirmação falsa. Consideremos a sucessão

$$u_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 1 \\ 5 & \text{se } n \geq 2. \end{cases}$$

Tem-se que  $\{u_n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 5\}$  e, no entanto,  $(u_n)_n$  é convergente para 5.

(e) Afirmação falsa. Consideremos as sucessões

$$u_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ é par} \\ 0 & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases} \quad \text{e} \quad v_n = \begin{cases} -1 & \text{se } n \text{ é par} \\ 0 & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}.$$

Tem-se que  $u_n + v_n = 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

As sucessões  $(u_n)_n$  e  $(v_n)_n$  são sucessões divergentes (porque admitem subsucessões convergentes para limites diferentes) e, no entanto, a sucessão  $(u_n + v_n)_n$  é convergente para 0.

(f) Afirmação verdadeira. É suficiente observar que a sucessão  $(v_n)_n$  pode ser vista como a diferença de duas sucessões convergentes:

$$v_n = (u_n + v_n) - u_n.$$



(g) Afirmação falsa. Consideremos as sucessões

$$u_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ é par} \\ 0 & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases} \quad \text{e} \quad v_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ é par} \\ 1 & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$$

Tem-se que  $u_n v_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$ .

A sucessão  $(u_n v_n)_n$  é convergente para 0 e, no entanto, nenhuma das sucessões  $(u_n)_n$  e  $(v_n)_n$  é convergente para zero (são ambas sucessões divergentes porque admitem subsucessões convergentes para limites diferentes).

(h) Afirmação falsa. A sucessão  $u_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}$ , é tal que  $|u_n| = |(-1)^n| = 1, n \in \mathbb{N}$ . Consequentemente,  $\lim_n |u_n| = 1$  e, no entanto,  $\nexists \lim_n u_n$ .

(i) Afirmação falsa. A sucessão  $u_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}$ , é limitada ( $-1 \leq u_n \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}$ ) e não é convergente (porque admite subsucessões convergentes para limites diferentes).

(j) Afirmação verdadeira. Como a sucessão é crescente, então é monótona. Como os termos estão em  $] -1, 1[$ , então a sucessão é limitada. Como a sucessão é monótona e limitada, então é convergente.

(k) Afirmação falsa. Consideremos a sucessão

$$u_n = \begin{cases} 1 - \frac{1}{n+1} & \text{se } n \text{ é par} \\ 1 + \frac{1}{n+1} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Tem-se que:  $u_{2n} \in ]0, 1[, u_{2n-1} \in ]1, 2[$  e, no entanto,  $\lim_n u_n = 1$ .

(l) Afirmação verdadeira. Como a sucessão é decrescente, então é monótona. Como os termos são positivos e a sucessão é decrescente podemos concluir que  $0 < u_n \leq u_1, \forall n \in \mathbb{N}$ . Logo a sucessão é limitada. Como a sucessão é monótona e limitada, então é convergente.

11. (a)  $\nexists \lim_n u_n$ ;

(b)  $\lim_n u_n = a$ ;

(c)  $\exists \lim_n u_n$ ;

sendo  $(u_n)_n$  decrescente, temos

$$u_n \leq u_1, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e, assim,

$$2 \leq u_n \leq u_1, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Logo,  $(u_n)_n$  é monótona e limitada e, portanto, convergente.

(d)  $\exists \lim_n u_n$ ;

$(u_n)_n$  é uma sucessão limitada e monótona, logo convergente.

(e)  $\exists \lim_n u_n$ ;

sendo  $(u_n)_n$  crescente, temos

$$u_n \geq u_1, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e, como é também uma sucessão de termos negativos,

$$u_n < 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ou seja,

$$u_1 \leq u_n < 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Logo,  $(u_n)_n$  é monótona e limitada e, portanto, convergente.

(f)  $\exists \lim_n u_n;$

$(u_n)_n$  é limitada porque

$$0 < u_n \leq u_1, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e, sendo também monótona, é convergente.

12. (a)  $u_n = \frac{1}{n}, \quad v_n = n, \quad n \in \mathbb{N}$

(b)  $u_n = (-1)^n \frac{1}{n}, \quad v_n = n, \quad n \in \mathbb{N}$

(c)  $u_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 3 & \text{se } n = 2 \\ 2 & \text{se } n \geq 3 \end{cases}$

(d)  $u_n = \begin{cases} 1, & \text{se } n \text{ é par} \\ n, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$

(e)  $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad n \in \mathbb{N}$

(f)  $u_n = \frac{\sqrt{2}}{n}, \quad n \in \mathbb{N}$

(g)  $u_n = -\frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}$

(h)  $u_n = (-1)^n n \quad n \in \mathbb{N}$

(i)  $u_n = \pi + \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}$

(j)  $u_n = \begin{cases} n & \text{se } n \text{ é par} \\ 0 & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$

(k) não existe

(l)  $u_n = \begin{cases} -1 & \text{se } n = 1 \\ 1 & \text{se } n = 2 \\ 2 & \text{se } n \geq 3 \end{cases}$

(m)  $u_n = (-1)^n \quad n \in \mathbb{N}$

(n)  $u_n = \frac{(-1)^n}{n} \quad n \in \mathbb{N}$

(o)  $u_n = 2 + \frac{1}{n} \quad n \in \mathbb{N}$