


Álgebra Universal e Categorias

2º teste

duração: 1h30min | tolerância: 10min

1. Sejam \mathcal{A} uma álgebra e $\theta \in \text{Cong}(\mathcal{A})$. Considere a aplicação $\alpha : A \rightarrow A/\theta$ definida por $\alpha(a) = [a]_\theta$, para todo $a \in A$.
 - (a) Mostre que α é um epimorfismo de \mathcal{A} em \mathcal{A}/θ .
 - (b) Mostre que $\ker \alpha = \theta$. Justifique que α é um monomorfismo se e só se $\theta = \Delta_A$.
2. (a) Seja \mathcal{A} uma álgebra cujo reticulado de congruências pode ser representado pelo diagrama de Hasse



e tal que $\theta_1 \circ \theta_4 = \theta_4 \circ \theta_1$.

- i. Justifique que a álgebra \mathcal{A} não é diretamente indecomponível e indique álgebras \mathcal{B} e \mathcal{C} não triviais tais que $\mathcal{A} \cong \mathcal{B} \times \mathcal{C}$.
- ii. Diga, justificando, se os reticulados $\text{Cong}(\mathcal{A}/\theta_1)$ e $\text{Cong}(\mathcal{A}/\theta_3)$ são isomorfos.
- (b) Dê um exemplo de, ou justifique que não existe um exemplo de:
 - i. Uma álgebra subdiretamente irredutível que não seja diretamente indecomponível.
 - ii. Uma álgebra diretamente indecomponível que não seja subdiretamente irredutível.
3. Considere os operadores de classes de álgebras H e S . Mostre que:
 - (a) HS é um operador de fecho.
 - (b) $HSH = HS$.
4. Sejam **C** e **D** as categorias definidas pelos diagramas seguintes

$$\mathbf{C} \quad h \circlearrowleft_{\text{id}_A}^{\text{id}_A} A \xrightleftharpoons[f]{g} B \circlearrowright_{\text{id}_B} \quad \mathbf{D} \quad \text{id}_X \circlearrowleft_X^h Y \xrightleftharpoons[h']{\text{id}_Y}$$

onde $h \neq \text{id}_A$ e $h = g \circ f$.

- (a) Justifique que $g \circ f \circ g = g$ e $h \circ h = h$.
- (b) Defina a categoria **C** × **D** por meio de um diagrama.